

Nieuwe vindplaatsen in Friesland van *Carex aquatilis* Wahlenb.

door

D. T. E. VAN DER PLOEG (Sneek) en F. RUDOLPHY (Gorredijk)

Sedert de ontdekking van *Carex aquatilis* Wahlenb. in 1956 in de Lindevallei onder Peperga (BAKKER & WESTHOFF, 1957) is het aantal bekende vindplaatsen van deze boreale zegge in Friesland niet toegenomen. Dat dit, zoals zo vaak, eerder aan de floristen lag dan aan deze *Carex*, bewijzen de vondsten van F. Rudolphy in 1969 in de stroomdalen van enkele Friese riviertjes. Ook deze vindplaatsen vormen opnieuw een bevestiging van de mededeling van KERN & REICHGELT (1954, p. 79), dat *C. aquatilis* gevonden wordt in de met moerasveen opgevulde oerstroombdalen, waar deze zich verwijden en overgaan in het oude hafgebied.

De nieuwe vindplaatsen zijn nl. de volgende:

a. langs de Linde.

1. In een tweetal drassige terreintjes ten zuiden van Oldeberkoop, aan de rand van het stroomdal onder Zandhuizen. *C. aquatilis* groeit hier samen met o.a. *Carex disticha*, *C. rostrata*, *C. diandra* en *C. acutiformis* in een ietwat rommelig aandoend terreintje dat o.a. door paarden wordt begraasd. De groeiplaats zal in verband met voortgaande verkavelings- en verbeteringswerkzaamheden in de toekomst stellig verloren gaan.
2. Eveneens ten zuiden van de Linde ten Z.W. van Oldeberkoop in de z.g. Graverij, een drassig terrein langs de Linde. Het terrein is eigendom van „It Fryske Gea” en geniet dus bescherming.

b. langs de Boorn.

Langs de Boorn (ook genoemd Koningsdiep; Fr.: Ald Djip) was, voorzover ons bekend, het voorkomen van *C. aquatilis* nog niet eerder vastgesteld. In 1969 werden hier enkele zeer rijke vindplaatsen opgespoord. Deze zijn gelegen in de z.g. Hege Easten onder Terwispeel, in het stroomdal van de Boorn.

Het gebied geniet vermaardheid als ganzenpleisterplaats, heeft sinds enige tijd de status van Staatsnatuurmonument en werd omgedoopt in „Van Oordt's Mersken”.

De plant groeit hier

1. in een enigszins gestoord nat „blauwgraslandachtig” terrein, samen met o.a. *C. disticha* en *Juncus conglomeratus*.
2. in dichtgroeïende sloten.
3. massaal en vegetatievormend in de drassige hooilanden gelegen tegen de Boorn. Hier staat de Noordse Zegge samen met o.a. *Carex acuta*, *C. rostrata*, *C. disticha*, waarbij *C. aquatilis* echter volledig domineert. *Carex aquatilis* staat in deze natte hooilanden werkelijk massaal, en over een zodanig groot oppervlak als wij nog nergens aantreffen. De boswachter S. Voolstra, die het gebied uitstekend kent, schatte het door ons aangeduide gebied op minstens 5 à 6 ha.

Literatuur

- BAKKER, D. & V. WESTHOFF, 1957. Over de verspreiding van *Carex aquatilis* Wahlenb. Corr. bl. Rijksherb. 2, p. 13—14.
- KERN, J. H. & TH. J. REICHEL, 1954. Cyperaceae, *Carex*. Flora Neerlandica I, 3.

Summary

New localities of *Carex aquatilis* Wahlenb. in the province of Friesland, along the rivers Linde and Boorn.