

De bastaard van *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. en *S. vulgaris* L. wederom gevonden

D.T.E. van der Ploeg
(Sneek)

In 1950 vond A. de Visser voor het eerst in het wild bij St. Laurens op Walcheren *Senecio* × *pseudovernalis* Zabel, de bastaard van *Senecio vernalis* en *S. vulgaris* (Kloos & Van Ooststroom, 1951). Nadien wordt er van deze bastaard niets meer vernomen.

Eerder – en voor het eerst in Nederland – was *S.* × *pseudovernalis* door Joh. Jansen aangetroffen in zijn tuintje te Wijchen, Gld. (Kloos, 1941), waarheen hij een pol *S. vernalis* had overgebracht in de buurt van *S. vulgaris* en met de bloemhoofdjes van de laatste die van *S. vernalis* had bestreken. Deze kunstmatig verkregen hybride is sindsdien tot en met de 19e druk van de Flora van Nederland (Heukels – Van Ooststroom, 1977) abusievelijk vermeld voor Malden, de woonplaats van Joh. Jansen.

In mei 1984 vond ik tezamen met D. Douwes in een grazige wegberm tussen Galamadammen (IVON-hok 15.15.51) en Flinkboskje (hok 15.25.12) in Zuidwest-Friesland de bastaard wederom. Hij stond daar in enkele tientallen, rijkbloeiende exemplaren temidden van *S. vulgaris* en veel *S. vernalis*, die er in 1983 ook reeds stond.

S. × *pseudovernalis* is in vele opzichten intermediair tussen de oudersoorten, onder andere wat betreft de beharing, de grootte en vorm van de bloemhoofdjes, de lengte der lintbloemen. De plant lijkt geheel of grotendeels steriel. Bij een bezoek in juni aan de groeiplaats stonden de vruchtdragende hoofdjes van *S. vernalis* en *S. vulgaris* mooi bolvormig, pluizig uit, terwijl het pluus van *S.* × *pseudovernalis* aanéén bleef kleven en geen goede vruchten bezat.

Het lijkt niet onaannemelijk, dat op de plaatsen waar *S. vernalis* zich enkele jaren weet te handhaven de hybride, die door Stace (1975) niet voor Nederland wordt vermeld, vaker zal kunnen worden aangetroffen. Men zou er eens op kunnen letten.

Literatuur

Heukels – Van Ooststroom, 1977. Flora van Nederland, 19e druk. Groningen.

Kloos, A.W., 1941. Aanwinsten van de Nederlandse Flora in 1940. Ned. Kruidk. Arch. 51, p. 94 - 121.

Kloos, A.W. & S.J. van Ooststroom, 1951. Nieuwe plantensoorten en vormen in Nederland in 1950. De Levende Natuur 54, p. 135 - 136.

Stace, C.A., 1975. Hybridization and the Flora of the British Isles. London.

Rediscovery of the hybrid of *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. and *S. vulgaris* L.

Two wild records of *Senecio* × *pseudovernalis* Zabel are mentioned from the Netherlands, one from 1950 in the province of Zeeland (leg. A. de Visser) and one from 1984 in the province of Friesland. In 1941 the hybrid was also found in Wijchen, in the garden of a local botanist.