

De *Enoplognatha ovata* groep

Een artikel van Hippa & Oksala uit 1982 (Entomologica Scandinavica, 13: 213-222) attendeert ons op het bestaan van drie soorten binnen wat tot voordien als één, zij het wat variabele soort, *Enoplognatha ovata* (Clerck), werd beschouwd. De groep wordt opgesplitst in drie soorten: *E. ovata*, *E. latimana* en *E. penelope*. *E. ovata* komt in Europa en N. Amerika (ingevoerd) voor, *E. latimana* in Centraal Europa en N. Amerika (ingevoerd), en *E. penelope* in het Mediterrane gebied. De soorten worden onderscheiden op de vorm van - hoe kan het ook anders - de mannelijke palp en de epigyne/vulva. In de mannelijke palp is vooral de vorm van de "conductor" (bedoeld wordt de terminale apophyse) een goed diagnostisch kenmerk. De vorm van de opening van de epigyne en van de vulva blijken ook duidelijke verschillen te tonen.

Niet duidelijk is waarom niet één van de vele synoniemen gebruikt kon

worden voor de nu weer onderscheiden eenheden, er wordt daar niets over gezegd. Zoiets dient aan de hand van literatuurstudie en onderzoek van typen nauwkeurig bekeken te worden.

In ieder geval is het duidelijk dat de collecties nog eens onderzocht moeten worden op de determinaties van *E. ovata*. Ook blijkt uit een dergelijk verhaal weer eens, dat men ook ogenschijnlijk algemene soorten regelmatig moet blijven verzamelen, zeker in gebieden waar men niet eerder verzameld heeft.