

NIEUWE SPINNENSOORTEN VOOR NOORD-HOLLAND

Boudewijn Heuts

Universiteit van Amsterdam, Swammerdam Institute for Lifesciences, Kruislaan 320, 1098 SM Amsterdam (Heuts@science.uva.nl)

ABSTRACT

Porrhomma egeria Simon, *Walckenaeria incisa* (O. P.-Cambridge), *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer), *Hylyphantus graminicola* (Sundevall), *Theridion blackwalli* O. P.-Cambridge and *Ero tuberculata* (De Geer) are recorded from the province of Noord-Holland for the first time.

Key-words: Netherlands, new province records, Noord-Holland.

In de loop van 2002 werden door mij een aantal soorten verzameld die nieuw zijn voor de provincie Noord-Holland of slechts éénmaal eerder werden vermeld.

In het vroege voorjaar 2002: *Porrhomma egeria* Simon, volwassen ♂ (eerste verdieping van huis in de Slauerhofflaan, Uithoorn).

29 mei 2002: een volwassen ♀ van *Walckenaeria incisa* (O. P.-Cambridge) in bladstrooisel (Gooise heide, gemeente Huizen, op minder dan 10 of 20 m afstand van de plek waar het jaar daarvoor *W. cucullata* (C.L. Koch) gevonden werd (gedetermineerde op grond van o.a. epigyne, duidelijk verhoogd voorste deel van het cephalothorax, typisch *Walckenaeria*-achtig roodachtige poten en cephalothorax, iets grijsachtig abdomen met opvallende dunne lange haren, en het voor *Walckenaeria* typisch iets langer dan brede sternum).

Op 2 juni 2002 werden op bijna dezelfde plek (Gooise heide, Huizen), nl. in bladstrooisel van zomereik op 7 of 10 m afstand van de plek van 29 mei, op een zonbeschenen hellinkje dat naar het noorden of noordoosten gericht is nog twee volwassen ♀ van *Walckenaeria incisa* gevonden.

30 mei 2002: volwassen ♂ van *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer) in bladstrooisel op 5 of 10 m afstand van de plek waar *Walckenaeria incisa* op 29 mei 2002 gevonden werd (Gooise hei, Huizen) (gedetermineerd op grond v. o.a. de mannelijke palp, grootte, kleuren en tekening op de bovenzijde van het abdomen, grote chelicerae, en lichaamslengte).

30 mei 2002: volwassen ♂ van *Hylyphantus graminicola* (Sundevall) bij zomereik in bladstrooisel op minder dan 10 m afstand van de plek waar *Cheiracanthium erraticum* gevonden werd (Gooise hei, Huizen) (gedetermineerd o.a. op grond van lichaamslengte van 2,9 mm, mannelijke palpen die continu op en neer bewegen bij het lopen, zwarte abdomenkleur, en lange roodachtige poten en cephalothorax).

Juni en juli 2002: een tiental volwassen ♀ van *Theridion blackwalli* O. P.-Cambridge en meer dan 20 zeer jonge individuen op 1 meter hoogte onder horizontale metalen strip buiten op Warme-Kas-gebouw, Anna's Hoeve, Amsterdam-Oost (gedetermineerd op grond van o.a. epigyne, kleur en tekening boven op het abdomen, iets "geringde" poten, en grootte).

10 juni 2002: een volwassen ♀ van *Ero tuberculata* (De Geer) op *Thuja occidentalis* in tuin van Slauerhofflaan (Uithoorn) (gedetermineerd op grond van o.a. epigyne, vrij grote lichaamslengte, en caudale knobbels boven op abdomen die verder uit elkaar staan dan de twee meer craniale knobbels).

27 april 2002: volwassen ♀ van *Ero furcata* (Villers) op een paarse zuurbesstruik, 1 meter hoog, bij een flatgebouw (Boterbloemstraat in Uithoorn), gedetermineerd op grond van epigyne en slechts twee (grote) echte knobbels boven op het abdomen. De soort werd éénmaal eerder uit Noord-Holland gemeld (Kessler-Geschiere 2001: 15).

LITERATUUR

Kessler-Geschiere, A.M. 2001. Bodemspinnen in de oeverlanden van de Amstelveense Poel, 1965-1967. – Nieuwsbrief Spined 16: 12-17.

