

**PSEUDEUOPHRYS ERRATICA (WALCKENAER, 1826) NIEUW VOOR NEDERLAND (ARANEAE, SALTICIDAE)****Steven IJland**

Bronkhorststraat 23, 2316 SX, Leiden (sijland@gmail.com)

**ABSTRACT***Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) new for the Netherlands (Araneae, Salticidae)]*Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) has been found in the Netherlands for the first time.Key words: first Dutch record, *Pseudeuophrys erratica***INLEIDING**

Een volwassen mannetje van *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826) werd op 30 mei 2004 gevonden in een graspol in naaldbos in het Lutterzand (Overijssel), wat de eerste melding is uit Nederland (Van Helsdingen 2007). De soort is gemeld uit alle omringende landen (behalve Luxemburg), zodat de vondst niet echt verassend valt te noemen.

**VERSPREIDING**

*Pseudeuophrys erratica* komt in de meeste landen van Europa voor. In de lijst van Fauna Europaea (Van Helsdingen 2008) ontbreken van de grotere landen alleen Nederland, Bosnië-Herzegovina, Albanië, en IJsland. Het is dan ook niet verassend deze soort in Nederland aan te treffen. In Duitsland is de soort aangetroffen vlak over de grens met Twente (Staudt 2008)), dus vlakbij de Nederlandse vindplaats. Oostelijk komt de soort voor tot in Japan, China en Korea. In de Verenigde Staten is *Pseudeuophrys erratica* ingevoerd en gevonden in New York en New Jersey.

**HABITAT**

*Pseudeuophrys erratica* wordt vooral gemeld van muren, puin en boomschors (Roberts 1998). In Londen komt de soort ook voor op “groene daken” (Grant 2006), en hij is in de Verenigde Staten aangetroffen op de vijfde verdieping van het American Museum of Natural History (Edwards 2002). De verwante soort *Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871) komt ook veel op muren voor, maar ook binnenshuis (bijv. in een woonhuis in Oldenzaal, 1♂ en 1♀, 7.x.2001, melding nieuw voor Overijssel).

De vondst in een graspol lijkt niet typisch te zijn voor *Pseudeuophrys erratica*.

**TAXONOMIE**

*Pseudeuophrys erratica* lijkt erg op *Pseudeuophrys lanigera*, maar is gemakkelijk te onderscheiden aan de hand van de tibia-apophyse. De epigyne is ook typisch. Palp en epigyne zijn goed afgebeeld in Roberts' Spinnengids (Roberts 1998), waarin ook afbeeldingen van mannetje en vrouwtje te vinden zijn. In deze gids wordt de soort nog *Euophrys erratica* genoemd. *Pseudeuophrys* verschilt van *Euophrys* op onder andere de volgende punten (Žabka, M. & J. Prószyński 1998): de bulbus is ongeveer zo lang als breed (langer dan breed in *Euophrys*), distale haematodocha zichtbaar (niet zichtbaar in *Euophrys*), bulbus met “anterior pocket” (zonder in *Euophrys*), spermathecae boonvormig (rond of ovaal in *Euophrys*).

**MATERIAAL**

1♂ - Overijssel, Lutterzand, Gemeente Losser, RD 267-483, 30.v.2004, Steven IJland. Materiaal in eigen collectie.

**LITERATUUR**

- Edwards, G.B. 2002. A review of the Nearctic jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the subfamily Euophryinae north of Mexico. – *Insecta Mundi* 16: 65-75.
- Grant, G. 2006. Extensive Green Roofs in London. – *Urban Habitats* 4 : 51-65.
- Helsdingen, P.J. van 2008. Fauna Europaea, <http://www.european-arachnology.org/reports/fauna.shtml>
- Helsdingen, P.J. van 2008. Catalogus van de Nederlandse Spinnen. Versie 2008.2. [http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.nl/contents/i001447/spinnencatalogus\\_2008.pdf](http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.nl/contents/i001447/spinnencatalogus_2008.pdf)
- Roberts, M.J. 1998. Spinnengids (Tweede druk, Vertaling en bewerking: A.P. Noordam). – Tirion Uitgeverij BV, Baarn, 37 blz. (Spiders of Great Britain & Northern Europe (1995). – Harper Collins Publishers, London).
- Staudt, A. 2008. Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). - <http://www.arages.de/verbreitung.html>, versie van 18 September 2008
- Žabka, M. & J. Prószyński 1998. Middle European *Euophrys* C. L. Koch, 1834 (Araneae: Salticidae)-one, two or three genera? – In: Seldon, P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997: 115-120.

