

VOOR DE KIJKER GEHAD:

Witwangsterns

Op 23 juli van dit jaar had ik het geluk een broedkolonie van de *witwangstern* te ontdekken in een oude rivier van de Lek. Aangezien men ter plaatse bezig is deze rivierarm vol te spuiten met klei, meen ik als ik de eerste vogel te zien krijg, even een *visdiefje* voor mij te hebben, dat met de buik in de modder heeft gezeten. Doch als even later weer zo'n vogel met donkere buik over mij vliegt en verderop nog enige, begrijp ik dat dit een bijzondere waarneming is.

Weldra valt mij de vreemde alarmroep op (de vogels alarmeren hevig). Deze klinkt schor en rasperig. De vleugels zijn licht leigrijs, de buik is bij het ene exemplaar donkerder dan bij het andere. Snavel en poten zijn krachtig donkerrood, veel donkerder dan bij het *visdiefje*.

De wijze van visvangen is precies als bij de *visdief*, dus stootduikend. Vrij grote visjes worden gevangen, eenmaal zie ik dat een snoekje wordt gevangen dat echter weer losgelaten wordt. Ook worden vaak medicinale bloedzuigers gevangen. Het voedsel wordt in de lucht aan de luidroepende jongen verstrekt, doch bij kleinere jongen strijkt de vogel neer en geeft het voedsel aan.

Op 25 juli bezoek ik het terrein weer met de heren Dr. G. A. Brouwer en Sj. Braaksma. Het blijkt ons dat er minstens 8 paren zijn en duidelijk kunnen we kleine en grotere jongen in de nesten onderscheiden. Deze nesten liggen tamelijk open tussen veenwortel, watergentiaan of schermbloemigen.

Wanneer ik op 31 juli met de heer Braaksma weer in het gebied ben, blijkt ons dat er verscheidene vliegvlugge jongen zijn, doch 3 nesten kunnen we niet meer vinden. Behalve op de ten O. van deze weg gelegen plassen zijn ook aan de westzijde vliegvlugge jongen te zien die gevoed worden.

Het is jammer dat ook dit gebied weer opgeofferd wordt aan de verkeersmoloch, in dit geval het water-verkeer. Het was n.l. een broedgebied voor *zwarte sterns*, *kleine plevier*, *grutto's*, *kieviten*, *tureluurs*, *zomertalingen*, *wilde eenden*, *sloebenden*, *futen*, *meerkoeten* en *waterhoentjes*, terwijl we er bovendien waarnamen *ijsvogel*, *porceleinhoen*, *krakeend* en als trekkers alle ruiersoorten, *kemphanen*, vele *watersnippen* en vele eendensoorten.

A. J. H. BARON VAN LYNDEN

Zwarte Ooievaars

Ook dit jaar kwamen weer verscheidene berichten binnen over waargenomen *zwarte ooievaars*. De heer J. Diks zag er samen met zijn zoonje aan de Heul te Schalkwijk op 23-8-1958 5 overvliegen. Een streekblad op Voorne maakte bekend, dat de heer J. Oprel uit Oudenhooft op 1 sept. bij Heenvliet ook 5 *zwarte ooievaars* heeft gezien (med. A. J. de Zwart en D. v. Delden). Een bericht van het A.N.P. van 11-9-1958 luidde: „sedert enkele dagen houdt zich in de buurt-schap Horsthoek bij Heerde een *zwarte ooievaar* op”.

Zilverreigers

Een *grote zilverreiger* werd vanaf 1 juni 1958

gedurende $\pm$ 14 dagen dagelijks waargenomen bij de visvijvers van Valkenswaard o.a. door de heren Van Aalst, Benjaminsen, Ir. Bunnenberg, P. Donk, P. Frencken en Siteur. Van de vogel werden op een 8 mm. film duidelijke kleuropnamen gemaakt. Ook uit Friesland komen berichten van een waargenomen zilverreiger (med. H. T. Van der Meulen).

De heer A. Enklaar berichtte dat op 7-6-1958 een *kleine zilverreiger* werd waargenomen bij het Zwarte Sluisje, St. Kruis, gem. Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen. Daarna 1 ex. op 9-6-1958 op het Grote Gat te Oostburg, 11-6-1958 1 ex. aldaar tussen 4 *blauwe reigers*, later op de dag daar ook waargenomen door inmiddels gewaarschuwde personen o.a. heer en mevr. Rasker, Campfens, Van der Driest, H. Koger & Dierkx. Op 13-6-1958 werden daar duidelijk de gele tenen gezien, terwijl de grootte op ongeveer 2/3 van die van een *blauwe reiger* werd geschat.

Op 17-6-1958 voor het laatst waargenomen door de heer Dierkx. De vogel zat meestal op slikplaten, een enkele maal op grasland. Soms tussen *blauwe reigers* of *kluten*. Was niet schuw. Een enkele maal liet de vogel het geluid „kark” horen.

Flamingo's

De *flamingo* op de zandplaat „Hompelvoet” Goeree werd door de heren Van der Velden en Ouweeneel op 14-7-1958 waargenomen, voordien werden aldaar 2 ex. waargenomen (zie „Het Vogeljaar”, jrg. 6, p. 60).

Op 23-7, 25-7, 26-7 en 28-7 werd 1 ex. op het Posthuiswad, Vlieland waargenomen (N. D. Horstink, werd ook door de heer Cupido gezien).

Op 8-8-1958 werd een flamingo op Schiermonnikoog gezien, deze bleek daar reeds 3 weken aanwezig (Draaijer, Ouweeneel). Dit ex. had duidelijk afstekende pootgewrichten, waaruit zou mogen worden afgeleid, dat het een Zuidamerikaanse soort, en dus waarschijnlijk een ontsnapt ex. was.


Op 4-9-1958 nam de heer A. Amereus 1 ex. waar boven Rhijnauwen (med. S. Braaksma).

Steenarend

Op 13-9-1958 omstreeks 15.30 uur zagen de heren J. de Haan en D. Dekker in de Amsterdamse Waterleidingduinen te Vogelenzang een roofvogel, die een *steenarend* bleek te zijn. Zij vragen wie de vogel, die een beschadigde staart had, ook heeft gezien (s.v.p. bericht aan D. Dekker, Uranusstraat 8, Haarlem). De volgende gegevens over deze waarneming werden opgegeven: „kwam met half ingetrokken vleugels hoog aanzeilen uit nw-richting, schroefde zich boven de binnenduinrand nog hoger, trok vleugels geheel in, stootte om vaart te zetten en verdween met *opvallend hoge snelheid* in z-richting langs de duinrand. Kenmerken: stoer, zwaar en hoekig gebouwd, vleugels en staart relatief langer dan bij buizerd, *lichte slagpenbasis*”.

Sperwergrasmus

De heer H. C. Brinkert, arts te Enschede schreef ons nadere gegevens over zijn vermoedelijke



waarneming van een paar *sperwergrasmussen*. „Als niet getraind veldornitholoog zal vrijwel iedere waarneming door mij een vermoedelijke zijn. Het beste is dan ook dat ik de omstandigheid schets waaronder ik de waarneming deed. Tijd, eind juli 1958 $\pm$ 19.00 uur; plaats: Aamsveen, een moerassig gebied langs de Duitse grens achter Enschede. De vogels zaten in een berkje en ik kon ze naderen tot op $\pm$ 4 meter (ik had geen kijker bij me). Slechts één vogel, vermoedelijk het mannetje kreeg ik goed in het oog. Met Petersons „Vogelgids” in de hand kon ik de vogel vergelijken met beschrijving en plaatje. Grootte klopte, opvallend waren de dwarse donkere streepjes, forse snavel en het wippen met de staart. Eerder had ik al in dezelfde omgeving (zonder de vogel te zien) een merkwaardige, opvallende, snorrende zang gehoord, die ik aan geen andere vogel kan toeschrijven en die ik, nu ik deze vogel gezien heb, overeenkomstig de beschrijving, toeschrijf aan de *sperwergrasmus*. Vooral de gestreepte onderdelen waren dermate duidelijk, dat ik voor mijzelf vrij zeker ben, dat dit een *sperwergrasmus* geweest moet zijn. Uit het feit dat de twee vogels bij mijn achtervolging bij elkaar bleven leid ik af dat hier sprake was van een paartje.

Overigens begrijp ik zeer wel dat, wil een waarneming erkend worden men over zekerder gegevens moet kunnen beschikken. Maar daar is het persoonlijke genoeg, die een dergelijke waarneming schenkt, gelukkig niet van afhankelijk”.

Ross' meeuw op Vlieland

Naar aanleiding van het artikel van B. Brakel over de *Ross' meeuw* op Vlieland in „Het Vogeljaar” no 4, van augustus 1958 het volgende: De heer Brakel zegt, dat de nekband van dichtbij meer bruin dan zwart is. Het tegendeel is echter waar. De nekband is juist volkomen zwart, ook wanneer men de vogel in de hand heeft. Jammer, dat de heer Brakel een van de belangrijkste kenmerken: de zwarte buitenvlag van de buitenste grote slagpen, vergeet te noe-

De *Ross' meeuw* naar een tekening van de heer M. J. C. Kolvoort

men.

Mijn eerste waarneming van de *Ross' meeuw* dateert van 6 juni 1958. Op 15 juni j.l. nam de heer Brakel de *Ross' meeuw* waar. Allebei hielden wij het in het begin op een afwijkende vorm van de *dwergmeeuw*. Op 17 juni echter kreeg ik toevallig „The Handbook of British Birds” in handen en vermoedde toen pas met de *Ross' meeuw* te doen te hebben. Samen ben ik toen met de heer Brakel opnieuw naar de *Ross' meeuw* geweest. Alle in het „Handbook” genoemde kenmerken, konden we min of meer goed zien, behalve de wigvormige staart en de zwarte buitenvlag. Op 23 juni werden waarneming en determinatie bevestigd door Dr. Kluyver uit Arnhem. Enkele dagen daarna slaagde ik erin de meeuw te vangen. De metingen, die er op volgden werden niet met Dr. Kluyver verricht. Voor verdere gegevens over de waarneming van de *Ross' meeuw* mag ik verwijzen naar een van de eerstvolgende „Limosa's”.

ARIE SPAANS

Het meeuwje is later dood aangetroffen, in een toestand, die het mogelijk maakte het lijkje te conserveren. — Red.

Ibissen

Op 23-8-1958 zat reeds $\pm$ 4 weken een *ibis* in west Zeeuwsch-Vlaanderen (B. J. J. R. Walrecht).

Ook in Oostelijk-Flevoland werd eind augustus 1958 door verschillende waarnemers een *ibis* waargenomen (Dr. Bakker, Wolff), later zelfs twee exemplaren. De vermoedelijk eerste waarneming van 1 ex. langs de Knardijk werd gedaan door Dr. Ir. J. E. Carrière op dinsdag 19 augustus.

Albino grutto

Langs de Knardijk tussen Harderwijk en Lelystad nam Dr. J. A. Smits een volkomen *witte grutto* met een rode snavel waar op 4-9-1958.