

# Broedvogels van CASTRICUMS DUIN (II)

Door V.W.-groep Castricum

Om in het bezit te komen van vergelijkende gegevens ten opzichte van 1958, hebben wij in de lentes van 1959 en 1960 het in 1958 geïnventariseerde gedeelte van het Noordhollands Duinreservaat opnieuw onder de loupe genomen. Tevens voegden wij na 1958 nog enkele terreintjes aan het toen onderzochte gebied toe, waarvan kon worden verwacht, dat deze — uit onze interessefeer bezien — een aardig resultaat konden opleveren,

Evenals in 1958 inventariseerden wij minstens éénmaal per week en wel hoofdzakelijk in de vroege ochtenduren in de periode van 20 maart t/m 14 juni 1959 en in 1960 van 13 maart t/m 6 juni. In 1959 werden per groepje deelnemers(sters) gemiddeld 13 wandelingen gemaakt en in 1960 16 wandelingen. Er werd wederom dezelfde telmethode gevolgd als in 1958, nl. die van zingende mannetjes.

Hieronder laten wij het resultaat volgen van de broedvogeltellingen in 1959 en 1960. Omdat de beschikbare plaatsruimte niet toelaat om ook de cijfers, verkregen uit de in 1959 en 1960 toegevoegde terreinen te vermelden, volstaan wij ermede, in het onderstaande lijstje die gegevens op te nemen, die betrekking hebben op het ook in 1958 onderzochte gebied.

	1959	1960
<i>wilde eend</i>	1	
<i>sperwer</i>	1	
<i>holenduif</i>	1	3
<i>houtduif</i>	4	7
<i>tortelduif</i>	3	4
<i>koekoek</i>	1	1
<i>ransuil</i>		2
<i>nachtzwaluw</i>	1	
<i>groene specht</i>		1
<i>grote bonte specht</i>		2
<i>boompieper</i>	1	1
<i>witte kwikstaart</i>	1	
<i>winterkoning</i>	12	21
<i>heggemus</i>	5	10
<i>grote lijster</i>	5	6
<i>zanglijster</i>	11	16
<i>merel</i>	11	19
<i>gekraagde roodstaart</i>	8	13
<i>nachtegaal</i>	11	18

<i>roodborst</i>	31	35
<i>bosrietzanger</i>		1
<i>spotvogel</i>	2	
<i>zwartkop</i>	4	8
<i>tuinluis</i>	14	19
<i>grasmus</i>	8	14
<i>braamsluiper</i>	1	
<i>litis</i>	99	99
<i>tijftjaf</i>	7	9
<i>luis</i>	2	2
<i>goudhaantje</i>		3
<i>grauwe vliegenvanger</i>	3	2
<i>koolmees</i>	33	31
<i>pimpelmees</i>	12	13
<i>glanskopmees</i>	2	2
<i>staartmees</i>	2	4
<i>boomkruiper</i>	1	1
<i>geelgors</i>		1
<i>groenling</i>	2	
<i>Europese kanarie</i>	1	
<i>vink</i>	22	30
<i>spreeuw</i>		2
<i>wielewaal</i>	1	1
<i>kauw</i>		1
<i>Vlaamse gaai</i>	2	1

broedparen: 326 403


Het grootste gedeelte van de in de voorgaande lijst genoemde vogelsoorten kwam tevens voor in de in 1959 en 1960 toegevoegde percelen.

Doch daarenboven kon in die terreinen ook nog de aanwezigheid (als broedparen) worden vastgesteld van de volgende 18 soorten: *dodaars, ekster, graspieper, houtsnip, huismus, Kievit, kneu, paapje, ringmus, roodborsttapuit, schol-ekster, sprinkhaanrietzanger, stormmeeuw, tapuit, veldleeuwerik, velduil, wulp en zilvermeeuw.*

Het volgende staatje geeft aantallen broedparen en soorten weer:

	broedparen	soorten
Terrein 1958	284	38
Terrein 1958, weer geteld in 1959	326	36
Terrein 1958, weer geteld in 1960	403	36

Onze inventarisaties 1959 en 1960 leverden dus in totaal 44 + 18 = 62 soorten op plus het niet in cijfers uit te drukken genoegen, dat wij met z'n allen aan het werk beleefden



**Groenlandse Tapuit**

**(Foto Eric Hosking)**