

Overzicht van enkelen opvallende vogelsoorten

Door Jaap Taapken

Eind juni/begin juli was er opvallend veel beweging onder de *zwarte sterns*. (o.a. O. Flevo-land). Ook trokken toen alweer de eerste *kieviten* r. ZW. Eind juli begon reeds de eerste *bonte vliegerwangertrek* (28/7 Vinkeveen) en deze werd op vele plaatsen op de Waddeneilanden en in het westen van ons land opgemerkt tot midden september.

Lepelaars hielden zich tot in augustus op vele plaatsen langs de Wadden- en IJsselmeerkust, Zeeland, Zuidholl. eilanden en in Noord- en Zuidholland op. Vanaf 10/9 werd hier en daar (Aalsmeer, Leimuiden, Kudelstaart: 22, 23, 26, 28/9, 14, 22, 25/10; Eemmond 10/9, 19/9 en vooral 2 & 3/10; Hoophuizen 16/10) een zwakke *pimpelmezentrek* waargenomen w.o. zich ook enkele *kool-* en *zwarte mezen* bevonden. Ook werd de *mezentrek* gemeld uit Papendrecht (15/10 168 ex. in 21 tr.), Renesse (2/10 40 ex. in 3 tr. en later op de dag sterke trek), Heerlen (3 & 6/10 resp. 50 & 40 ex.) en Oldeholtpade en Tzummarum (16/10 kleine aantallen). Doortrekkende *blauwborsten* werden gezien vanaf 20/8 tot 22/9 (Eemmond 20/8 1, 1/9 1, 9/9 2, 11/9 3; A'damse Bos 10/9 1; Numansdorp 28/8 1).

In de derde week van september verminderde het aantal *boerenzwaluwen* snel, op 4/10 nog $\pm$ 150 ex. bij Leimuiden, daar 12/10 nog 5 ex. Eind juli waren de meeste *gierzwaluwen* reeds verdwenen, 15/9 nog 1 ex. A'dam O., 18/9 3 ex. Haamstede, 9/10 enkele Bloemendaal af Zee, 28/10 2 ex. Harderwijk.

Over het algemeen was de terugtrek van vele zangvogels niet zo enorm als verleden jaar. Hoogstwaarschijnlijk zijn vele soorten vroeger weggetrokken dan verleden jaar, wellicht mede door het mislukken van vele legfels.

Enkele late zangvogeldata: *tuinfluit* (Texel 24/10); *bosrietzanger* (Eemmond 3/10); *koe-koek* (Eemmond 18/9); *snor* (Eemmond 18/9); *kleine karakiet* (Eemmond 2/10); *braamsluiper* (Eemmond 11/9); *tijftjaaf* (Texel 22/10 3, 19/10 3, Wassenaar 7, 8, 9 & 10/10 telkens ander ex.); *zwarte roodstaart* (Wassenaar 20, 26 & 27/10 telkens 1 ex.).

Op 21/9 zette de *vinke-* en *sijzentrek* in, ofschoon diverse zomerwaarnemingen van de *sijf* (Vlieland, Apeldoorn) bekend werden. Door de vele oostenwinden was er in september en oktober minder van de najaarstrek merkbaar dan anders. Midden oktober verschenen de eerste aanzienlijke troepen *vinke* en *kepen* onder de dit jaar goed vruchtdragende beukenbomen.

Eind september had een vrij sterke *zanglijster-* trek plaats, waarna ook de *koperwieken* volgden (eerste Breda 26/9 sterke dagtrek in het westen van ons land in de 2e week van oktober, sterke nachttrek o.a. op 24, 29 & 30/10. De *kramsvogels* trokken toen ook in aantal door, zich tegoed doende van de enorme vruchtenrijkdom van dit najaar. (eerste Wassenaar 16/9;

AW-duinen 17/9), en sterke doortrek van *me-reis* en *roodborsten* viel vooral eind september en in de 3e en 4e week van oktober op. Begin oktober trokken de eerste *beflijsters* door (Oosterend, Tersch. 1/10 paartje; De Beer 1/10 zeker 10, 2 & 8/10 1; Renesse 5/10 1; Wolfaartsdijk Z. 11/10 1.).

Aankomstdata: *keep* (A'dam 21 & 27/9; Terschelling 26/9; Wassenaar 26/9); *kleine barm-sijs* (Wassenaar 14/10 2 waarna tot in nov. zwakke doortrek); *ijsgors* (Bloemendaal 18/9 & 26/9; Wassenaar 29/9 waarna regelmatig tot in oktober); *bonte kraai* (Ermelo 24/9 8; Zwarte Haan Fr. 4/10 14; 15/10 eerste exx. op Schouwen, waarna tussen 16 & 20/10 veel exx. doortrokken o.a. Bloemendaal, Wassenaar, O. Flevo-land); *kleine zwaan* (Oude Mirdum 1/10 4; Ermelo 2/10 33; Eemmond 16/10 $\pm$ 300; *fraier* Wassenaar 21/10; 22/10 Ketelhaven (bij Wilhelmshaven arriveerden de eerste op 13/10); *sneeuwgors* (Haamstede 25/9 2; Oosterend, Tersch. 28/9; *pestvogel* Stavoren 31/10 2).

In Oostelijk Flevo-land vertoonden zich in de nazomer weer vele ralachtigen en *grauwe franjepoten*. In september waren er reeds vele *grauwe ganzen*, later ook *kolganzen*. *Geoorde futen*, *dodaarsjes* en *futen* kwamen er in groot aantal op doortrek, terwijl enorme vluchten *pijlstaarten*, *talingen*, *smienten* verschenen. In oktober waren de eerste *brilduikers* en *toppereenden* terug en werd het aantal *kuif-* en *tafeleenden* groter.

Aan de Noordzeekust werden vele jagers waargenomen: *grote jager* (AW-duinen 10/9; Scheveningen 12/9; Castricum 18/9 2; IJmuiden 22/9 1; Castricum 1 & 9/10 1); *middelste jager* (De Beer 4/9 1; Scheveningen 14/9 2, 15/9 1, 16/9 1; Castricum 12/9 1; Castricum 14/9 1; IJmuiden 25/9 1), *kleine jager* (Boschplaat, Tersch. 22/8 1; Haamstede 31/8 6; Bloemendaal 18/9 5; Bloemendaal 24/9 ziek geringd ex. op 12/9 bij Cap Gris Nez met Franse ring; IJmuiden 25/9 2 1e j.). Ook hierna kwamen nog vele waarnemingen binnen.

Ook *Jan van Gent* (b.v. 18/9 60 ex. in 1½ uur langs strand Zandvoort, Hoek van Holland 2/10 2, 9/10 1; Serooskerke 15/10 1) en *dwergmeeuwen* nam men op vele plaatsen langs de kust waar.

Vanaf einde juli tot laat in het najaar werden van vele plaatsen *ijsvogels* gemeld, die zich daar korte of langere tijd ophielden. Doortrek had vooral plaats gedurende augustus/september. Van eind augustus tot ver in september trokken dit jaar de *visarenden* door. (Harderwijk, Horloo 27/8; Bakkum 28/8; Veluwemeer 5/9; AW-duinen 10/9 2, 17/9 2, 18/9 1, 24/9 1, 24/9 1; Baardwijk, Waalwijk 18/9 1 met vis; Hoophuizen 25/9 eerste ex.)

(Gegevens voor deze rubriek dienen vóór 10 januari te worden toegezonden aan J. Taapken, Utrechtsestraatweg 43 te Hilversum, om nog in het eerstvolgende nummer te kunnen worden opgenomen.)



Broeden van torenvalken in nestkasten

De heer J. Renooy te Oostwoud (NH) schrijft: In de laatste week van november 1959 hing ik een nestkast van het halfopen model (Het Vogeljaar jrg. 6 - nr. 1) op. De plaats was wel zeer geschikt n.l. de staart van een ijzeren windmolen ongeveer 10 meter van de grond en midden in het weidegebied om ons dorp Oostwoud. De kast werd zodanig bevestigd dat, doordat de molen met de wind meedraaide, hij zich altijd met de opening uit de wind bevond. Begin maart 1960 bracht ik een flinke laag turfmoel aan. Bij controle op 11 april vloog een mannetje torenvalk alarmerend rond, zodat ik goede hoop op succes had. In het laatst van april volgden schermutselingen met kraaien om het bezit van de molen, maar op 6 mei vond ik toch één ei. Het legsel groeide uit tot zes eieren welke om de dag werden gelegd. Op 12 juni lagen er drie donsjongen, met een gering verschil in grootte, één nat jong en twee eieren in de kast. Hieruit blijkt dus dat reeds vanaf het eerste of tweede ei met broeden is begonnen. Alle zes eieren zijn uitgekomen en de jongen zijn op ± 17 juli uitgevlogen. De jongen groeiden voorspoedig op maar het verschil in grootte bleef tot op het laatst zichtbaar. De heer Heddes uit Egmond heeft de zes jongen geringd. Tenslotte nog enkele aantekeningen: Ongeveer eenmaal per week controleerde ik de kast, waarbij ik slechts eenmaal twee vogels heb gezien, meestal begon het mannetje te alarmeren als ik de molen tot op ongeveer 100 meter was genaderd. Dit bleef doorgaan tot ik weer op weg was. Door de eigenaar van het weiland werd één keer gezien dat één der vogels een jonge scholekster sloeg en die met zichtbare moeite naar het nest bracht. Dit was nog tijdens het broeden. Ikzelf vond eenmaal resten van een vogel in de kast. In de door mij onderzochte braakballen vond ik echter alleen resten van muizen. Het resultaat is van dien aard geweest, dat ik het aantal kasten in samenwerking met anderen tot drie wil uitbreiden.

Ook de heer Bouwman uit Stein (L.) heeft, samen met de heer Timmer een nestkast opgehangen bij het huis van de heer Timmer. Op 2e Kerstdag 1959 werd de kast opgehangen op ± 15 meter hoogte op 150 meter van zijn huis. Reeds in februari werden er torenvalken bij waargenomen. Eind maart begin april waren er regelmatig twee torenvalken bij. Begin mei lagen er 5 eieren in en op 25 mei waren er 5 jongen. Eén ervan was aanzienlijk kleiner. Zij zijn bijna 6 weken in de kast gebleven en begin juli zijn zij uitgevlogen. Het was aardig om

te zien hoe ook de kleine groot gekomen is en goed is uitgevlogen. Uit voorzichtigheidsoogpunt zijn de jongen niet geringd, daar dit moeilijk op zo'n grote hoogte kon gebeuren. Ook nu (november 1960) is de torenvalk geregeld bij de kast, zo schrijft de heer Bouwman.

De plaats waar de kast hangt is te Daniken, gemeente Schinnen (L.).

Ook het Jaarverslag over 1960 van het Centraal Nestkast Onderzoek door Kees Stam in het Waterwingebied van de Duinwaterleiding van 's Gravenhage, Meijndel, Kijfhoek, Bierlap en de Plas maakt gewag van succesrijk broeden van de torenvalk in één van beide torenvalkkasten die daar opgehangen werden. Vier jongen werden met succes grootgebracht. Ook in 1959 broedde in één der kasten een torenvalk waarover K. Stam schreef in „Het Vogeljaar“ (jaargang 7 - blz. 159).

Op een bijeenkomst van de Oecologische Kring der Ned. Orn. Unie op 19 nov. te Leiden, hield Drs. A. J. Cavé een voordracht over de proeven met nestkasten voor torenvalken in de polder Oostelijk Flevoland (zie ook Het Vogeljaar 1959, blz. 153 e.v.). Op drie proefterreinen, resp. nabij Lelystad, Harderwijk en het gemaal Colijn werden in totaal 243 nestkasten opgehangen. In 109 hiervan werden eieren gelegd, doch in 10 nestkasten werd niet gebroed. Van de 562 eieren in de resterende 99 legfels kwamen er 432 uit. Van de jongen verdween 16.7 pct. vóór het uitvliegen. Het is wel zeer opmerkelijk dat in een biotoop, waar zonder de nestkasten vermoedelijk in het geheel geen torenvalken zouden broeden, een zo hoge concentratie van broedparen kon worden bereikt (bij Harderwijk zelfs 49 legfels in 81 nesten!). Ongetwijfeld zal voortzetting van deze proef nog interessante gegevens opleveren.



Verspreiding van de Turkse tortel in Nederland

Geregeld lezen wij in onze tijdschriften vermeldingen van waarnemingen van Turkse tortels in ons land. Zo ook op blz. 111 van Het Vogeljaar 1960.

Ik vraag mij af of deze losse vermeldingen nog wel zin hebben, wanneer wij zien, dat de soort in bijna alle dorpen en steden in Oost-Nederland voorkomt.

Om een paar voorbeelden te noemen uit mijn naaste omgeving vermeld ik de volgende aan elkaar grenzende plaatsen.

Almelo: 5 november 1960 op een dak 75 exemplaren bij elkaar.

Wierden: In september de soort ontdekt, die er de hele zomer volgens mededelingen heeft vertoefd en zeer waarschijnlijk gebroed. Max. 6 ex. gezien.

Rijssen: Volgens gegevens al meerdere jaren broedvogel.

Enter, gemeente Wierden: Dit jaar de soort ontdekt, doch toen werd mij verteld, dat de vogels er al enkele jaren broeden.

Holten: Volgens gegevens van Piet Bos thans ook broedvogel.

Voegen wij daarbij gegevens over Oldenzaal, Hengelo, Haaksbergen en andere plaatsen waar het voorkomen van de *Turkse tortel* in de laatste jaren werd waargenomen, dan geloof ik niet, dat ik teveel zeg, wanneer ik de stelling poneer dat de soort hier werkelijk algemeen is. Dit wil niet zeggen, dat het geen zin heeft het verloop van de uitbreiding over ons land nauwlettend gade te slaan en vast te leggen. Het blijft een hoogst merkwaardig verschijnsel.

Mr. E. D. Maaldrink

(Inderdaad heeft de *Turkse tortel* in ongeveer tien jaar tijds op vele plaatsen vaste voet gekregen. Toch is de verspreiding zeer interessant. Uit de gegevens van Mr. Maaldrink blijkt wel, dat deze soort een groot deel van Twente bewoont. Een andere „haard” vinden we in Ermelo, Harderwijk, Hierden en Nunspeet. Maar in het nabij Ermelo gelegen Putten zijn de vogels voor zover wij weten, nog niet gesignaleerd. Omtrent het voorkomen in Doornspijk, Elburg, Oldebroek en Wezep hebben wij geen recente gegevens. Men krijgt, als men de merkwaardige verspreiding van deze soort over Europa beschouwt, de indruk dat telkens kernen worden gevormd, waarna de soort zich vele tientallen kilometers verplaatst, een nieuwe kern vormt, enz. De tussenliggende gebieden worden dan vaak niet betrokken, zonder dat hiervoor voor de hand liggende oorzaken kunnen worden genoemd.

Het zou ongetwijfeld nuttig zijn als iemand de tijd kon vinden om te trachten, alle gegevens omtrent het voorkomen en de verspreidingsgeschiedenis in Nederland te verzamelen. Waarbij het interessant zou zijn te onderzoeken, of verwante soorten als de gewone *tortelduif* en b.v. de *houtduif* door voedselconcurrentie hinder ondervinden. De gewoonte van de *Turkse tortels* om hun voedsel vrnl. in kippenhokken te zoeken, maakt dit onwaarschijnlijk, wat zelfs een reden kan zijn van het welslagen van de kolonisatie op vele plaatsen. Wanneer een dergelijk onderzoek ooit ter hand kan worden genomen, zullen de door publikatie vastgelegde gegevens over het voorkomen wellicht toch hun nut hebben. — Red.)

Centraal kaartsysteem voor avifaunistische gegevens

Het zojuist verschenen no. 3-4 van de 33e jaargang van „*Limosa*”, orgaan van de Nederlandse Ornithologische Unie bevat een bijlage, waarop mededelingen worden gedaan over een door het bestuur van de Unie ontworpen systeem voor unificatie van vogelwaarnemingen. Deze kunnen voortaan worden ingezonden op voorgedrukte kaarten waarop alle gegevens

die voor het beoordelen van een waarneming van belang zijn, overzichtelijk zijn gerubriceerd. Deze kaarten dienen in tweevoud te worden ingezonden. Belangrijk is, dat de voornaamste gegevens van de kaarten op ponskaarten zullen worden overgebracht, zodat later snel en machinaal gewenste overzichten kunnen worden verkregen.

Er wordt op gewezen, dat niet alleen opgaven omtrent dwaalgasten op prijs worden gesteld, doch ook b.v. omtrent het aantal broedvogels in een bepaalde streek, die werd geïnventariseerd. Daardoor zal op den duur een inzicht worden verkregen in de verspreiding van bepaalde soorten.

De kaarten zijn, ook voor niet-leden van de Unie, per pakje van 100 stuks verkrijgbaar door overschrijving van f 2,— op postrekening 25 71 07 van de secretaris van de Unie: M. J. Tekke, Harderwijkstraat 136 te 's-Gravenhage. Wij vertrouwen dat, althans bij een eerste bestelling, een exemplaar van de handleiding voor het invullen van de kaarten zal worden bijgevoegd.

Het lijkt bijzonder nuttig, dat op deze wijze een centraal kaartsysteem van avifaunistische gegevens kan worden gevormd en wij missen slechts een mededeling op welke wijze en in welke mate dit systeem voor serieuze belangstellenden toegankelijk zal zijn. — Red.



VRAAG EN AANBOD

GEVRAAGD: „Kennzeichen für Alter und Geschlecht bei Sperlingsvögeln” door Prof. Dr. R. Drost. Uitg. Vogelwarte Helgoland.

„Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelpflege”, door Dr. W. Sunkel.

Aanbiedingen aan H. F. Arentsen, Wijttenbachstraat 36a, Amsterdam-O.

GEVRAAGD: Van serie „Wat leeft en groeit”; „Vogels van polder en weide”; „Vogels van akker en struikgewas”; „Vogels van heide en stuifzand”; „Vogels van dennenbossen”; „Vogels van moeras en rietland”.

Br. met prijsopgaaf aan G. J. Peteri, Pikeursbaan 42, Deventer.

Vroeg merelbroedsel

Op 9 februari 1960 werd mij verteld, dat een vogel zijn nest had gebouwd op een lichtreclame van het winkelcentrum Lijnbaan (No. 84), in het hartje van Rotterdam.

Toen ik de volgende dag ter plaatse kwam, zag ik dat het een broedende merel was. Het nest bevond zich op ongeveer 2½ meter hoogte. Aangezien het wijfje vast broedde mocht ik afleiden, dat het legsel al compleet was. Dit klopte ook wel, want op 26 februari zag ik het wijfje de jongen voeren. Ik telde er 3. Ik heb mij afgevraagd hoe de vogels voor zichzelf en hun kroost voldoende voedsel konden bemachtigen in deze omgeving. Weliswaar zijn er in de Lijnbaan hier en daar kleine bloemperkjes, doch deze zijn slechts enkele vierkante meters groot. Niettemin groeiden de jongen gestadig. Op 11 maart bevonden ze zich nog in het nest. Toen ik 3 dagen later nog eens ging zien of de jongen al waren uitgevlogen bleek helaas, dat het nest verdwenen was. De winkelchef vertelde mij, dat de jongen met nest en al 's avonds de 12de maart waren geroofd. A. de Jong.

Slachtoffers van hoogspanningsdraden bij Nijmegen

In het mei-nummer van deze jaargang (blz. 25) werd een eerste mededeling gedaan over aantallen slachtoffers van hoogspanningsleidingen, die nabij Nijmegen werden geteld in de periode 14 sept.-23 nov. Inmiddels is dit onderzoek tussen 24 febr. en 31 maart voortgezet.

Meestal werden alleen maar vleugels en wat veren gevonden, vermoedelijk doordat zich veel kraaien en roofvogels in het gebied ophouden. Ook viel het vaak op, dat de resten werden gevonden in meidoornbosjes onder of schuin onder de draden. Op 3 maart werden erg veel slachtoffers gevonden, vooral in de bosjes.

De nauwkeurige cijfers zijn:

Kabel I. 24 febr.: 2 wilde eenden ♀♀, 1 veldleeuwerik, 1 waterhoen; 3 maart: 1 kievit, 2 merels, 1 meerkoet, 6 spreeuwen; 10 maart: niets gevonden; 17 maart: 1 waterhoen, 23 maart: 1 spreeuw; 31 maart: niets gevonden.

Kabel II. 24 febr.: 1 stormmeeuw; 1 houtduif; 2 kokmeeuwen; 1 waterhoen; 3 maart: 2 merels; 10 maart: niets gevonden; 17 maart: 1 spreeuw, 1 witte kwikstaart; 23 maart: 1 houtduif; 31 maart: niets gevonden.

Kabel III. 24 febr.: niets gevonden; 3 maart: 2 merels, 6 spreeuwen, 2 kokmeeuwen; 10 maart: 1 merel, 4 spreeuwen, 1 kokmeeuw; 17 maart: 5 spreeuwen, 1 merel, 1 kokmeeuw, 1 waterhoen; 23 maart: 5 spreeuwen 1 merel, 1 houtduif; 31 maart: niets gevonden.

Olaf van Hoorn

Ook uit deze cijfers blijkt weer hoe gevaarlijk de hoogspanningsleidingen zijn. De hierover bekende gegevens zijn nog te gering in aantal, zodat wij graag, ook namens het RIVON, nog eens een dringend beroep doen op werkgroepen en individuele waarnemers om dit onderzoek ter hand te nemen, waarbij vooral reeksen waarnemingen van belang zijn. — Red.

Ooievaars in Friesland

De heer G. Bosch te Giekerk van de B.F.V.W.

berichtte ons naar aanleiding van het artikel van de heer Schuilenburg over de ooievaars (Het Vogeljaar jrg. 8, 3/4, blz. 40), dat in 1959 niet 2, maar 5, volledig bezette nesten in Friesland zijn geweest. Inmiddels is bekend geworden dat in 1960 niet 2 maar 3 broedparen in Friesland waren, die met goed resultaat broedden.

Drie broedsels van kerkuil

Over de kerkuil vermeldt de literatuur (voor zover ik die kan nagaan) één à twee broedsels per jaar. In Haskerhorne broedde op een boerderij dit jaar een kerkuil driemaal, namelijk in april, in juni en in augustus/september. Alle broedsels zijn uitgevlogen. Volgens de boer was dit het vorige jaar ook het geval. Zijn er meer lezers die dit wel eens constateerden?

H. T. van der Meulen

Witte spreeuwen bij Gouda

Tijdens een wandeling tussen Gouda en Schoonhoven met een groep natuurvrienden heb ik aan de Goudscheweg bij Beiersche een totaal witte spreeuw waargenomen tussen de honderden spreeuwen die zich daar ophielden.

J. J. v. d. Hooft

In de „Goudsche Courant” van 8 november 1960 vonden wij merkwaardigerwijze, in de rubriek „Uit vroeger tijden”, onder het hoofdje „50 jaar geleden” het volgende bericht:

„Uit Lekkerkerk: Iedere avond komen in en om de eendekooi naar gissing meer dan een half miljoen spreeuwen hun nachtrust zoeken. De vogels splitsen zich in twee afdelingen. In elke groep bevindt zich één sneeuw witte spreeuw die ogenschijnlijk als de aanvoerder geldt, want altijd zijn de witte vogels het middelpunt van de grote zwermen.”

Kemphanen „schuilen” bij spreeuwen-troep

Op 17 september joeg bij de Knardijk een sperwer op een troep spreeuwen. Bij deze troep voegden zich 7 kemphanen. Vijf van de kemp-

hanen verloren kort daarna weer het contact, de overblijvenden manoeuvreerden enige minuten in de snel zwenkende bolvormige troep mee, totdat de *sperwer* van de achtervolging afzag.

J. v. d. Brom
J. v. d. Elst
H. Hessels
J. v. Tussenbroek

Gegevens gevraagd voorkomen van de ijsvogel

Door de vervuiling van de Europese wateren wordt de *ijsvogel* (*Alcedo atthis*) steeds meer in voedselnood gebracht, daar de vis (hoofdvoedsel) er niet meer in kan leven. Hierdoor wordt deze vogelsoort gedwongen zich terug te trekken op plaatsen waar ze niet gewent is, zoals op viskwekerijen. Op de „Jahrestagung“ der Duitse sectie van de Internationale Unie voor toegepaste ornithologie werd dit probleem besproken en besloten een census te houden door geheel Duitsland. Voor Nederland zal het

R.I.V.O.N., in samenwerking met het Dienstvak Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Vogelbescherming gegevens verzamelen. Opgaven omtrent broedgevallen zowel als van doortrekkende of overwinterende vogels worden gaarne ontvangen door het R.I.V.O.N., Soestdijkseweg 33 Nrd te Bilt-hoven. Zowel recente als betrouwbare oudere gegevens zijn welkom.

„Ringelen“ van spechten

Een lezer uit Oost-Vlaanderen wil graag in verbinding komen met een Nederlandse waarnemer van spechtvogels, om zijn studie over het „ringelen“ uit te breiden op Europees plan. Kleine waarnemingen zijn eveneens welkom. J. E. Sluiter vermeldt in zijn *Prisma Vogelboek* over de *zwarte specht*: „Drinkt in het voorjaar sap (hars) van bomen zoals *grote bonte specht*. Gaat spiraalsgewijze als deze om stam. Ook sap uit verse boomstronken.“ Gaarne correspondentie aan Brusselse Steenweg 320 d, Melle, België.

EEN BELANGRIJKE WAARNEMING

Dit jaar hebben we enkele belangrijke waarnemingen gedaan, n.l., dat er nog steeds verenigingen of groepen van vogelvrienden zijn, die aan de uitgave van „Het Vogeljaar“ geen deel hebben. Wie er de eerste jaargangen, toen nog onder de naam „Wiek en Sneb“, op naslaat en een vergelijking treft met ons tijdschrift van thans, bemerkt toch welk resultaat door samenwerking en goede verstandhouding is verkregen. Zij, die er aanvankelijk aarzelend tegenover stonden, zijn nu enthousiast Alhoewel, het moet nog beter en het kan ook beter!

U hebt kritiek? Dat is best en bovendien gezond. Wilt U echter met die kritiek het geoogde doel bereiken, dan moeten we er met elkaar eens over praten. Wij zijn bereid.

Staat de naam van Uw vereniging niet op de achterpagina van dit tijdschrift? Waarom niet? Het is toch voor Nederland uniek en belangrijk, dat reeds zoveel verenigingen meewerken aan de uitgave van één tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming.

U heeft andere opvattingen over vogelbescherming of vogelstudie? Dat is heus geen belangrijk bezwaar. We behoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Ook dit jaar hebben velen belangloos aan ons tijdschrift meegewerkt. Daarvoor onze hartelijke dank!

Het wachten is op U of Uw vereniging om een nog snellere uitbreiding aan „Het Vogeljaar“ te geven. Er zijn plannen en kansen genoeg.

Wanneer gaan we eens overleggen?

J.A.