

VERENIGINGSNIEUWS

Vereniging voor Vogelbescherming „'s-Gravenhage en Omstreken“

Excursieprogramma

Zondag 25 februari: Plassen van 's-Gravenzande, eventueel Noorderpier Hoek van Holland. Leider: J. S. Bakker, Buitenruststraat 1, Voorburg. Tel. 779304 (18—19 uur).

Zaterdag 10 maart 1962: Vogeltuin Bosjes van Poot. Verzamelen 10 uur bij ingang Laan van Poot t.o. Boomkruiperlaan. Einde plm. 11.30 uur. Leiders: A. Vink en A. v. d. Laan, Leeuwikplein 9, tel. 395309 (18—19 uur). Alleen voor hen, die nog geen bezoek aan deze vogeltuin brachten.

Zondag 18 maart 1962: Meyendel, Kijfhoek, Bierlap, duinwandeling, Verzamelen 9 uur Boerderij Meyendel. Einde plm. 13 uur. Leider: C. A. Regensburg de Mooy, Populierstraat 45, tel. 332428.

Zaterdag 31 maart 1962: De Beer. Leider: H. A. Koops, Generaal Spoorlaan 149, Rijswijk Z.H. tel. 183382 (9—17 uur) of 983658 (18—19 uur).

Zaterdag 14 april 1962: Ockenburg en omgeving. Verzamelen ingang park Monstersestraat, Loosduinen om 14 uur. Einde plm. 17 uur. Leider: J. P. Oppentocht, Vlierboomstraat 404, tel. 360606.

Introducees betalen voor alle excursies 50 cent, tenzij anders is vermeld.

Vogelcursus

Op de dinsdagen 20 februari, 6 maart en 20 maart 1962 wordt een vogelcursus gehouden in het Museum van Onderwijs.

Deze cursus zal vrijwel gelijk zijn aan die van het vorige jaar en wordt in het bijzonder voor de vele nieuwe leden herhaald.

Docenten: H. van Dongen, J. P. Oppentocht en C. A. Regensburg de Mooy.

Extra lezing

„Zwervend door Zweeds Lapland“ door J. P. Oppentocht (met kleurendia's) op woensdag 11 april 1962 in de grote zaal van het Museum v. h. Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2, Den Haag. Toegang voor leden f 1,—, voor introducees f 1,50.

Een zeldzame vogel in België gevangen ?

Volgens berichten uit enkele Vlaamse dagbladen schijnt er te Koksijde (België) een *witkopgors* (*Emberiza leucocephala*) gevangen te zijn door een zekere heer Maurice Gadeyne, veldwachter aldaar. De vogel werd door enkele Belgische ornithologen gedetermineerd als een *witkopgors*. Deze heren waren Fr. Grootaers, vrederechter uit Haacht en Fernand Florizoone uit Koksijde, die beiden verbonden zijn aan een bekend ornithologisch tijdschrift. Assistentie verleende E. H. A. Demary uit Brugge.

De betreffende vogel wordt in Oost- en Midden Azië gevonden en „overdekt in Midden- en W.-

Vogelbeschermingswacht „Zuid-West Veluwe“

Hartelijk dank aan allen, die hun donatie of contributie voor het jaar 1962 reeds per giro aan ons overmaakten. Indien u het nog niet gedaan heeft, doe het dan nog vóór 1 april a.s. Het bespaart u de kosten van incasso en ons de moeite. Ons gironummer? 95 99 92 Vogelbeschermingswacht „Zuid-West Veluwe“, Bennekom. Ook u bij voorbaat hartelijk dank.

Siberië het oostelijk broedgebied van de *geelgors*“ (Prof. Dr. K. H. Voous in „Atlas van de Europese vogels“).

Ik heb de gevangen vogel helaas nog niet gezien, zodat ik ook niet met zekerheid kan instemmen met het feit of er hier een zuivere *witkopgors* gevangen is.

Verdere publicaties betreffende deze vangst zijn, zover ik weet, nog niet gemaakt, zodat het mij nuttig voorkomt hierover even iets in „Het Vogeljaar“ te zeggen.

Mijn „zwakke“ twijfel betreffende de raszuiverheid ligt vooral in het feit, dat de *witkopgors* (broedgebied dus in Siberië) ook als bastaard veel gesignaleerd is. Uit onderzoekingen van Prof. Hans Johansen (ook Voous vermeldt dit in zijn hierboven genoemde Atlas) blijkt nl. overduidelijk, dat in de West en Midden-sector van Siberië vermenging van beide soorten (*geelgors* x *witkopgors* en omgekeerd) veelvuldig voorkomt. De overgangen van kleur en tekening van beide gorzen kunnen soms zeer sterk uiteenlopen.

Het biotoop van de *witkopgors* is bij voorkeur struikstappen en wouden. De *geelgors* houdt zich daarentegen voornamelijk op in niet te dichte bossen en is doorgaans een vrij constante — als ik dit zo eens noemen mag — standvogel. Belangrijk is ook, dat de *witkopgors* een uitgesproken trekker is. In de winter wordt hij dan ook regelmatig in Europa aangetroffen.

Terecht merkt Voous o.m. op naar aanleiding van bovengenoemde gegevens, dat „hier toch beide vormen in één soort verenigd zijn“. Hij vervolgt nl.: „Het aldus verkregen trans-palearticische verspreidingsgebied bestaat uit een Europese (*geelgors*) en een O.-Aziatisch (*witkopgors*) fauna-element. Door geografische isolatie en gelijktijdige morfologische differentiatie hebben deze vormen een ver gevorderd stadium in het proces van de soortvorming bereikt. Veelal worden zij tot aparte soorten gerekend“ (vetdruk van mij).

Het is dan ook te hopen, dat de aangetroffen vogel in elk geval een *witkopgors* is. De laatste maal, dat deze vogel in België (1 x) en Nederland gesignaleerd of gevangen is, is in 1911. De totale waarnemingen worden momenteel: België 2 x (nl. in 1911 en 1961 — november —) en Nederland 3 x (waarvan de laatste eveneens dateert uit 1911).

T.z.t. hoop ik over de *witkopgors* in dit blad nog nader te kunnen spreken.

Eindhoven.

THIJS VRIENDS Czn.