

# STEPPENKIEVIT

## in Noord-Holland

Door Mandemaker, Renooij en Top



Tekening Theo Mulder

Op 8 oktober 1961 werd te Opmeer (N.-H.) door leden van de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier een grauwbroune plevier gezien ter grootte van een *kievit*. Hij viel op door aan het achterhoofd in elkaar overgaande okerkleurige wenkbrauwstrepen, oogstreep, een wat minder donkere schedelkap, spitse zwarte snavel en zwarte poten. Bij opvliegen en vertoon van de witte staart kon hij met de „Vogelgids” als *steppenkievit* worden gedetermineerd.

Over de staart liep voor de eindrand een zwarte band, in het midden het breedst, naar weerskanten smal uitlopend en de zijden van de staart wit latend. De „Vogelgids” beschrijft de staart als wit met brede zwarte eindband.

In de vlucht vielen de witte spiegels en zwarte vleugelpunten op. Verder was de vleugel boven grauwbrown en onder wit. Voorhoofd, vleugel en keel waren grijs. Onder langs de toegevouwen vleugel liep een dunne zwarte rand. De onderzijde was wit. Bij aanval en verontrusting uitte de vogel een hees „èè”.

De roestige vlek tussen en een zwart vlekje naast de poten en de effen grijze borst wezen volgens de beschrijvingen in „De Nederlandsche Vogels” van Eykman c.s. en „The Handbook of British Birds” op een volwassen vogel, in overgang naar winterkleed.

De borstveren lagen niet glad tegen het lichaam, zodat de borst bij bepaalde lichtinval enigszins gespikkeld leek. Ook de vleugeldekken, die een dunne beige dwarsstreep droegen, hingen los over de toegevouwen vleugel.

De vogel was vrij mak en bleek sterk gebonden aan een bepaald gebied. Hij hield zich op in begraasd weiland en zocht op bedachtzame plevieremanager voedsel tussen het gras. Hij bevond zich tussen of nabij de *kieviten*, maar hield zich afzijdig. Soms viel hij hen aan, soms werd hij door hen aangevallen.

De heer De Vries, een nabij wonende visser en jager deelde mee de vogel omstreeks mei van dit jaar voor het eerst te hebben opgemerkt. De soort was hem tot nu toe onbekend.

Het is verheugend dat zulke zeldzaamheden tegenwoordig niet meer onmiddellijk worden afgemaakt. \* En voor belangstellenden was het een buitenkans de vogel van de weg af rustig te kunnen bekijken.

• Correspondentie-adres: E. J. W. Top, No. 105, Oudkarspel (N.H.)

\*) Het betreft hier de tweede waarneming van deze soort in Nederland. Het eerste exemplaar werd op 21 april 1925 in het Ossenbroek te Beers (N.B.) geschoten. Dat was een volwassen ♂. Volgens „De Nederlandsche Vogels” (blz. 777) omvat het broedgebied van deze soort Rusland en Azië van de 49ste tot de 54ste breedtegraad, oostelijk tot Saissant-Nor. Volgens Voous' „Atlas” overwintert de *steppenkievit* in subtropische en tropische gebieden van Z.W.- en Z.-Azië en N.O.-Afrika, doch niet zuidelijk van de evenaar.