

# De in EUROPA broedende ROOFVOGELS

		Ned.	F.-L.
Aasgier	<i>Neophron percnopterus</i>	0	a
Vale gier	<i>Gyps fulvus</i>	dg 4 (1)	a
Monniksgier	<i>Aegyptius monachus</i>	dg 1	a
Lammergier	<i>Gypaëtus barbatus</i>	0	a
Steenarend	<i>Aquila chrysaëtos</i>	dg 9 (3)	a
Keizerarend	<i>Aquila heliaca</i>	0	a
Steppenarend	<i>Aquila rapax</i>	0	?
Bastaardarend	<i>Aquila clanga</i>	og 13 (4)	a
Schreeuwarend	<i>Aquila pomarina</i>	dg 3	a
Havikarend	<i>Hieraaëtus fasciatus</i>	dg 1	a
Dwergarend	<i>Hieraaëtus pennatus</i>	0	?
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	br 50-250	s
Ruigpootbuizerd	<i>Buteo lagopus</i>	dt/wg 1-5000	s
Arendbuizerd	<i>Buteo rufinus</i>	dg 2	s
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	br 250-2500	a
Balkansperwer	<i>Accipiter brevipes</i>	0	a
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	br 50-250	a
Rode wouw	<i>Milvus milvus</i>	dt 152	a
Zwarte wouw	<i>Milvus migrans</i>	og 35	t
Grijze wouw	<i>Elanus caeruleus</i>	0	a
Zeearend	<i>Haliaëtus albicilla</i>	wg 1-100	a
Witbandzeearend	<i>Haliaëtus leucoryphus</i>	0	?
Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>	br 1-50	?
Bruine kiekendief	<i>Circus aeruginosus</i>	br 250-2500	a
Blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>	br 1-50	s
Steppenkiekendief	<i>Circus macrourus</i>	dg 10 (2)	t
Grauwe kiekendief	<i>Circus pygargus</i>	br 50-250	a
Slangenarend	<i>Circaëtus gallicus</i>	dg 1	?
Visarend	<i>Pandion haliaëtus</i>	dt 1-100	a
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	br 250-2500	s
Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	{ br 6 wg 1-500	a a
Lanner valk	<i>Falco biarmicus</i>	0	?
Saker valk	<i>Falco cherrug</i>	0	?
Giervalk	<i>Falco rusticolus</i>	2	a
Eleonora's valk	<i>Falco eleonorae</i>	0	s
Smelleken	<i>Falco columbarius</i>	dt/wg 500-1000	s
Roodpootvalk	<i>Falco vespertinus</i>	dg 7 (8)	t
Kleine torenvalk	<i>Falco naumanni</i>	0	s
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	br 2.500-10.000	s

Verklaring der tekens en afkortingen:

br = al of niet regelmatig in Nederland broedend; dt/wg = doortrekker en/of wintergast; dg = dwaalgast; og = onregelmatige gast; a = achteruit gaand; s = stationnair; t = toegenomen; ? = geen nauwkeurige gegevens bekend (deze laatste vier aanduidingen hebben betrekking op geheel Europa).

De aanduidingen van de aantallen zijn ontleend aan de „Avifauna van

(Lees verder op blz. 104)

(Slot van blz. 66)

Nederland" en geven voor de zeldzame soorten het totale aantal vondsten en waarnemingen (na 1900 en tot en met 1960), waarbij tussen haakjes het aantal onbevestigde waarnemingen is vermeld. Bij de algemenere soorten hebben de getallen betrekking op de categorieën, waarin de Commissie voor de Nederlandse Avifauna (C.N.A.) de doortrekkers en overwinteraars hebben ingedeeld. Dit zijn vrij ruime grenzen, waarvan de maxima voor onze roofvogels veel te hoog liggen. Dit geldt eveneens voor de in ons land broedende soorten.

Voor de Nederlandse broedvogels beschikken wij voorts over nog niet gepubliceerde cijfers van het RIVON, die betrekking hebben op een schatting nà het broedseizoen van 1962.

Deze zijn voor: *buizerd* 50-100 paren; *sperwer* 250-350 paren (een vermoedelijk te hoge schatting voor deze zeer sterk achteruit gegane soort); *havik* 40-80 paren; *wespendief* 15-20 paren; *bruine kiekendief* 150-200 paren; *blauwe kiekendief* 15-20 paren; *grauwe kiekendief* 40-50 paren; *boomvalk* 200-300 paren; *torenvalk* meer dan 2.500 paren.