

Broedvogelinventarisatie van de Fuut

(In samenwerking met het RIVON te Zeist)

Uit onderzoekingen in Engeland is gebleken, dat de fuut uiterst gevoelig is voor verontreiniging door pesticiden etc. van het water in zijn biotoop.

In verband met eventueel te nemen beschermingsmaatregelen is het daarom van belang te weten waar de fuut een algemeen broedende soort is en waar niet. Daarom wordt in Nederland door het Contactorgaan van Vogelwerkgroepen, in samenwerking met het RIVON, in 1966, 1967 en 1968 (dus voorlopig voor drie jaren) een onderzoek ingesteld naar de verspreiding en de broedvogelpopulatie-dichtheden van de fuut in Nederland. Tot dusver ontbreken uit Nederland nauwkeurige gegevens over het totaal aantal broedparen, terwijl eveneens slechts globaal bekend is in welke gemeenten de fuut als broedvogel wordt aangetroffen. Op het verspreidingskaartje zijn stippen gezet in die gemeenten, waar de fuut als broedvogel zou voorkomen. De vraagtekens op het kaartje spreken voor zichzelf.

In onderstaande gemeenten, gerangschikt per provincie is de fuut vrijwel zeker broedvogel, doch over het aantal broedparen is niets bekend!

NOORD-HOLLAND: Aalsmeer, Akersloot, Amsterdam, Andijk, Anna-Paulowna, Assendelft, Avenhorn, Bovenkarspel, Broek in Waterland, Edam, Enkhuizen, Graft, Grootebroek, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Hilversum, Hoorn, IJpendam, Jisp, Katwoude, Kortenhoef, Landsmeer, Medemblik, Monnikendam, Naarden, Nederhorst den Berg, Nieuwer Amstel, Oosthuizen, Oostzaan, Oudendijk, Ouder Amstel, Purmerend, Schellinkhout, Texel, Uitgeest, Venhuizen, Weesperkarspel, Wervershoof, Westzaan, Wieringen, Wieringermeer, Wormer, Wijdenes, Zaandam.

ZUID-HOLLAND: Alblasterdam, Alkemade, Alphen aan de Rijn, Arkel, Asperen, Bergschenhoek, Bleskensgraaf, Brandwijk, Giessenburg, Gorinchem, Goudriaan, Heukelum, Kedichem, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lekkerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuwkoop, Nieuw Lekkerland, Noordeloos, Oegstgeest, Ottoland, Oud Alblas, Ouderkerk aan de IJssel, Reeuwijk, Rotterdam, Rijnsaterwoude, Sliedrecht, Stolwijk Streefkerk, Warmond, Woubrugge, Zevenhuizen.

UTRECHT: Abcoude, Breukelen, Bunschoten, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, Maarssen, Maartensdijk, Rhenen, Vinkeveen, Vreeland.


NOORD-BRABANT: Engelen, 's-Hertogenbosch, Ossendrecht, St. Michielsgestel, Vlijmen, Vught, Werkendam.

BROEDGEBIEDEN VAN DE FUUT (PODICEPS CRISTATUS)

● In betreffende gemeenten of gebieden vrijwel zeker broedvogel. (Aantal broedparen onbekend)

? Gemeenten of gebieden met vermoedelijk geschikte Futen biotopen. Gegevens van broedgevallen onbekend of twijfelachtig.

{ uit de overige gemeenten geen gegevens bekend



(voorlopige census 1965)



OVERIJSEL: Blokzijl, Genemuiden, Giethoorn, Kampen, Kuinre, Noordoostelijke Polder, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Vollenhove, Waneperveen, Zwartsluis, Zwollerkerspel.

GELDERLAND: Beesd, Buurmalsen, Leil, Doornspijk, Elburg, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Herwen en Aerd, Herwijnen, Heteren, Kesteren, Millingen aan de

Rijn, Nijkerk, Oostelijk-Flevoland, Putten, Renkum, Ubbergen, Wageningen, Zaltbommel, Zevenaar.

FRIESLAND: Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Heerenveen, Hemelumer-Oldeferd, Idaarderadeel, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Sneek, Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Wonseradeel, Workum, Wijmbritseradeel, IJlst.

Van de provincies Zeeland, Limburg, Drente en Groningen is nog onbekend of de fuut daar als broedvogel voorkomt. Er zijn echter enkele aanwijzingen (zie ?? op het kaartje) die doen vermoeden, dat de fuut ook in die provincies broedt, zij het waarschijnlijk in zeer geringe aantallen! Wij zijn ons terdege bewust, dat dit kaartje verre van volledig is en aanvullingen worden dan ook zeer op prijs gesteld. De volgende punten zijn van belang:

1. Vermoedelijk concentreren futen zich in maart op bepaalde plaatsen, vanwaar ze hun territoria in het omliggende gebied bezetten. Opgave is gewenst van de plaatsen van dergelijke concentraties en de aantallen aanwezige futen.
2. Waar is met zekerheid het broeden van futen vastgesteld? De plaats dient nauwkeurig te worden omschreven. B.v.: „Zuidelijke oever van het Veluwemeer, oostelijk van de monding van de Hierdense Beek, gem. Ermelo.”
3. Het geschatte aantal broedparen in een gemeente. Aantallen graag volgens de groepen: ?, 1, 2, 3-5, 6-10, 11-20, 21-35, 36-50, 51-75, 76-100; dus b.v. Rheenen 2, Kampen ?, enz.
4. Het nauwkeurige aantal broedparen in het terrein waarover wordt gerapporteerd. Deze tellingen zijn zeer belangrijk, omdat zij gegevens opleveren, waaruit het aantal broedparen in veel grotere, gelijkvormige gebieden kan worden berekend. Het is beslist noodzakelijk dat de grenzen van het gebied, waarover wordt gerapporteerd, zeer nauwkeurig worden opgegeven.
5. Het is minstens even belangrijk te weten in welke gemeenten de fuut *beslist niet* broedt.
6. Uiterst belangrijk zijn voorts gegevens ten aanzien van de hiervoor genoemde punten uit voorgaande jaren, omdat daaruit een misschien reeds begonnen achteruitgang kan blijken.
7. Achteruitgang zal vooral ook kunnen blijken uit opgaven van gemeenten, waar de fuut vroeger wel broedde, doch thans niet meer. Indien mogelijk dient de vermoedelijke oorzaak van de verdwijning te worden vermeld.

Men gelieve voor opgave van gegevens gebruik te maken van formulieren, die bij de organisatoren van dit onderzoek kunnen worden aangevraagd.

De resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. Medewerkers ontvangen aan het eind van het jaar een voorlopig verslag. Het is gewenst de formulieren aan het eind van het broedseizoen onmiddellijk op te zenden.

● *Ir. J. J. F. E. de Wilde en H. N. Leys, Diedenweg 14, Edel/Gld., tel. 08380-3838*