

Bent U daar al eens naar vogels wezen kijken?

Vaak veel stootvogels in de Eempolders

Door J. Tolner

De Eempolders zijn nog altijd een rijk vogelgebied, al maken we ons wel zorgen over de toekomst, gezien de opdringende stedebouw, de vervuiling van de Eem en de sloten, de chemische bestrijdingsmiddelen. Ook de achteloze manier, waarop door de boeren vergunningen voor eieren rapen worden afgegeven, baart zorgen ten aanzien van de verstoring van Kievieten, grutto's, tureluurs en kemphanen. Juist voor deze weidevogels biedt het kleine reservaat aan de „kust” onvoldoende soulaas. Gezegd moet worden, dat sommige boeren ook uitstekende hulp bieden bij de bescherming. Een goede aanvulling op het fanatieke en onbetaalbare beschermingswerk van de heer Bakker uit Baarn. Het feit, dat ook de plantenwereld ernstig schade lijdt, maakt het beeld wel ongeveer compleet. De successen van de heer Bakker *in* het reservaat met waterral, karekieten, snor, baardmannetje, rietzanger, torenvalk enz. laten we verder onbesproken, al stemmen ze wel tot grote vreugde. Dit werk moet beslist worden uitgebreid; we werken er hard aan.

Er waren in de winter van 1967-68 opvallend veel stootvogels in de Eempolders, een gevolg van de aanwezigheid van zeer veel muizen na de mooie zomer van 1967. Leo Oudejans meldde in „De Korhaan”, dat hij in december 4 buizerds waarnam, vooral in de strook langs de rijksweg, waar ze waarschijnlijk ook nog wel eens aas, in de vorm van verkeersslachtoffers, te pakken krijgen. Zelf namen we op 25 december 3, op 26 december 6 en op 27 december 5 buizerds waar. De heer Bakker nam er, naar hij mij meedeelde, 3 à 4 waar, evenals in voorgaande jaren gemiddeld.

Bij de buizerds was er dus geen toename door de muizen of afname door andere oorzaken, zoals Prof. Dr. D. M. de Vries in „De Boerderij” van 17 januari 1968 voor het Wageningse Binnenveld meldde. In de muizenrijke jaren 1958 en 1960 telde hij er gemiddeld resp. 18 en 25 (hoogste aantallen 23 resp. 33), tegen „normaal” zo'n 6 à 8. De laatste twee jaren gemiddeld echter slechts 3 resp. 4 (hoogste 6 en 7), waarbij hij denkt aan de ramp door chemische bestrijdingsmiddelen in Drente. Ook uit Oostelijk Flevoland werden weinig buizerds gemeld. Dit geeft inderdaad te denken voor de buizerd, die aas niet versmaadt, in tegenstelling tot torenvalken en uilen, die in 1967/1968 zowel in

Oostelijk Flevoland als in de Eempolders voorkwamen. Het aantal buizerds in de Eempolders geeft echter geen nadere aanwijzing voor deze vermoedens. Mogelijk hebben we hier te doen met „blijvers” uit de vele bossen van Baarn (?).

De heer Bakker smaakte het genoeg, dat twee nesten torenvalken werden uitgebreed, waarvoor alle lof. Er was de hele winter dan ook een flink aantal in de polders waar te nemen. Leo Oudejans nam er 3-6 bij elkaar waar en bij de Eemmond soms nog meer. Zelf zagen we er op 25 december 9, op 26 december 4 en op 27 december zelfs 14, en wel in verschillende delen van de polders. Het aantal velduilen was ook opvallend groot. Een NJN-excursie nam op 3 december 1967 16 exemplaren tegelijk in de lucht waar bij de Eemmond, rondom het daar liggende perceel akkerland. In totaal waren er toen 20-25 stuks. De heer Bakker nam er op een zeker moment zelfs nog meer waar.

Zo wordt er flink huisgehouden onder de muizen, en men kan er wel zeker van zijn, dat er ondanks de mooie zomer van 1967 in 1968 in de Eempolders geen muizenplaag zal voorkomen. Het is te hopen, dat de graanontsmettende boeren elders in het land dit ook beseffen, en slechts in uiterste nood naar een pesticide zullen grijpen; ook nu de allergevaarlijkste middelen in het voorjaar zijn verboden blijven er helaas nog genoeg gevaarlijke spullen over, waarmee veel onheil kan worden aangericht. Het zou goed zijn, wanneer de boeren hier nog eens op werd gewezen. Zoals het ook goed zou zijn, wanneer we met elkaar een groot aantal nesten en nestkasten voor buizerd en torenvalk plaatsen. Het is nog niet helemaal te laat.

- *J. Tolner, Eemweg 21, Baarn*