

Trekwegen van in Nederland geringde vogels

Rietgans, *Anser fabalis*

B. J. Speek

Van 1911-1977 werden er in Nederland 7.804 Rietganzen geringd, waarvan er 1.130 werden teruggemeld. Dat is 14 %.

Ganzen worden in ons land gevangen door een paar gespecialiseerde ganzenflappers. Zij werken met een heel groot slag-net en gebruiken levende lokvogels. Op het ogenblik mogen er in Nederland met netten alleen nog ganzen gevangen worden voor het ringonderzoek, niet meer voor de consumptie of voor de handel.

Figuur 1 laat zien in welke maanden de Rietganzen werden gevangen.


Het is duidelijk dat deze ganzensoort hier komt na 1 december, het meest aanwezig is in januari, in februari door- en terugtrekt en na 1 april verdwenen is.

Figuur 2 geeft weer waar Rietganzen werden

geschoten, die in Nederland werden geringd. Nederland en Oost-Duitsland blijken de landen te zijn met het meeste afschot; het zelfde beeld dus als voor de Kolgans. Benoorden de 50-ste breedtegraad trekken de ganzen in de voorzomer naar het oosten, tot zelfs achter het Oeral-gebergte in Siberië.

In sommige (strenge) winters trekken de Rietganzen zuidelijker dan Nederland en komen dan terecht in Frankrijk, Spanje en Italië.

Figuur 3 toont ons van dag tot dag de gemiddelde trekweg van Rietganzen, die in Nederland werden geringd en door jagers werden geschoten. Men ziet, dat de groep op 1 februari zijn zuidelijkste punt heeft bereikt.



Rietganzen op akker, Noordoostpolder, 1976.


Foto: Theo Mulder.





Fig. 2. Plaatsen, waar Rietganzen zijn geschoten, die in Nederland zijn geringd.

Fig. 3. De gemiddelde trekweg van Rietganzen.
 + = de gemiddelde ringplaats
 ● 1 = 1 januari ● 2 = 1 februari enz.





Rietganzen, Stabrechtsche Heide, oktober 1960.

Foto: Theo Mulder.

Dit gemiddelde ligt dan in het oosten van België. Vanaf 1 februari vindt de terugtocht plaats. Eerst nog langzaam, maar na 1 maart steeds sneller. Op 1 juli bevindt het gemiddelde van de groep zich het verst van zijn winterkwartier verwijderd. Ze zitten dan in

Noord-Siberië zo'n 500 km achter de Oeral. Na 1 augustus vindt een vrij snelle terugtrek plaats. Na 1 november verplaatsen de ganzen zich langzamer.

In de maand januari is de verplaatsing gering.

● B. J. Speek. Instituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling Vogeltrekstation, Kemperbergerweg 67, Arnhem

Rietganzen (waaronder enkele Grauwe Ganzen) op akkerland. Omgeving Klundert, 1970.

Foto: Theo Mulder.

