

# Vangst van een Rode Wouw en een Zwarte Wouw in een kraaienkooi

F. Haverschmidt

Op 26 april 1982 werd in een kraaienkooi onder Junne (gemeente Ommen) een Rode Wouw (*Milvus milvus*) gevangen en een week later op 2 mei zat er een Zwarte Wouw (*Milvus migrans*) in de zelfde vangkooi. Beide vogels heb ik gefotografeerd, geringd en vrijgelaten. Dit is de eerste maal dat beide soorten wouwen hier in de omgeving in een kraaienkooi werden bemachtigd, al kon dit gezien de toeneming van het aantal waarnemingen in de laatste jaren wel worden verwacht. Immers wouwen zijn voor een deel aaseters al is hun jachtwijze zeer verschillend van die van de Buizerd (*Buteo buteo*), die regelmatig en gedurende een groot deel van het jaar in kraaienkooien wordt gevangen waarvan ik er van 1972 tot en met de eerste helft van 1982 in totaal 136 heb geringd.

Hoewel in 1977 een paartje Rode Wouwen met succes in Twente heeft gebroed zijn er in de omgeving van Ommen geen waarnemingen bekend die daar op wijzen. Gepaarde vogels in de broedtijd zijn nog niet gezien, wel enkelingen, die waarschijnlijk nog niet geslachtsrijp waren. Volgens de kaarten 27 en 28 van Rheinwald (1977) ontbraken beide soorten ook als broedvogel in 1975 in het deel van West-Duitsland, dat aan Noordoost-Overijssel grenst.

Op 12 mei 1982 nam ik gedurende geruime tijd en van zeer nabij de jachtwijze van een Zwarte Wouw (*Milvus migrans*) waar onder Arrien op ongeveer 4 km afstand van de plaats waar er op 2 mei een was gevangen. De vogel cirkelde eerst enige tijd zonder vleugelslag met wijd uitgespreide vleugels en staartveren

Rode Wouw, gevangen in kraaienkooi, Junne, 26 april 1982.  
Foto: F. Haverschmidt.



Zwarte Wouw, gevangen in kraaienkooi, Junne, 2 mei 1982.  
Foto: F. Haverschmidt.



laag boven een open terrein waar een groot aantal Pekingeenden wordt opgefokt. Het ligt ingesloten tussen met vliegdennen begroeid heideveld en dennenbos. Na enige tijd rondgecirkeld te hebben ging hij met langzame vleugelslag laag boven de eenden vliegen. Deze reageerden onmiddellijk door zich luid kwakend samen te ballen tot één dicht oengepakte witte massa. De wouw kreeg duidelijk geen kans er een van af te zonderen en te grijpen. Hij vloog daarna naar een ander gedeelte van het veld waar jonge eenden, nog gedeeltelijk in het gele donskleed, rondliepen en hier herhaalde zich het zelfde schouwspel, de eenden sloten zich aaneen tot een compacte massa en ook hier kwam de wouw er niet toe er een te grijpen. Ten slotte verdween hij in noordoostelijke richting.

■ Mr. F. Haverschmidt, Wolfskuilstraat 16, 7731 AT Ommen.

## LITTERATUUR:

Haverschmidt, F. (1981): Vangst van een Raaf in kraaienkooi. Het Vogeljaar 29 (2) : 70-71.

Rheinwald, G. (1977): Atlas der Brutverbreitung Westdeutscher Vogelarten. Bonn. Kaart 27 en 28.