

Derde waarneming van Ross' Meeuw *Rhodostethia rosea* in Nederland

Op 21 november 1992 werd door Dirk Moerbeek bij de bekende Zuidpier van IJmuiden een Ross' Meeuw ontdekt. Het meeuwtje, wat kleiner dan een Kokmeeuw en iets groter dan de Dwergmeeuw, heeft spitsere vleugels dan deze laatste soort. Het belangrijkste kenmerk is evenwel de vrij lange, wigvormige staart.

De waargenomen vogel werd gedetermineerd als een exemplaar in tweede winterkleed of bijna




Ross' Meeuw, Zuidpier, IJmuiden, 22 november 1992.
Foto: Marten van Dijk.

adult exemplaar dat volgens de bijgaande foto's een klein oorvlekje had, een lichtgrijze ondervleugel en op de bovenzvleugel nog restanten van een W-patroon, zoals dat ook bij de Dwergmeeuw voorkomt.

Overigens heeft de Ross' Meeuw een kleine zwarte snavel en korte donkere (roodachtige) poten en geen zwart in de vleugelpunten. De vogel



Ross' Meeuw, Zuidpier, IJmuiden, 21 november 1992.
Foto: Jan van Holten.



Ross' Meeuw, tweede winterkleed, Zuidpier, IJmuiden, 22 november 1992.
Foto: Marten van Dijk.



Ross' Meeuw, Zuidpier, IJmuiden, 23 november 1992.
Foto: Jaap van 't Hof.

is tot en met 24 november door vele vogelaars gezien en het betreft de derde waarneming van deze soort voor ons land. De vorige waarnemingen waren van 6 juni tot en met 15 juli 1958 op Vlieland een vrouwtje in zomerkleed en op 17 en 18 januari 1981 bij Camperduin, een volwassen exemplaar in winterkleed.

De Ross' Meeuw is een broedvogel van de arctische toendra in het noordoostelijke deel van Siberië, ten noorden van de poolcirkel die zelden afdwaaft ten zuiden daarvan.

H.J. Lichtenbeld.

Zie ook F. Hieselaar 'Hoog(geëerd) arctisch bezoek: de Ross' Meeuw', 'Fitis' 29 (1): 32-34.