


Oproepen



Bosuilen in Haagse woonwijk?

Bosuilen verwacht je niet zo gauw in een woonwijk, maar het komt zeker voor. Een lezer van *het Vogeljaar* – Jan Bais – stuurde ons een foto toe met daarop een afdruk van vogelveren tegen een raam. Hij schreef: ‘Bijgevoegd een curieuze foto van een printafdruk van een uil tegen een ruit, genomen in de Ten Hovestraat te Den Haag. Ik ontving deze foto van een kennis. Volgens mij betreft het een Bosuil. De foto heeft bijkans artistieke schoon-

Een opvallende afdruk van een vogel die tegen een raam gebotst is in een woonwijk van den Haag. Het is doorgaans niet eenvoudig met zekerheid vast te stellen om welke soort het gaat, als de botsing zelf niet is gezien en als de vogel niet gevonden wordt. In dit geval gaat het vermoedelijk om een Bosuil. Met dank aan de heer Jan Bais, die de foto beschikbaar stelde.

heid, als van een pentekening. Heel bijzonder’. Dergelijke afdrukken op een ruit zijn op



zichzelf natuurlijk niet zo bijzonder. Vogels vliegen regelmatig tegen glazen ramen of windschermen en laten dan meestal een afdruk achter. Het interessante van dit geval is dat de afdruk een redelijk compleet beeld van de vogel geeft. Het is dan erg verleidelijk om een poging te doen de soort te achterhalen aan de hand van die afdruk. Hoewel men een Bosuil niet echt verwacht in een woonwijk, is het in dit geval heel goed mogelijk. Navraag leverde op dat in de desbetreffende buurt veel oude bomen staan en dat er in elk geval ook Bosuilen hebben gebroed. Wij zijn benieuwd of er meer lezers zijn die dit soort opvallende afdrukken hebben. Misschien zijn er zelfs mensen die naar deze verschijnselen onderzoek gedaan hebben. Reacties zijn welkom.

RAK

Snavelafwijkingen bij vogels

Afwijkingen komen in de natuur veelvuldig voor. Ook bij vogels ziet men soms afwijkingen. Die vallen niet altijd op. Vogels met een manke poot of vleugel trekken meestal al snel de aandacht en ook een kleurafwijking aan het verenkleed wordt meestal wel gezien. Maar er zijn ook afwijkingen die op afstand minder opvallen en waarvoor men de vogel van dichterbij moet kunnen observeren. Vogelringers zullen waarschijnlijk regelmatig vogels in handen krijgen met afwijkingen. Op het Ringersnet – het digitale communicatieplatform waarover ringers met elkaar nieuwtjes uitwisselen – circuleerde enige tijd geleden een bericht over vogels met afwijkende snavels. Soms groeit een snavel niet goed uit, te krom, te lang of juist te kort of met een merkwaardige knobbel. Je zal er maar last van hebben. Van sommige vogels vraagt men

zich wel af hoe zij met zo'n misvormde snavel kunnen overleven. Eén van de berichten op het Ringersnet is afkomstig van Han Bouwmeester, één van de leden van de commissie die het net beheert en controleert. Daarin verwijst hij naar een website van de British Trust for Ornithology (BTO). Deze organisatie heeft naar aanleiding van meerdere meldingen van vogels met misvormde snavels die tijdens tuinvogeltellingen werden waargenomen een actie gestart om meer informatie te verzamelen. Zij is begonnen met een integrale inventarisatie van het voorkomen van misvormde snavels bij welke soort dan ook. Er zijn enkele interessante pagina's op de website aan dit onderwerp besteed met informatie over achtergronden over het ontstaan, de soorten van misvormingen en het rangschikken naar soorten waarbij het vastgesteld is. Zelfs de geografische verspreiding binnen Groot-Brittannië wordt getoond op plattegronden. Daarnaast is er een verbazingwekkende pagina met foto's van diverse soorten met vervormde snavels. Zie: <http://www.bto.org/volunteer-surveys/gbw/about/background/projects/bgbw>. De website bevat overigens ook andere interessante informatie, niet alleen over snavelafwijkingen.

Vogelringer Henk Lichtenbeld uit IJsselstein reageerde op het bericht van Han en hij vroeg zich af of er veel bekend is over dergelijke afwijkingen in Nederland. Hij wendde zich tot de redactie van *het Vogeljaar*, maar ook wij moeten het antwoord op zo'n vraag schuldig blijven. Daarom roepen wij onze lezers op meldingen van vogels met afwijkende snavels naar ons in te zenden. Mocht u vogels met een vreemde snavel zien, kijk dan eens op de Britse website om vast te stellen om welke type afwijking het gaat. Volgens de website zijn voor meer dan zestig vogelsoorten uit de hele wereld gemeld. Op de website worden een aantal voorbeelden van snavelafwijkingen beschreven. Zie: <http://www.bto.org/volunteer-surveys/gbw/about/background/projects/bgbw/types>. Ook wij zijn wel benieuwd of dit in Nederland veel voorkomt. Daarom: wanneer u een vogel met duidelijke afwijkingen ziet, laat het ons weten! Stuur dan een bericht naar de redactie: redactie@vogeljaar.nl.

