

GEMERKTE SIBERISCHE KANOSTEN

door M.R. van Eerden

Zoals bekend broedt de Kanoststrandloper enerzijds in Noordoost-Canada en Groenland en anderzijds in Siberië. Vooral het trekgedrag van de laatste populatie is nog maar fragmentarisch bekend.

Dick et al (1976) geven een overzicht van alle systematische en anekdotische waarnemingen van Kanosten in het voorjaar die tot den toe zijn gepubliceerd. Het blijkt dat op veel plaatsen langs de Atlantische kust van West-Europa trekkende en/of verblijvende Kanosten worden ongemerkt in de maand mei. Als uitgesproken lange-afstandsvlieger doen de vogels maar weinig pleisterplaatsen aan op hun voorjaars trek. Bekend zijn de fourageergebieden in de Vendes in Frankrijk en het West-Duitse deel van het waddengebied.

In Afrika overwinteren zo'n 130.000 Kanosten in Mauritanië en nog eens 10.000 in Zuid Afrika, waarschijnlijk alle van Siberische oorsprong. Tussen beide gebieden ligt echter nog 5000 km kustlijn die nog nooit op pleisterende wadvogels is bekeken, zodat het mogelijk is veel

grotere aantallen kan gaan. Voor de vogels van Mauretanië ligt het Waddengebied op de groot cirkel route naar de Siberische broedgebieden, m.a.w. het is de kortste weg. Volgen de Zuid-Afrikaanse vogels de route langs West-Afrika en de Waddenzee, dan is dit 20% langer vliegen dan via Oost-Afrika. We verwachten dat de vogels dit alleen zullen doen als geschikt fourageergebieden langs de oostelijke trekweg ontbreken. Dat de Kanoeten mogelijk inderdaad (noodgedwongen) omvliegen blijkt uit twee vangsten in 1978 in de Vendeë in West-Frankrijk van Kanoeten die in voorafgaande winter in Zuid-Afrika werden gevangen.

Om dit te bevestigen zullen dit voorjaar Kanoeten worden gevangen, zowel in Zuid-Afrika als in de Vendeë. Het zou prachtig zijn wanneer we in staat zouden zijn als Zestrek groep enkele van deze gemerkte vogels in de vlucht op te sporen. Onderstaand enige bijzonderheden over de manier van kleuren:

Zuid Afrika De vogels worden met Picrinezuur gevangen. Deze kleurt indien aangebracht op witte veren geel tot oranlegeel. De merkplaatsen kunnen liggen op de vleugelstreep, de ondervleugeldekveren of de onderstaartdekveren.

Vendeë In verband met het zomerkleed zal de kleuring in de Vendeë donker zijn en aangebracht worden over de gehele onderzijde van de vogel.

Gevangen wordt hier van 21-29 april en van 10-17 mei '79.

Literatuur:

Dick, W.J. et al. 1976. Distribution and geographical origins of Knot Calidris canutus wintering in Europe and Africa. Ardea 64: 22-47.