

## ALGEMENE MEEUWEN

M. Platteeuw

Het was in februari 1974 in een schooltje in het dorp Noordwijk. Een aantal zeetrekwaarnemers, tot dan slechts officieus verenigd, besloot in een vergadering de Club van Zeetrekwaarnemers op te richten in de vorm zoals wij er nu mee vertrouwd zijn. Reeds bij deze historische gebeurtenis werd door één der aanwezigen, een roepende in de woestijn, serieuze aandacht gevraagd voor de registratie van de algemenere meeuwen, omdat deze de meest karakteristieke vogels van ons kustgebied zijn en omdat juist bij deze vogels het registreren van de leeftijdsverhoudingen in de diverse tijden van het jaar zo goed mogelijk is.

Drie jaar heeft het moeten duren, voordat in de seizoensverslagen regelmatig gewag wordt gemaakt van in ieder geval Grote- en Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw en Kokmeeuw. Dit was het gevolg van een onderlinge afspraak van een kleine groep waarnemers van de Hondsbossche, Zilvermeeuwen zijn hier nooit systematisch geteld, omdat vrijwel altijd ter plaatse fouragerende of rustende en heen en weer vliegende vogels het beeld zodanig beïnvloeden dat een zinnige telling van trekbeving onmogelijk is.

Nu is het veer drie jaar later en tot mijn spijt moet ik constateren dat nog steeds alleen aan de Hondsbossche pogingen worden ondernomen althans enkele algemene meeuwen systematisch bij te houden. Het is niet meer dan logisch, dat in havensteden als Scheveningen en IJmuiden ook Grote Mantelmeeuwen en Kokmeeuwen problemen geven van de aard zoals hierboven voor de Zilvermeeuw is beschreven, maar met name Kleine Mantel en Stormmeeuw moeten hier toch in principe wel telbaar zijn. Ook dagen met duidelijke trek van Kokmeeuwen, zoals die vooral in het najaar regelmatig optreden (zie o.a. Camphuysen 1979), zullen volgens mij wel registreerbaar zijn vanaf posten in havensteden. Het ligt in mijn bedoeling om ook de waarnemers van andere posten dan de Hondsbossche eens aan te sporen wat meer op de algemene meeuwen te letten en die soorten waarvan het tellen niet al te grote moeilijkheden veroorzaakt eens systematisch bij te houden. Ook voor deze soorten kunnen we dan eens vergelijkingen maken in trekactiviteiten tussen b.v. Noord- en Zuid-Holland. Tevens lijkt het interessant om te kijken in hoeverre de aan de Hondsbossche geregistreerde Stormmeeuw-bewegingen beïnvloed zijn door de onmiddellijke nabijheid van een zeer grote kolonie.

Ten laatste zou ik dan ook willen propageren om zo veel mogelijk de leeftijden van de langevliegende meeuwen bij te houden. Het is even oefenen, maar de ervaring leert, dat op een gegeven moment het registreren van de gewone meeuwen en hun leeftijden evenzeer een automatische wordt tijdens een zeetrektelling als het tellen van de groepen zeeëenden. Bovendien, ook tijdens de minder boeiende uren heb je tenminste iets te doen.....

Referentie:

Camphuysen, C.J. 1979. Halfjaarverslag periode juli-december 1978.  
Rapport nr. 15, Club van Zeetrekwaarnemers.

Maarten Platteauw  
Petrus Campersingel 31/16  
9713 AD Groningen