


Gegevens uit andere delen van Nederland

Willem van Manen

Voor een groot deel van Nederland dat vorig jaar nog niet onder de hoede van Werkgroep Roofvogels viel, zijn nog geen coördinatoren gevonden. Wel zijn er gegevens binnengekomen, soms in de vorm van formulieren, soms in de vorm van een verslag. Dit alles is terecht gekomen op het centrale adres van de werkgroep. Hieronder volgt per gebied een beknopte weergave van het binnengekomen materiaal. De ligging van de gebieden is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1. Ligging van de gebieden, waarbij 1-Terschelling, 2-Wieringermeer, 3-Noordwest-Achterhoek, 4-Doesburg, 5-Achterhoek, 6-ZO-Achterhoek, 7-Westland, 8-Schouwen-Duiveland en 9-westelijk Noord-Brabant.

Terschelling

Door een groot aantal medewerkers werden gegevens aangedragen van de Terschellinger roofvogels. Het materiaal werd door Theo Bakker op een rijtje gezet in een keurig verzorgd rapport (Bakker T. 1994. Broedende roofvogels en uilen op Terschelling in 1994. Intern rapport Staatsbosbeheer Terschelling.). Territoria werden vastgesteld van Bruine Kiekendief (59), Blauwe Kiekendief (48), Sperwer (7), Buizerd (8), Torenavalk (18) en Boomvalk (2). In het rapport

wordt uitgebreid ingegaan op de broedbiologie. Een klein deel van de kiekendiefnesten werd moedwillig verstoord.

Wieringermeer

Een groot, voornamelijk bosloos gebied werd hier geïventariseerd door Leon Kelder (Vlasstraat 35, 1773 AL Kreileroord). Bruine Kiekendieven en Torenavalken werden gevonden in de atlasblokken 14-17, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48 en 57. Havik, Sperwer, Buizerd en Boomvalk uitsluitend in de blokken 14-17 en 14-27. In totaal werden 26 territoria van Bruine Kiekendief, 4 van Havik, 2 van Sperwer, 7 van Buizerd, 4 van Torenavalk en 2 van Boomvalk gevonden. Alleen de broedresultaten van de Buizerd waren onder de maat, slechts in twee van de zeven territoria werden jongen waargenomen. Aanwijzingen dat nesten moedwillig worden verstoord ontbreken. Wel werden in februari 1994 twee dode Buizerds aangetroffen in een deel van het gebied waar in 1992 een Havik en drie Bruine Kiekendieven werden vergiftigd met aldicarb. De Buizerds waren al te lang dood om te worden onderzocht op gif.

Noordwest-Achterhoek

In de atlasblokken 33-17, 18, 27, 28, 38, 48 en 34-11, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 en 51 werd de verspreiding van roofvogels in kaart gebracht door Hans van Hoorn (Hoogestraatje 1, 7241 AL Lochem), Stef van Rijn (Slaakweg 75, 6826 GB Arnhem) en Wouter Vrugink (Nuisvelderbos 12, 7217 RP Harfsen). Territoria van Rode Wouw (1 mogelijk broedgeval), Wespendif (5) Havik (19) Sperwer (57), Buizerd (56) Torenavalk Boomvalk (7) werden vastgesteld. Mogelijke vervolging werd vastgesteld in atlasblok 34-22 ten noorden van Lochem.

Omgeving Doesburg

Hier was de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh actief in delen van de atlasblokken 40-15, 16, 17, 25, 26 en 28. Er werden territoria vastgesteld van Bruine Kiekendief (1), Havik (1), Sperwer (10), Buizerd (12), Torenavalk (14) en Boomvalk (2). Het merendeel van de paren bracht jongen groot.

Achterhoek

Marinus Arendsen, Johan Jansen en Joop Mecking inventariseerden de atlasblokken 41-22, 32 en 42. Samen stelden zijn territoria vast van Wespendif (2), Havik (1), Sperwer (18), Buizerd (21), Torenavalk (17) en Boomvalk (4). Het broedsucces was wisselend, maar bij geen van de soorten onrustbarend laag.

Zuidoost-Achterhoek

Door de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek werd 33400 ha geïventariseerd op roofvogels. Het gebied beslaat geheel of gedeeltelijk de atlasblokken 41-13 t/m 17, 41-23 t/m 27, 41-33 t/m 37 en 41-43 en 44. Van de Wespendif werden

14 territoria vastgesteld, van Havik 24, van Sperwer 62, van Buizerd 141, van Torenvalk 72 en van Boomvalk 13.

In een deel van de territoria werd een nest gevonden en werden broedbiologische gegevens verzameld. In een uitgebreid artikel van Gejo Wassink in het blad van de vogelwerkgroep worden broedbiologische gegevens van alle soorten gepresenteerd en wordt het materiaal uit 1994 vergeleken met voorgaande jaren.

Westland

In het dichtbevolkte Westland (atlasblokken 37-14, 23 en 33) werden roofvogels geïnventariseerd door Ton van Schie. Territoria werden vastgesteld van Bruine Kiekendief (1) Buizerd (1), Sperwer (4), Torenvalk (2) en Boomvalk (4). Van Buizerd en Bruine Kiekendief werd geen nest gevonden. Bij de ander soorten waren drie van de vier Sperwers succesvol, alle Boomvalken brachten jongen groot, maar in geen van de torenvalkenesten werden eieren gelegd.

Schouwen-Duiveland

Rinus van't Hof zocht nesten en territoria en Schaap ringde de jonge vogels. Territoria werden vastgesteld van Bruine Kiekendief (6), Buizerd (1), Sperwer (1), Torenvalk (19) en Boomvalk (1). De Bruine Kiekendieven brachten 1x2, 4x3 en 1x4 jongen groot. Van de andere soorten worden geen broedresultaten vermeld.

Westelijk Noord-Brabant

In westelijk Noord-Brabant werden Boswachterij Chaam (atlasblokken 50-25 en 35), Ulvenhoutsbos (atlasblok 50-24) en Strijbeekse Heide (atlasblok 50-23) geïnventariseerd door Arie Rouwhof. De resultaten staan vermeld in tabel 1. Het aandeel geslaagde broedgevallen bij de kwetsbare soorten, Havik en Buizerd, is niet verontrustend laag. Te denken geeft echter het repeterend mislukken van een haviksnest in het centrale deel van Boswachterij Chaam.

Tabel 1. Territoria, nestvondsten en aantal succesvolle nesten in drie onderzochte gebieden in westelijk Noord-Brabant 1994

Soort	Boswachterij Chaam			Ulvenhoutsbos			Strijbeekse Heide		
	Terr.	Nest	Succes	Terr.	Nest	Succes	Terr.	Nest	Succes
Wespendief	1	0	?	0	0	0	0	0	0
Havik	5	4	3	1	1	0	0	0	0
Buizerd	10	9	10	1	1	1	1	1	1
Sperwer	7	6	4	0	0	0	0	0	0
Torenvalk	7	3	2	0	0	0	0	0	0
Boomvalk	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Adres: Muddegoorn 80, 9403 NL Assen