

Haviken *Accipiter gentilis* in Zuid-Twente en Hamaland (Duitsland) in 1995

Kees Rosendaal, Piet Koopmans en Erik Rosendaal

Van januari t/m december werd een 250 km² groot gebied onderzocht op Haviken. De 14 territoria bevonden zich alle binnen de lijnen Haaksbergen-Enschede-Oldenzaal-Ahaus-Vreden. Vijf paren hadden een grensoverschrijdend territorium. Het aandeel succesvolle nesten was in Duitsland (80%) groter dan in het Nederlandse deel van het onderzoeksgebied (56%)(Tabel 1). Over het geheel was het broedsucces in 1995 (64%) mager vergeleken met 1994, toen 75% van de paren succesvol jongen grootbracht.

Tabel 1. Broedresultaten van de Havik in Zuid-Twente en Amaland in 1995. *Breeding success of Goshawks in southern Twente and Amaland in 1995.*

Gebied Area	Territoria Territories	Succesvol Successful	Mislukt Failed	Aantal jongen No. of fledglings
Haaksbergen	5	3	2	6
Enschede	2	2	0	4
Oldenzaal	2	0	2	0
Ahaus	2	2	0	5
Vreden	3	2	1	4
Totaal Total	14	9	5	19

Eipredatie door kraaien was in één van de gevallen de oorzaak van mislukking. De afmeting van een beschadigd ei bedroeg 50.0x43.3 mm.

Opnieuw stelden we predatie vast van een tweejarig haviksvrouwje aan het begin van de broedtijd. De plukplaats bevond zich op 2 km afstand van het dichtstbijzijnde nest. In de winter vonden we in Oldenzaal en Haaksbergen resp. een dood juveniel haviksvrouwje en een dode adulte Buizerd. Onder een buizerdhorst in Haaksbergen vonden we een dode buizerdtakkeling. In al deze gevallen was de doodsoorzaak onbekend.

Opzettelijke menselijke verstoring of activiteiten ten nadele van roofvogels werden vooral in Duitsland geconstateerd. In Ahaus werd een metalen hoekplaat in een nestboom geschroefd, bedoeld om aas op aan te bieden aan roofdieren. In Vreden werden richtpunten geplaatst achter vier uitgangen van een bewoonde dassenburcht. Het waren 50 cm hoge witte berkenstammetjes, waarop kan worden gericht in de schemering. In Haaksbergen werd in de eerste weken van maart een bosperceel geschoond, waarbij larixen met roofvogelhorsten werden omgezaagd. Gelukkig broedde het havikpaar elders succesvol.

Summary: Goshawks *Accipiter gentilis* in southern Twente and Hamaland (Germany) in 1995

In The Netherlands, including adjacent parts of Germany, 14 territories of Goshawks were located in an area of 250 km² (Table 1). A second year female Goshawk was depredated by another Goshawk.

Adres: Beltrumbrink 62, 7544 ZD Enschede.