

# Wespendieven te over?

Erwin Ruessink

Zoals vermeld in het inventarisatieverslag (ZW-Salland) van het afgelopen jaar (1995) hebben we een waarneming gedaan van meerdere Wespendieven. Op 16 juni 1995, een zonnige vrijdagmorgen, hebben we omstreeks 10.00 uur acht exemplaren tegelijkertijd gezien. De vraag is, wat is nu de betekenis van deze waarneming?

Op het eerste gezicht waren we blij verrast, maar dat zette zich al gauw om in een gevoel van: "Wat moeten we hiermee"? Het gegeven dat je acht Wespendieven tegelijkertijd ziet is mooi, maar conclusies kun je er niet direct aan verbinden. Het aantal exemplaren bewijst in ieder geval, dat er genoeg vogels aanwezig waren om territoria te bezetten.

De groep van acht bestond uit vijf mannetjes en drie vrouwtjes. Eén van de vrouwtjes had voer (raat) in de poten. Een aantal van de vogels vlinderde. Moeilijk was het om te onderscheiden welke exemplaren nu wel en niet vlinderden. Ondanks het feit dat we met z'n drieën waren, was het volgen van een individuele vogel moeilijk, omdat ze door elkaar vlogen. Een van de vogels heb ik later nog verscheidene malen teruggezien. Een opvallend licht gekleurd mannetje. Later in het seizoen is er een nest gevonden van een Wespendief waaruit twee jongen zijn uitgevlogen. Een tweede territorium werd gekarteerd, maar bleef zonder nestbouw.

Blijft de vraag: waar komen al die Wespendieven vandaan en wat doen ze hier? Overleg met andere ornithologen gaf geen uitsluitsel. We hebben nog gedacht aan doortrek. Dit leek ons niet van toepassing gezien de tijd van het jaar. Uitgevlogen jongen waren niet aan de orde, alle waargenomen exemplaren waren adult. Terugtrek na een mislukte broedpoging? Leek ons ook niet de verklaring, gezien het feit dat het nog vroeg in het seizoen was. Blijft er dus niets anders over dan te denken dat de waargenomen vogel in principe allemaal potentiële broedvogels waren, die daar toevallig aanwezig waren.

Wanneer er mensen zijn die soortgelijke waarnemingen gedaan hebben, dan hoor ik dat graag.

*Adres: Noorderenk 32, 7437 VR Bathmen (0570-543210).*

**Commentaar Rob Bijlsma:** Het is aannemelijk dat de groep bestond uit een mengeling van broedvogels en doortrekkers. Trek van Wespendieven in juni is niet uitzonderlijk. Een blik op de verspreidingskaarten in de Atlas van de Nederlandse Vogels (gepubliceerd door SOVON in 1987) laat zien dat er in juni en juli, toch echte broedmaanden voor deze soort in Nederland,

op veel plaatsen buiten de broedgebieden Wespddieven worden waargenomen. De kuststreek en de waddeneilanden zijn daarbij bijzonder illustratief, in die jaren ontbrak de Wespddief er als broedvogel, maar toch werden er in vrijwel alle kustblokken doortrekkende Wespddieven gezien in juni. In maart kun je hetzelfde fenomeen bij Buizerds zien: broedvogels schreeven gezamenlijk met doortrekkers boven potentiële broedgebieden, onderwijl druk roepend, baltsduikend en klooiend.



Foto: Jonge, pas uitgevlogen Wespddief, 'n echte choco. Havelterberg, augustus 1994 (Herman Gruppen).