

Rode Wouwen op trek in de Bourgogne

Egge Boerma

Het landschap in het zuiden van de Franse Bourgogne, ter hoogte van Chalon-sur-Saône, is veelal open, heuvelig en gevarieerd, met begraasde weiden, akkerbouw, heggen en verspreide loofbossen. Op 10 oktober 2002 was het daar zonnig, helder en stil weer, 15°C met een lichte zuidenwind, kracht 2B. Lopend door het weidse landschap hoorden mijn vrouw en ik plotseling een opgewonden, schel roofvogel- gemiauw in de verte. Op ongeveer 700 m afstand zagen we boven een met loofbos bedekte heuvel 25-30 Rode Wouwen schijnbaar wanordelijk omhoogschroeven. Ze waren onmiskenbaar, bekeken door kijken en telescoop, en riepen luidkeels. Er bevonden zich geen andere vogels, zoals Zwarte Wouwen of kraaien, in de groep. Na 2-3 minuten schroeven was kennelijk de ideale hoogte in de thermiekbel bereikt en zweefde de een na de ander in stilte weg in zuidelijke richting, de bosrand volgend zonder nog een enkele vleugelslag te maken. Een fenomenaal schouwspel.

Twee weken later zagen we op dezelfde plek, met hetzelfde weer en op dezelfde tijd van de dag, weer drie migrerende Rode Wouwen met hetzelfde gedragspatroon, die in zuidwestelijke richting over en achter het bos verdwenen.

Volgens de door mij geraadpleegde literatuur beperkt het verspreidingsgebied van de Rode Wouw in Europa zich voornamelijk tot Duitsland, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. In Lorraine, in NO-Frankrijk, zijn Rode Wouwen vaak te zien. Meestal zijn de vogels alleen of met z'n tweeën, dit in tegenstelling tot de Zwarte Wouw die vooral in groepen voorkomt. De Rode Wouwen van Zuid-Europa zijn overwegend standvogels, die uit noordelijker broedgebieden trekken grotendeels naar Mediterrane gebieden om te overwinteren. Slechts weinige passereren Gibraltar, maximaal honderd per jaar. De Duitse en NO-Franse vogels migreren in zuidwestelijke richting, een klein deel gaat naar Italië. Van de Bourgondische broedvogels overwintert een deel aan de voet van de Pyreneeën en in Spanje, terwijl vooral de Duitse populatie de winter doorbrengt in de Bourgogne of zuidelijker daarvan. Blijkens enkele gerapporteerde waarnemingen van 60-150 ex. per dag vormt in Bourgogne het traject Beaune-Montceau-les-Mines langs het Canal du Centre en de westkant van de Côte Chalonnaise een wezenlijk onderdeel van de zuidelijke trekroute van de Rode Wouw (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire 2002, Strenna 2000). Onze waarnemingen bevestigen dat beeld.

Summary: Migrating Red Kites *Milvus milvus* in Bourgogne

On 10 October 2002, 25-30 Red Kites were seen circling and calling near Chalon-sur-Saône in Bourgogne, France. The birds used the undulating countryside to gain height before gliding down in a southerly direction. Two weeks later, at about the same site, three more migrating Red Kites disappeared in a southwesterly direction.

Literatuur

Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire. 2002. Info's hiver 2000-2001
Saint-Cyr, France.

Génsbøl B. 1999. Guide des rapaces diurnes. Delachaux et Niestlé, Lausanne.

Strenna L. 2000. Les rapaces de Bourgogne. L'Aile Brisée, Talant.

Adres: Tempelierstraat 10, 2012 ED Haarlem.



Een juveniele Rode Wouw op trek bij Falsterbo, Zuid-Zweden, 24 september 1989 (Jan Stok).
Juvenile Red Kite at Falsterbo, South-Sweden, 24 september 1989.