

Havik *Accipiter gentilis* slaat Meerkoet *Fulica atra* op open water

Bennie van den Brink

Op donderdagmorgen 18 april 2003 waren ondergetekende en Benno van den Hoek getuige van een bijzondere poging van een Havik om een prooi te bemachtigen. Tijdens het vangen van rietvogels ten behoeve van het Constant Effort Site project van het Vogeltrekstation namen we op onze vangplek, gelegen in de rietkraag van het Veluwemeer nabij Elburg, een overvliegende Havik waar die onverwacht naar beneden dook. Met onze kijkers konden we zien, dat de Havik kort daarop tot halverwege zijn borst in het water stond. Hij (of zij?) was 5-10 m van de rietkraag verwijderd. Ter plekke is het water ongeveer 30-40 cm diep. De vogel bewoog zich niet behalve dat hij alert om zich heen keek, kennelijk om een blauwe reiger en een knobbelzwaan in de gaten te houden die zich niet ver van hem bevonden. We vonden het vreemd dat hij op dezelfde plaats bleef staan en bijvoorbeeld geen aanstalten maakte om te gaan badderen. Na ruim een minuut vloog hij opeens op en verdween naar de overzijde van het randmeer, richting Flevopolder. Onmiddellijk na zijn opvliegen kwam op dezelfde plek een meerkoet boven water. Deze verdween haastig zwemmend in de rietkraag.

Kennelijk had de Havik de meerkoet geslagen en had hij geprobeerd hem onder water houdend te verdrinken. Het water was waarschijnlijk te diep om hem op de bodem te drukken en met zijn klauwen te doden. De meerkoet was blijkbaar goed in staat geweest zo lang zonder nadelige gevolgen onder water te blijven, want deze zwom zonder problemen direct weg. Ongetwijfeld zal hij verwondingen hebben opgelopen, maar vermoedelijk niet van ernstige aard. De Havik gaf het dus te snel op. Blijft bijzonder dat een Havik een poging doet op open water een prooi te bemachtigen (zie ook De Takkeling 9: 135-136, 10: 150-151, en deze Takkeling).

Summary: Northern Goshawk *Accipiter gentilis* catches Eurasian Coot *Fulica atra* on open water

On 18 April 2003, a passing Northern Goshawk suddenly descended and was shortly afterwards seen standing breast-deep in 30-40 cm deep water, some 5-10 m from the nearest reedbed. It didn't move, except for intently watching the surroundings. After more than a minute, the bird flew away. Immediately afterwards, an Eurasian Coot surfaced from exactly the same spot. Apparently, the Goshawk had captured the Coot and held it submerged, but not long enough to have it drowned.

Adres: Zomerdijk 86, 8079 TL Noordeinde.