

Te voet jagende Bruine Kiekendief *Circus aeruginosus*

Herman Nuijen

Op 4 augustus 2002 waren mijn vrouw en ik in de Arkemheense Polder onder Nijkerk (G.), een zomerdag met wolken en zon, weinig wind en een temperatuur van ongeveer 23 °C.

Tussen 14.00 en 15.00 uur zagen wij een Bruine Kiekendief op geringe hoogte in langzame vlucht boven de weilanden jagen. Op zeker ogenblik ging de vogel aan de rand van een begroeiende sloot staan. Vervolgens liep de vogel langs de slootkant, daarbij af en toe half of geheel verdwijnend achter of tussen hoog opgeschoten vegetatie. Soms bleef de kiekendief zoekend staan, om daarna de wandeling voort te zetten. Bij deze actie legde de kiekendief in 20-30 minuten naar schatting 75 meter af. Of de vogel prooi ving, konden wij niet waarnemen.

Dergelijk jaaggedrag te voet van een Bruine Kiekendief is wel eens in eerdere publicaties beschreven (King 1961, Clegg 1961, Schipper *et al.* 1975), hoewel van een ander karakter dan bij onze waarneming. King (1961) nam eind februari 1959 bij Minsmere in Suffolk (Engeland) jacht te voet waar van een paartje Bruine Kiekendief in een ruig, grasachtig veld. Deze vogels onderzochten voornamelijk de grotere pollen gras. De desbetreffende vogel bracht dan de poten dicht bij elkaar en sprong op de pol gras. Onmiddellijk bracht de kiekendief dan zijn kop naar de poten, nam snel iets in de snavel en verslond het object. Wat de prooi was, bleef onbekend.

Clegg (1961) nam op 16 juli 1960, eveneens te Minsmere, vijf Bruine Kiekendieven waar op een ruig grasveld aan de rand van het moeras. Twee vogels van deze groep, een vrouw en een juveniel, zaten op een struikje, terwijl de overige drie, alle juveniel, op de grond verbleven. Van tijd tot tijd sloegen de drie vogels krachtig met de vleugels en bewogen zich met kleine sprongetjes een eindje voorwaarts. Clegg dacht aanvankelijk aan vliegexercities, maar was er later van overtuigd dat de vogels trachtten te springen op iets dat in het gras aanwezig was, ofschoon zij niets van de grond schenen op te pakken.

Tenslotte kunnen we nog in het kort vermelden hetgeen Schipper *et al.* (1975, pagina 22) in hun studie over het jaaggedrag bij overwinterende Blauwe Kiekendieven *Circus cyaneus* en Bruine Kiekendieven in Flevoland en in de Camarque (Zuid-Frankrijk) opmerken: "*Ground hunting was seen in males and (females) of C.c and C.a., mostly in habitats where voles (Microtus arvalis) abounded*".

Summary: Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus* hunting on foot

On 4 August 2002, a Eurasian Marsh Harrier was seen hunting on foot along a ditch in a polder in the central Netherlands. During the 20-30 minutes' walk, the bird covered some 75 metres. Prey capture was not witnessed but the bird occasionally disappeared from view in the tall vegetation.

Literatuur

- Clegg T.M. 1961. Unusual behaviour of Marsh Harriers. Brit. Birds 54: 428-429.
King B. 1961. Unusual feeding behaviour of Marsh Harriers. Brit. Birds 54: 161.
Schipper W.J.A., Buurma L.S. & Bossenbroek Ph. 1975. Comparative study of hunting behaviour of wintering Hen Harriers *Circus cyaneus* and Marsh Harriers *Circus aeruginosus*. Ardea 63: 1- 29.

Adres: van Hogendorplaan 10, 1215 EH Hilversum.



Prooiovergave van Bruine Kiekendieven (tekening: Kees Keijzer).