

# Buizerd *Buteo buteo* snaait prooi van Blauwe Reiger *Ardea cinerea*

Leo Stockmann

Op 21 februari 2008 fiets ik van mijn werk naar huis door de oostkant van het Matslootgebied ten zuiden van Hoogkerk en zie in het grasland een Blauwe Reiger staan die een mol in zijn snavel heeft. Blijkbaar ligt de mol niet lekker in de snavel om doorgeslikt te worden en de vogel legt de prooi vlak voor zijn tenen op de grond. De mol wordt weer opgepakt, maar eenzelfde handeling volgt. Opeens komt er vlak boven het maaiveld een Buizerd met gezwinde snelheid richting reiger vliegen en snaait de mol bij zijn poten weg. Nagenoeg in één beweging door vliegt de Buizerd met de mol in zijn klauwen door naar een bosje in de buurt. De reiger reageert verbouwereerd op de brutaliteit van de Buizerd en laat een luide kreet horen. Dan vliegt hij op en landt 150 meter verder op het grasland. De Buizerd was zo zelfverzekerd en direct bij zijn handeling om de mol van de reiger af te pakken, dat ik denk dat hij al een tijdje in de gaten had dat de reiger een prooi had. Misschien zat hij wel in de buurt op een paaltje, maar dat heb ik niet gezien.

Het stelen van een prooi van een ander dier wordt kleptoparasitisme genoemd (kleptein komt uit het Grieks en betekent stelen). Het is zeker geen ongewoon verschijnsel in de dierenwereld. Bij vogels hebben de jagersoorten deze manier van voedselvergaren 'tot norm verheven'. Maar ook reigers zelf doen er aan mee.

## Summary

**Stockmann L. 2011. Buzzard *Buteo buteo* snatches prey from Grey Heron *Ardea cinerea*. De Takkeling 19: 116.**

On 21 February 2008 a Grey Heron had its prey, a mole *Talpa europaea*, snatched away by a Buzzard the very moment that it laid the mole in front of its legs. The Buzzard took the prey in its feet and deftly disappeared in a nearby woodlot.

*Adres: Anemoonweg 40, 9765 HG Paterswolde.*