

Inventarisatie van de Oostelijke helft van de van Stirumsduinen
in de A.W. duinen in 1971

door de heren C. en J. Bouwmeester.

Terreinbeschrijving: (terrein no. 14)

Het terrein bestaat uit delen van Starrenbroek, Grote Vlak en Boeveld, waarin de Smitte-Schoenmakers-, Ruige-, Rozen-, Engelen- en Schapendel en de Gijs Kokkieshoek. De grenzen worden gevormd door de Langevelderslag, de weg door het Grote Vlak, het onverharde deel van de Ruigenhoeker-Schulpweg, het raster van het zweefvliegveld en van hier het fietspad tot de Langevelderslag. De omringende wegen hebben een lengte van 4 km. asfalt en 1,1 km. gras- en zandpad. Bovendien wordt het terrein nog doorsneden door 500 m. puinpad en 2,5 km. gras- en zandpaden. De Langevelderslag en het fietspad liggen buiten het raster en worden druk bereiden door het verkeer. De overige wegen liggen binnen het raster en hiervan worden de geasfalteerde vrij druk en de andere weinig belopen.

Het terrein heeft een oppervlakte van 90,2 ha. en is sterk geacsideerd.

Hoge duinen en diepe dalen volgen elkaar snel op. Het grootste deel van het terrein ligt tussen 10 en 15 m. boven A.P. terwijl de hoogst aanwezige duin gevormd wordt door de Langeveldeberg met ruim 26 m. boven A.P. direct gevolgd door de Berg van Starrenbroek en Arkduin met resp. 21,7 en 21,2 boven A.P.

Er zijn maar weinig lage terreindelen van enige oppervlakte zoals de Rozendel, het Grote Vlak en een deel van Starrenbroek ten zuiden van de Schulpweg.

Hier varieert de maaiveldhoogte tussen 4,5 en 6 m. boven A.P. Starrenbroek is voornamelijk begroeid met een ondoordringbare duindoornwildernis met hier en daar een Meidoorn of Vlier. Op één plaats staan nog enige Essen en Zwarte Elzen (vroeger aangeplant). De Rozendel is begroeid met Meidoorn, Egelantier, Berk, Wilg, Esp en Liguster en is buiten de paden ondoordringbaar. In het Grote Vlak vindt men Meidoorn, Berk, Esp, Egelantier, Liguster, Kruiwilg en bovendien een goed ontwikkelde kruidenvegetatie. In sommige natte winters staat een groot deel van het

Grote Vlak ± 50 cm. onder water wat waarschijnlijk komt doordat zich hier een grote veenplaat bevindt.

Als we al het bos- en duinstruweel bij elkaar tellen, komen we slechts aan 7,5 ha. Het overige deel van het terrein bestaat uit vrij kale duinen met hier en daar een Duindoorn-, Liguster of Kruipwilgveldje. Veel hellingen zijn begroeid met Dauwbramen en verspreide Ligusterstruiken.

Inventarisatie:

Kievit	3 paar	Zanglijster	2 paar	Grasmus	13 paar
Houtsnip	1 "	Merel	4 "	Braamsluiper	2 "
Wulp	2 "	Tapuit	8 "	Fitis	28 "
Houtduif	6 "	Paapje	3 "	Koolmees	1 "
Tortelduif	4 "	Gekr.Roodstaart	1 "	Staartmees	1? "
Ransuil	1 "	Nachtegaal	4 "	Geelgors	1 "
Veldleeuwerik	10 "	Sprinkh.rietz.	4-5 "	Kneu	9 "
Boompieper	6 "	Spotvogel	1? "	Ekster	5 "
Winterkoning	2 "	Zwartkop	3 "	Vl.Gaai	1 "
Heggemus	9 "	Tuinfluiters	1 "		

De Spotvogel en de Staartmees staan met een vraagteken genoteerd, daar het niet uit te maken was of ze net binnen of buiten de grens van het te inventariseren terrein broedden. Hoe belangrijk de bosjes in het Grote Vlak en de Rozendel zijn blijkt wel uit het feit dat van de in totaal 136 broedparen hier 41 paar tot broeden kwamen op een oppervlakte van 7 ha., dit komt neer op 5,86 broedparen per ha., wat vergeleken bij de rest van het terrein een vrij hoge dichtheid is. Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 27 en 2 dubieuze. Het totaal aantal broedparen bedroeg 135-136 en 2 dubieuze, wat voor het 90,2 ha. grote terrein neerkomt op 1,51 broedpaar per ha.

Namens alle inventarisanen samen-
gesteld door H.Vader.