

Inventarisatie van enige Broedvogels
in de A.W. duinen in 1971

Evenals vorige jaren hebben wij getracht van een aantal broedvogels zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, om enigszins een indruk te krijgen van het aantal broedparen.

De soorten, die geïnventariseerd werden, waren o.a. de soorten die landelijk geteld werden, zoals Paapje, Wielewaal en Oeverzwaluw.

Verder werden dié soorten gekozen waarvan we niets wisten en soorten waarvan we een voor of achteruitgang verwachtten.

Van enkele soorten zal het aantal geïnventariseerde broedparen vrij eksakt zijn, van andere soorten wordt buiten het geïnventariseerde aantal een schatting gemaakt, aan de hand van de oppervlakte geschikt biotoop.

Door de uitgestrektheid van het terrein was het niet mogelijk om alle geschikte terreinen voldoende te onderzoeken.


Het Paapje handhaafde zich met een redelijk aantal, toch is onze indruk dat de stand achteruit gaat. Dit geldt zeker voor het Middenveld, Zwarte- en Witteveld. Opvallende dichtheden komen voor langs het vroeger zeer weinig door ons bezochte van Limburg Stirumkanaal. Bekijken we de verspreiding in de gehele A.W. duinen dan zien we dat 26 paar in het N.H. gedeelte en 31 paar in het Z.H. gedeelte broedden. Het N.H. gedeelte is $\pm 2/3$ en het Z.H. gedeelte $\pm 1/3$ deel van de A.W. duinen.

In een strook van 1 km. breed langs de kust (8 $1/4$ km. lang) broedden 30 paar. In het Groot Zwarteveld broedden nog ± 15 paar. In het overige gedeelte van de A.W. duinen is het Paapje een schaarse broedvogel. In totaal telden we 50-57 paar. Geschat 60-70 paar.

De Wielewaal lijkt weer iets achteruit te gaan na de opleving van vorig jaar. Er waren dit jaar maar 7 territoria waar deze prachtige vogel met zekerheid heeft gebroed. Op nog 3 andere plaatsen werd wel enige malen een zingend ♂ aangetroffen, doch te kort om met zekerheid als broedgeval aan te nemen. Zodat we voor 1971 kunnen rekenen op 7-10 broedparen (1970 12 paar).

De Oeverzwaluw was slechts met één kleine kolonie van 5 paar vertegenwoordigd. Als er geen hulp geboden wordt in de vorm van een speciaal te maken Oeverzwaluwwand dan zal dit aardige zwaluwtje binnen enige jaren als broedvogel uit de A.W. duinen verdwenen zijn.

Van de Tapuit ontbraken de laatste jaren betrouwbare gegevens. In de jaren 1960-1968 schommelde het aantal broedparen tussen de 10 en 15 paar. De laatste jaren werd een vooruitgang vastgesteld, doch gegevens over het juiste aantal ontbraken ons. De Zeereep werd dit jaar geïnterviewd en alleen hier werden al 14 broedparen vastgesteld. De Zeereep werd tot enige jaren terug niet bij ons gebruikelijk onderzoek gebied gerekend. In de zeeveldjes werden dit jaar 9 paar vastgesteld en in het Z.H. gedeelte van de A.W. duinen nog



eens 17-24 paar. In het overige terrein is de Tapuit met 4-7 paar een zeldzame broedvogel. In totaal is de broedvogelstand 44-54 paar. Schatting \pm 60 paar.

Van de Tortelduif wisten we dat het een talrijke broedvogel was, doch niemand kon vermoeden dat hij zo algemeen was, als uit deze inventarisatie bleek. De Tortel broedt in de gehele A.W. duinen van de kale Zeereep tot de beboste binnenduinrand. Verdelen we het terrein in de lengte in 2 ongeveer gelijke delen, dan zien we dat 61 paar in de westelijke, en 202 paar in de oostelijke helft van de A.W. duinen broeden. Dit brengt de telling op 249-263 paar. Aangezien grote delen van het terrein onvoldoende onderzocht werden is een schatting van 300-400 paar waarschijnlijk het dichtst bij het juiste aantal.

De Witte Kwikstaart was 10 jaar geleden een zeldzame broedvogel (minder dan 5 paar). De stand ging aanmerkelijk vooruit toen de oude kanalen werden afgegraven, verbreed en met puinranden verstevigd tegen afslag. De Kwikstaart vond namelijk een ideale broedgelegenheid tussen de stenen van de puinranden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verspreiding van de Witte Kwikstaart vrijwel uitsluitend langs de kanalen is. Hier en daar broeden ze echter ook onder bruggen en in de uitmondingsbakken (U-bakken) van de draineringen. Een enkel paartje broedt op de grond tussen het helm. We telden dit jaar 30-40 paar.

De Watersnip ging dit jaar weer aardig vooruit. Door de grote droogte in het terrein werden een aantal broedplaatsen in het Witte- en Zwarte veld verlaten.

Daarentegen steeg het aantal broedparen in het 1e infil.geb. Verder waren de oude broedplaatsen langs het Rechte Schuster- en Barnaartkanaal weer bezet. In totaal telden we 11-14 paar.

De Groenling schijnt aan sterke schommelingen onderhevig te zijn. In 1970 viel het grote aantal broedparen op, zodat dit jaar werd besloten om ze te tellen. Hoewel er zeker een grote vooruitgang is vergeleken met zo'n 10 jaar terug, viel het aantal broedparen toch wat tegen. Zoals te verwachten was ligt het grootste aantal broedplaatsen in het binnenduin. Hier broedt de Groenling zowel in loof- als in naaldhout. In het middenduin konstateerden we enige broedgevallen in nog jonge dennenaanplanten. In totaal telden we 38-42 broedparen. Geschat 50-60 paar.

De Graspieper blijft vrij stabiel en de broedplaatsen zijn nog steeds beperkt tot het uiterste westen van het duin. In de Zeereep broedden 4-5 paar in vrij hoog helm. De broedparen in de zeeveldjes en de Vlaayen prefereren echter een minder hoog begroeid doch wel grazig terrein. We telden 8-11 broedparen.

De Roodborsttapuit gaat de laatste jaren weer iets vooruit. Tijdens inventarisatie van de Zeereep kwamen 13 paar aan het licht. Verder broedden nog 5 paar in de Zeeveldjes, 1 paar in het 1e infil.geb. en 1 paar langs het van Limburg Stirumkanaal. Alle broedgevallen lagen binnen 1 km. van de zee, op één niet zeker broedgeval na, wat vlak ten westen van het Panneland was.

In totaal telden we 20-21 paar. Schatting ± 25 paar.

De Grauwe Vliegenvanger is een bijzonder onopvallende vogel, die daardoor vaak aan onze aandacht is ontsnapt. Het aantal broedparen werd hierdoor altijd onderschat. De Grauwe Vliegenvanger prefereert loof- en gemengde bossen, welke voornamelijk aan de binnenduinrand zijn gelegen. In totaal telden we 21-24 broedparen. Schatting 25-30 paar.

De Rietzanger gaat slechts zeer langzaam vooruit en beperkt zijn broedterrein nog steeds tot het 1e infil.geb. Totaal 5 paar.

Van de Bosrietzanger werden 2 broedparen vastgesteld langs het Barnaartkanaal.

De Tjiftjaf was altijd een zeer schaarse broedvogel in de A.W. duinen, doch de laatste jaren ging de stand vooruit. Nu we de Tjiftjaf inventariseerden, bleek dat juist dit jaar de stand lager was dan ooit.

In vele terreinen waar de Tjiftjaf jaarlijks present was, bleek hij nu niet voor te komen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat juist op het moment dat

o.a. de Tjiftjaf tijdens de voorjaarestrek Frankrijk passeerde er hier een koudegolf was. Zo bleek er op 10 maart veel sneeuwval en temperaturen rond de 0 C. in Zuid-Frankrijk te zijn, waardoor beslist grote aantallen trekvogels zullen zijn omgekomen. We telden dit jaar slechts 14-15 broedparen. Schatting \pm 20 paar.

De Kuifmees blijft vrij stabiel. De broedplaatsen lagen vanouds langs de Blauwe Weg en in het Rozenwaterveld en Zandvoortervlakje.

We telden 5-6 broedparen. Schatting \pm 10 paar.

Het Goudhaantje blijft een zeldzame broedvogel en komt uitsluitend voor in de dennenbossen. We telden 3 broedparen. Schatting \pm 5 paar.

Van de Putter hebben we nooit eksakte gegevens kunnen verzamelen. Dit jaar werd minstens 1 broedpaar vastgesteld. Het is echter mogelijk dat er meerdere broedparen zijn, want tijdens het broedseizoen werden meerdere zingende en overvliegende Putters gezien.

De Barmsijs gaat het nog steeds voor de wind. Alleen in terreinen die zeer regelmatig door ons bezocht werden was het mogelijk om broedgevallen met zekerheid vast te stellen. Alle gekonstateerde broedgevallen lagen in het middenduin.

De grootste concentratie was tussen het Panneland en de Lindbergweg, hier broedden 11 paar. De Barmsijs prefereert als biotoop in de A.W. duinen dicht begroeide duinvlakten met veel Meidoorns en Berken. De gevonden nesten lagen tot nu toe allemaal in Meidoorns. In totaal telden we 11-16 paar. Schatting 20-25 paar.

De Stormmeeuw ging dit jaar weer vooruit. Op de volgende plaatsen werden de Stormmeeuwen broedend aangetroffen: 2e infil.geb. \pm 10 paar, 3e infil.geb. \pm 25 paar, Kromme Schusterkanaal oost \pm 25 paar. Totaal is dit \pm 60 paar.

De Zilvermeeuw blijft vrij stabiel. Dit jaar kwamen 11 paar tot broeden. Ondanks het verbod werden 3 nesten uitgehaald!

De Kokmeeuw ging dit jaar weer iets vooruit. We telden in de verschillende kolonies 2870 nesten, maar omdat we dit jaar erg laat telden zal een aantal nesten over het hoofd gezien zijn. Een schatting voor dit jaar is \pm 3000 paar. (vorig jaar 2741 paar).

De Fuut ging dit jaar hard achteruit. De oorzaak hiervan was de bijzonder lage waterstand van de kanalen. Op alle oude broedplaatsen waren in het voorjaar de Futen aanwezig, doch de broedgelegenheid ontbrak. Op sommige plaatsen was een

steil zandtalud van 3 tot 5 m. ontstaan, terwijl de waterstand nog steeds dalende was. Slechts 1 paar kwam tot broeden in het Zwarteveldekanaal, helaas werd het eerste broedsel door het publiek verstoord. Een tweede broedsel van vermoedelijk hetzelfde paar heeft 2 jongen opgeleverd.

Van de Dodaars kunnen we ook geen opwekkende mededelingen doen. Na de achteruitgang van vorig jaar heeft de stand zich dit jaar niet hersteld.

De broedgevallen waren: Renbaan 2 paar, Eendenmeer 1 à 2 paar.

Totaal is dit 3 à 4 paar voor het hele duingebied.

De Visdief bleef ondanks de dichtere begroeiing de broedplaats van vorig jaar trouw. Op de eilandjes in de Renbaan broedden 2 à 3 paar.

Van de Boerenzwaluw kon slechts 1 paar vastgesteld worden, aan de woning van de heer J.L. Zantvoort.

