

Broedvogelinventarisatie van Zeeveld, 1ste en 2de Vlaaye,  
Kraaienveld, Dokterdrift en Dennenstrook in  
1974, 1975 en 1976.

Geinventariseerd door H. Vader.	terreinummers		
	<u>1974</u>	<u>1975</u>	<u>1976</u>
	44 noord	44 zuid	47

Terreinbeschrijving:

De grenzen van het terrein worden gevormd in het noorden en westen door het grensraster van de A.W. duinen, verder Zilkerpad, Westerkanaal en Noordoosterkanaal tot P. E. N. gebouwtje.

Het terrein behoort tot de zeeduinen met uitzondering van het noordoostelijk deel van het terrein, genaamd Doktersdrift en Dennenstrook. Dit deel van het terrein moet tot het middenduin gerekend worden.

Het gehele terrein ligt binnen de Gemeente Zandvoort en de oppervlakte is 326 ha. Hiervan is ca. 3 ha. begroeid met Oostenrijkse dennen van 8-10 m. hoog (40-50 jaar oud) en 2,5 ha. met Oostenrijkse dennen van 4-6 m. hoog (20-25 jaar oud). Ruim 3 ha. is begroeid met oud bos voornamelijk bestaande uit Zwarte Populieren en Eiken, met hier en daar een enkele Kastanje, Vederesdoorn, Iep en Grauwe Abeel met ondergroei van Kardinaalsmuts, Meidoorn, Kamperfoelie en Egelantier en plaatselijk een mooie kruidlaag.

Het struweel beslaat een oppervlakte van 1 ha. en bestaat voornamelijk uit verwilderde tuinbegroeiingen van vroegere duinbewoners, we vinden er Sering, Jasmijn, Sneeuwbes en Bosrank, waartussen verwilderde bolgewassen.

Ongeveer 50 ha. is begroeid met Duindoorn en Liguster, voornamelijk op de lagere delen, afgewisseld door groepjes Vlieren of een enkele Meidoorn. Verder is er nog ca. 2,5 ha. water aanwezig in de vorm van kanalen (grens) en een enkel poeltje in het Zeeveld.

De overige 264 ha. bestaat uit wat kalere duinen en spaarzaam begroeide duinvlakjes. De hogere delen zijn veelal begroeid met Dauwbramen en iele Duindoortjes met eilandjes van Kruipwilg en Liguster.

De lagere delen en hellingen zijn begroeid met grassen, korstmossen, mossen en Kruipend Stalkruid, hier en daar afgewisseld met kale zandplekken waarin enige stuifkuilen voorkomen.

De agrarische activiteiten van de zandvoorters uit vroeger tijden zijn nog duidelijk zichtbaar in de vorm van uitgegraven rechthoekige veldjes.

Hier werden vroeger de beroemde duinaardappelen geteeld.

Het grootste deel van het terrein bestaat uit een hele reeks duinvlakjes die van elkaar gescheiden worden door smalle duinruggen.

De vlaktes liggen gemiddeld op 2-4 m. +N. A. P. en de duinruggen op 12-15 m. +N. A. P. Alleen in de noordoosthoek is een hoog duin, genaamd de Stokmansberg die op 28 m. +N. A. P. ligt.

Van belang is nog te weten dat het terrein in het noorden gedeeltelijk grenst aan de drukke Zandvoortselaan en in het westen aan een druk gebruikt rijwielpad (veel bromfietsen en loslopende honden).

Verder loopt nog door het terrein 7 km. asfalt of betonweg, 1,5 km. met puin en grind verhard pad en ca. 12 km. zand en graspaden.

Al deze wegen en paden worden in het broedseizoen zeer matig belopen of bereden.

#### Bespreking van enige vogelsoorten.

Het zal duidelijk zijn dat de broedvogel-bevolking van de N. O. hoek met zijn bos geheel afwijkt van de rest van het terrein. Zo broeden de volgende soorten alleen in dit deel van het terrein: Groene Specht, Grote- en Zanglijster, Gekr. Roodstaart, Roodborst, Spotvogel, Kool-, Pimpel-, Kuif- en Staartmees, Groenling en Vink. Omdat in de N. O. hoek ook nog enige woningen staan, met daarbij behorende tuinen waarin enige bomen en struiken groeien komen hier ook nog enige vogelsoorten voor die in de rest van het terrein ontbreken, dit zijn alle Turkse Tortels, Huis- en Ringmussen en de Spreeuwen.

In het Zeeveld zijn in enige diep uitgestoven zandkuilen poeltjes ontstaan, waar nu zelfs enig riet groeit. Deze poeltjes bevatten zelfs in droge zomers altijd nog enig water, wat voor de plaatselijke broedvogels van belang zal zijn. Opvallend was het voorkomen van 9-10 Rietgorzen (waarvan slechts 1 paar in rietpoel). Het biotoop van deze Rietgorzen was geheel afwijkend van wat we van ze gewend zijn, ze broedden n.l. in vrij droge duinvlaktes die dicht begroeid zijn met Duindoorns.

De Sprinkhaanrietzanger lijkt hard achteruit te gaan in het Zeeveld, zo konden 5-10 jaar geleden nog een tiental paren geteld worden, nu kwam ik niet verder dan 3-4 paar.

Flink vooruitgegaan zijn de Tapuit, Roodborsttapuit en Graspieper, terwijl de Grasmus zich weer aan het herstellen was.

Het aantal Wulpen bleef stabiel en mag goed genoemd worden, dit zal mede veroorzaakt worden door de rust die vooral in de broedtijd in dit gebied heerst.

Getallen tussen ( ) geven de dubieuze broedparen aan.

Broedvogellijst 1974+1975+1976.

Fuut	1 paar	Tapuit	27-28 paar
Wilde Eend	x "	Roodborsttapuit	12-15 "
Bergeend	x "	Paapje	3- 4 "
Patrijs	1 "	Gekr. Roodstaart	1- 2 "
Meerkoet	1 "	Roodborst	3 "
Scholekster	2 "	Sprinkhaanrietzanger	3- 4 "
Kievit	6- 7 "	Spotvogel	1 "
Wulp	14-16 "	Grasmus	35-38 "
Houtduif	22 "	Braamsluiper	(2) "
Tortelduif	5 "	Fitis	133-143 "
Turkse Tortel	5- 6 "	Koolmees	6 "
Koekoek	8 "	Pimpelmees	1 "
Groene Specht	2 "	Kuifmees	(1) "
Kuifleeuwerik	2 "	Staartmees	(1) "
Boomleeuwerik	1 "	Rietgors	9- 10 "
Veldleeuwerik	44-46 "	Groenling	2- 3 "
Boompieper	3 "	Kneu	77-82 "
Graspieper	19-21 "	Vink	1 "
Witte Kwikst.	(1) "	Huisemus	7 "
Winterkoning	25-29 "	Ringmus	1 "
Heggemus	90-94 "	Spreeuw	3 "
Grote Lijster	1 "	Ekster	x "
Zanglijster	3 "	Vlaamse Gaai	x "
Merel	10-12 "		

Het totaal aantal broedende vogelsoorten was 43 en 4 dubieuze. Het totaal aantal broedparen bedroeg 590-636+5 dubieuze (excl. eenden en kraaiachtigen), wat voor het 326 ha. grote terrein neerkomt op 1, 8-2, 0 broedparen per ha. (excl. eenden en kraaiachtigen).

○\*○