

*Bijlage I.*

**VERGADERING van de Commissie voor het  
Floristisch Onderzoek van Nederland op 11  
April 1917 te 's Gravenhage in het Zuid-Hol-  
landsch Koffiehuis te 11 uur.**

---

Aanwezig waren de dames Berkhout en v. d. Werk benevens de heeren: Danser, de Haas, Henrard, Jansen, Kloos, Quarles van Ufford, Schuyt, Sloff, des Tombes, Tap, Vuyck en Wachter terwijl van de heeren Blaauw en Heukels bericht van verhindering was ingekomen.

De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd.

De heer Henrard besprak aan de hand van talrijk materiaal eenige in ons land waargenomen soorten en vormen uit het geslacht *Lepidium* (zie zijn artikel in Kruidk. Archief 1916).

De heer Kloos toonde eenige afwijkende exemplaren van verschillende inlandsche *Veronica*-species en verzocht medewerking bij de bestudeering van dit geslacht. Vervolgens deed hij mededeeling van een onderzoek door hem ingesteld naar de in ons land (adventief) waargenomen vormen van *Bromus unioloides* (zie opstel daarover verderop).

De heer Quarles van Ufford opperde twijfel aan het nut van een onderzoek der adventieven maar moest na eenige discussie toegeven, dat men, speciaal met het

oog op de toekomst, dit onderzoek niet nauwkeurig genoeg kan doen plaats vinden.

De heer. Sloff toonde de voornaamste planten door hem op de Vereenigingsexkursie om Breda verzameld, besprak eenige critische planten en gaf aan de hand van cartografische en fotografische opnamen een overzicht over de vegetatie van dat deel van N. Brabant, welk onderzoek hij nog meer in details zal trachten uit te werken voor 't westelijk deel van *N. Brabant*.

De heer Schuyt toonde eenige planten in den omtrek van Wamel verzameld.

De heer Wachter vestigt de aandacht op *Helianthemum guttatum*, door een zijner leerlingen gevonden bij Nijmegen. Dit is dan de tweede vindplaats van deze plant, die niet aan zee ligt. (In den Prodrusus staat nog vermeld *Soesterberg*).

Verder bespreekt hij aan de hand van inlandsch herbarium-materiaal enkele soorten van het geslacht *Potentilla*. In de eerste plaats *Potentilla argentea* L., waarvan hij vertoont de vormen *typica* Beck, *decumbens* Jord., *demissa* Th. Wolf en *tenuiloba* Schwarz. De var. *incanescens* Focke komt, voor zooverre hij weet, nog niet inlandsch voor; de als zoodanig gehouden plant in Prodr. Fl. Bot. Ed. II is z. i. een vorm van *decumbens* Jord.

Verder wijst hij op de *Rivales*: *P. supina* L., *P. norvegica* L. en *P. intermedia* L. Van *P. supina* L. toont hij ex. der vormen: *decumbens* Freyn, *limosa* Boenningh en *elatior* Lehmann. De beide andere soorten zijn soms zeer lastig van elkaar te onderscheiden, vooral als de onderste bladen niet meer aanwezig zijn. Deze zijn bij *P. norvegica* L. gevederd en bij *P. intermedia* L. 5 tallig. De kenmerken ter onderscheiding, ontleend aan beharing, bovenste bladen en vruchtkelk gaan wel zeer dikwijls, maar toch niet altijd op. Ook van *P. norvegica* *Monspeliensis* (L.) A. et G. en *P. intermedia* *Heidenreichii*

Focke werden ex. ter tafel gebracht. Deze laatste komt volgens spr. in Nederland nog altijd *minder* voor dan *P. intermedia typica* Rupr., juist andersom dan voor Duitschland wordt aangegeven (A. en G. VI. 1. p. 750). Ten laatste komen enkele vormen van *P. silvestris* Necker en *P. procumbens* Sibth. Bij de eerste wordt bijzonder gewezen op de var. *petiolata* Van den Bosch. Tot deze vorm worden door Ascherson en Graebner enkel Alpenvariëteiten gebracht, hoewel het authentieke ex. een duinplant is. Spr., die dit treurig ex. in het herb. der N. Bot. Ver. heeft gezien, kan niet met zekerheid verklaren, dat dit fragment werkelijk tot *P. silvestris* Necker behoort. Van *P. silvestris* wordt ook de vorm *latiloba* A. et G. besproken.

Van *P. procumbens* wordt rondgegeven de vorm *parvifolia* A. et G., benevens de bastaard met *P. silvestris*, en bovendien nog een monstrositeit van *P. reptans* L. met bijzonder groote buitenkelkblaadjes.

De heer Jansen bespreekt *Aira divaricata* Lois. (zie Flor. Aant. XIII), *Agrostis alba* var. *albida* Trin. (uit Santpoort), *Poa nemoralis rariflora* (uit Z. Limburg), *Stipa trichotoma* Nees, *Avena barbata* Roth.; verder *Brachypodium distachyon* waarvan hij oude exemplaren toonde van de Beyer (Leeuwenberg, tot nu toe niet bekend!) benevens nieuwe, te A'dam adventief waargenomen en gaf aan de hand van buitenlandsch materiaal een overzicht over de vormen dezer soort. Daarop besprak hij de in ons land waargenomen soorten en vormen van het geslacht *Phalaris* (zie Flor. Aant. XI) en toonde hij vele „nieuwe” adventiefplanten. Teven maakte hij opmerkzaam op de verwarring van *Artemisia biennis* Willd en *Artemisia Tournefortiana* Rchb. Beide soorten kunnen onderscheiden worden door de volgende kenmerken:

*A. biennis* Willd.: kopjes breed, bekervormig tot kogelrond, veelbloemig, in korte aarvormige trossen.

Omwindselbladen *behaard*, breed, groen met smallen bruinen vliezigen rand. Bloembodem grooter dan bij de volgende soort.

A. *Tournefortiana* Rchb.: kopjes eivormig, kleiner in dichte okselstandige, zittende, samengestelde aarvormige trossen. Omwindselblaadjes *kaal*, omgekeerd-eivormig, spits, vliezig met *smal* groen middelveld. De eerste soort is bekend o. a. van *Wormerveer*, de tweede o. a. van Rotterdam, terwijl de overige tot nu toe voor *Artemisia Tournefortiana* Rchb. gehouden planten nog aan een nader onderzoek dienen te worden onderworpen.

Daarna toonde de heer Henrard nog eenige nieuwe adventieven en sloot de voorzitter om 5 uur de zeer geanimeerde vergadering.

---