

# BIJDRAGE TOT DE MYCOLOGISCHE FLORA VAN NEDERLAND

DOOR

DE CONSERVATRICE DER NED. MYCOL. VER.  
(VERVOLG OP DE IN NED. KRUIDK. ARCH. 1921 GEPUBLI-  
CEERDE NIEUWE BASIDIOMYCETAE).

---

Basidiomycetae.

Eubasidiae.

Agaricaceae.

Leucosporaeae.

*Mycena*.

*M. adonis* (Bull.) Fr. t. 560 (*Agar.*) f. 2, Hym. Eur. p. 134, Cooke III, t. 185, Wint. Kr. Fl. 1, 765, Sacc. Syll. V, 258.

Deze mooie soort werd in enkele ex. gevonden in het dennenbosch van Hyinck te Winterswijk door G. D. Swanenburg de Veye, den 28sten Oct. 1923 op de Exc. der Consuls der N. M. V.:

Zij is in een fraaie teekening voor de Flora vastgelegd.

*M. elegans* Pers. Syn. p. 391, (*Agar.*) Fr. Syst. Myc. I. p. 149, Hym. Eur. p. 131, Sacc. Syll. 5,253, Wint. Kr. Fl. I, 767.

Deze soort werd in Sept. 1922 door A. J. P. Oort gevonden in de duinen van Katwijk.

Mijns inziens staat deze soort, welke zich, even als *M. citrino-marginata* Gill. hierdoor kenmerkt, dat de lamellen omzoomd zijn door een gekleurden rand, dicht bij *citrino-marginata*, reeds voor ons land bekend. Oort vond haar

in dennenbosch, waar volgens de auteurs *elegans* altijd en *citrino-marginata* nooit voorkomt.

*M. tenella* Fr. Epicr. p. III (excl. syn. Schum.), Hym. Eur. p. 147, Cooke III, t. 190, *A. carneifolius* Secr. No. 951, Sacc. Syll. V, 288, Wint. Kr. Fl., I, 754.

Deze soort werd den 23sten Nov. 1923 in enkele ex. gevonden te Tietjerk in Friesland door den Heer en Mevr. A. N. Koopmans—Forstman.

#### Omphalia.

*O. Belliae* Johnst. apud Berk. Ann. Hist. Not. I, vol. 7, t. 10, f. I. Outl. p. 34, Hym. Eur. p. 165, Cooke III, t. 251, Sacc. Syll. V, 332.

Deze soort werd den 14den Oct. 1923 gevonden, groeiende op riet bij 't Naardermeer door K. Boedyn c.s. en door hem als zoodanig gedetermineerd. Zij is voor de Flora vastgelegd.

*O. leucophylla* Fr. Vet. Ak. Föhr 1851, p. 45, Hym. Eur. p. 157, Cooke III, t. 288, Sacc. Syll. V, 313, Wint. Kr. Fl., I, 747.

Deze soort werd den 1sten Nov. 1923 gevonden te Zeist, door de Heeren Dr. T. Broeksmit en C. Brakman.

#### Lactarius.

*L. cupularis* Bull., *L. cyathula* Fr. Epicr. p. 344, Hym. Eur. 433. C. et D. 446, Ricken, die Blätterpilze, nr. 127, Pl. 13 f. 6, Sacc. Syll. 5,449, Wint. Kr. Fl. I, 546.

Volgens de nomenclatuur van C. et D., noem ik deze soort: *cupularis* en niet zoo als de meeste auteurs: *cyathula*. Zij werd mij in Sept. 1922 gebracht door G. D. Swan. de Veye, die haar vond te Soest aan een slootkant onder boomen. Ofschoon het ex. bij ontvangst niet zoo heel frisch meer was en daarom voor afbeelding helaas ook niet meer geschikt, kon zij toch met zekerheid tot deze soort worden thuisgebracht, waar het volgens den vinder bij 't plukken melksap gaf. Het geheele padden-

stoeltje was zeer teer en dunvleezig. De kleur van hoed en steel waren vleeschkleurig.

#### Russula.

*R. mustelina* Fr. Epicr. p. 351, Hym. Eur. p. 441, Sacc. Syll. V, 455, Wint. Kr. Fl. I, 699.

Deze door mij als zoodanig gedetermineerde soort werd den 17den September 1923 gevonden door den heer P. J. Hoogland te Meyendel bij Wassenaar. Zij is in een teekening voor de Flora vastgelegd.

#### Lenzites.

*L. tricolor* (Bull.) Fr. Epicr. p. 406, Hym. Eur. p. 494, Quélet p. 345, Sacc. Syll. V, 639, Wint. Kr. Fl. I, 491.

Deze soort werd den eersten dag van de Consuls-Exc. te Winterswijk, 27 Oct. 1923 door G. D. Swan, de Veye gevonden op geveld eikenhout bij een boerderij. Zij is voor de Flora vastgelegd in een fraaie teekening.

#### Rhodosporeae.

##### Volvaria.

*V. media* (Fl. Dan.) Fr. Hym. Eur. p. 184, Fl. Dan., t. 1676, f. 2, Ricken, die Blätterpilze, nr. 809, Sacc. Syll. 5,662.

Deze soort werd door mij ontdekt te Breda den 16en Sept. 1922, toen ik aldaar een tentoonstelling in orde hielp maken van de N. N. V. afd. Breda. Door wie gevonden of gezonden, was onbekend.

Ofschoon de sporen 4—5 en geen 20  $\mu$  maten, zooals Ricken, volgens Quélet, geeft, geloof ik wel, dat de determinatie juist is.

##### Pluteus.

*Pl. granulatus* Bres. Fungi Trid. p. 10, t. VII, *Pl. plautus* Q. nec. Fr., Sacc. Syll. V, 674, Wint. Kr. Fl. I, 858.

Mevr. M. Boetje—v. Ruyven vond deze soort bij den Haag den 6den Oct. 1923.

*Pl. patricius* Schulz. in Kalchbr. Hung. p. 20. t. 10,

f. 2, Fries Hym. Eur. p. 186, Ic. Boudier, Pl. 87, Cooke, 565, Bigeard, Champ. supérieurs de France, II, p. 170, Sacc. Syll. 5, 665.

Den 10en Juli op een exc. in de omstreken van Zeist gehouden, door C. Cool, Dr. T. Broeksmit en C. Brakman, vond de laatste in een holte van een jongen beuk (de lit. geeft eik of esch), een *Pluteus*-soort, aan ons niet bekend. Haar te beschrijven is onnoodig, waar zij geheel overeenkomt met de plaat die Cooke van haar geeft.

Hoe is het mogelijk, dat, wie deze soort onder de oogen gehad heeft, haar tot een variëteit van *Pl. cervinus* Schff. rekent, wat de meesten der auteurs (Cooke en Boudier geven haar als soort) hebben gedaan, waar zij een absoluut ander ding is en veel meer tot de *pellitus*-groep behoort? C. et D. geven haar als var., Bigeard als forme, van *cervinus*. Ricken geeft haar in 't geheel niet.

Mej. H. van Stolk heeft haar in een fraaie teekening voor de Flora vastgelegd.

#### Nolanea.

*N. proletaria* Fr. Spic. p. 8, Hym. Eur. p. 206, Sacc. Syll. 5, 717, Wint. Kr. Fl. I, 711.

Ofschoon deze soort reeds tevoren door P. J. A. J. Meulemeester voor de omstreken van Zwolle werd opgegeven, werd zij nog niet voor onze Flora vastgelegd. K. Boedijn vond haar in 1922, terwijl G. D. Swan. de Veye haar den 10den Juli 1922 verzamelde op 't Huijs te Warmond.

Deze laatste exemplaren zijn voor de Flora in een fraaie teekening vastgelegd.

*N. versatilis* Fr.? Monogr. II, p. 297, Hym. Eur. p. 206, Ricken, die Blätterpilze, no. 890, Sacc. Syll. V, 717.

E. Kits v. Waveren vond deze soort in 't voorjaar 1923 op 't Huijs te Warmond. Deze soort werd door

hem als zoodanig gedetermineerd en is door mij eerst in geconserveerden toestand gezien. Waar mij de determinatie juist lijkt, durf ik haar wel te publiceeren.

**Claudopus.**

*C. parasiticus* Quélet (1878), Ricken, die Blätterpilze, nr. 912.

Deze soort werd in Augustus 1921 gevonden door H. J. Mac Gillavry in Nunspeet, groeiende op de lamellen van *Canth. cibarius*.

De determinatie is van K. Boedijn.

**Ochrosporeae.**

**Pholiota.**

*P. pudica* Fr. Hym. Eur. p. 218, Cooke III, t. 362, Sacc. Syll. V, 741.

Deze soort werd mij tijdens de tentoonstelling der N. M. V. te Leiden, 21—23 Sept. 1923, gebracht, door den Heer H. Boting, die haar in meerdere ex. vond in 't Naaldenveld bij Overveen. Ofschoon dicht staande bij *Ph. aegerita* Brigg. wijkt zij, vooral door haar dikvleezigheid, van laatste soort af. Met de plaat van Cooke komt zij geheel overeen.

**Inocybe.**

*I. hystrix* Fr. Epicr. p. 171, Hym. Eur. p. 228. Sacc. Syll. 5, 662, Wint. Kr. Fl. I, 695.

Deze soort werd door E. Kits v. Waveren uit Haarlem gevonden te Loenen op de Veluwe, waar ze volgens hem algemeen voorkwam.

Door mij (C. C.) is deze soort niet gezien, doch de determinatie is van K. Boedijn.

**Flammula.**

*Fl. muricella* Fr. Monogr. II, p. 302, Hym. Eur. p. 245, Cost. et Duf. no. 928, Sacc. Syll. V, 811.

Deze door den Heer E. K. v. Waveren gedetermineerde soort werd door hem in 't voorjaar 1923 gevonden op 't Huijs te Warmond en in het Vogelenzangsche duin.

In geconserveerden toestand werden mij van beide plaatsen ex. gegeven.

**Cortinarius.**

*C. (Dermocybe) sanguineus* (Wulff.) Fr. Epicr. p. 288, Hym. Eur. p. 370, *Agaricus* Wulff. in Jacq. coll. 2, t. 15, f. 2, Sacc. Syll. V, 940, Wint. Kr. Fl. I, 595.

Deze soort werd op de Consuls-Exc. te Winterswijk gevonden door den Heer P. J. Hoogland in gemengd bosch, den 29sten Oct. 1923.

Er werden 2 ex. gevonden, een is er slechts geconserveerd kunnen worden, daar de vinder de andere iets te hard aanpakte, waarbij van den paddenstoel niets overbleef, dan een velletje, terwijl een vocht van kleur gelijk aan de vermiljoen roode kleur van hoed en steel er uitvloeide. Zij is voor de Flora afgebeeld.

**Paxillus.**

*P. (Inocybe) Tricholoma* A. et S. p. 188 *Agar.* Fr. S. M. I. p. 270, Hym. Eur. p. 236, Cooke 404, Sacc. Syll. V, 790, Wint. Kr. Fl. I, 688.

Deze zeer interessante soort werd mij den 22sten Nov. 1923 toegezonden in één ex. door den Heer J. Schreinemakers te Bergen-op-Zoom, die haar daar in een bosch onder Douglassparren plukte.

Waar de zwam zeer nauwkeurig voor de Flora is afgebeeld, is nadere beschrijving overbodig.

**Melanosporeae.**

**Panaeolus.**

*P. guttulatus* Bres. Fungi Trid. p. 36, t. XXXIV, f. 2, Ricken, No. 798, Sacc. Syll. V, 1120.

Op de Consuls-Exc. te Winterswijk 27—29 Oct. 1923, vond P. J. Hoogland op mest een zwart-groene *Panaeolus* met een hoedje van kegelklokvormige gedaante.

Deze soort was door mij nog nooit gezien en heb ik haar als dusdanig gedetermineerd. Jammer genoeg was zij

bij terugkomst in Leiden niet mooi genoeg meer voor afbeelding en kon zij slechts geconserveerd worden.

#### Polyporaceae.

##### Polyporus.

*P. fragilis* Fr. Elench. p. 86, Hym. Eur. p. 546, Sacc. Syll. 6, III, Wint. Kr. Fl. I, 334.

Deze soort werd door E. Kits v. Waveren op twee plaatsen in ons land gevonden; den 29sten Aug. in 't Loenerbosch op de Veluwe, en 10 Sept. in het Vogelenzangsche bosch, bij Haarlem. Beide keeren op Coniferenhout.

Zij is door een fraaie teekening voor de Flora vastgelegd.

##### Poria.

*P. (Phellinus) undata* (Pers.) Bres. F. Pol. in Ann. Myc. 1903, p. 78, Pers. Myc. Eur. 11 p. 90, t. 16, f. 3, Sacc. Syll. V, XVII, 131.

Deze door Dr. Patouillard gedetermineerde soort werd door den Heer P. J. Hoogland in Oct. 1923 te Meijndel, Wassenaar gevonden.

#### Hydnaceae.

##### Irpex.

*I. spatulatus* (Schrad.) Fr. Elench. p. 146, c. syn., Hym. Eur. p. 622. Schrad. Spic. t. 4. f. 1. (dentibus confertis recedit) Sacc. Syll. 6, 490, Wint. Kr. F. I. 365.

Deze soort werd den 29sten December 1921 gevonden op hout groeiende bij 't Huijs te Warmond, door C. Cool en G. D. Swan. de Veye. De determinatie geschiedde door Dr. Patouillard te Parijs.

##### Odontia.

*Odontia Brinkmanni* Bres. F. Polon. in Ann. Myc. 1903, p. 88, Sacc. Syll. XVII, 157.

Deze door Dr. Patouillard gedetermineerde soort werd door den Heer P. J. Hoogland in Oct. 1922 gevonden in de duinen van Meijndel bij Wassenaar.

#### Clavariaceae.

##### Pistillaria.

*P. (Typhula) muscicola* (Pers.) Fr. Epicr. p. 595, Hym.

Eur. p. 684, *Clavaria* Pers. Obs. 2, t. 3, f. 2, Sacc. Syll. VI, 746, Winr. Kr. Fl. I, 300.

Deze soort groeide op het dak van het huis van Mej. Adri Timmermans, Biol. Stud., Breestraat te Leiden. In de literatuur vinden we haar vermeld: groeiende op *Hypnum triquetum*, doch deze ex. parasiteerden? op het mos: *Syntrichium ruraliformis*.

Zij is voor de Flora afgebeeld.

CATH. COOL.

*Leiden, 's-Rijksherbarium.*