

*Bijlage 3.***MOSSEN OM NEUZEN.**

Indien het al of niet slagen van een ekskursie voor ondergetekende alleen werd bepaald door de verzamelde mossen, zou deze ekskursie de minst geslaagde zijn, door hem ooit meegeemaakt. Waren de verwachtingen al niet hoog gespannen, de *Prodromus* stelde toch enkele aardige vondsten in zicht door de vermelding voor dit gebied van mossen uit moerassen, bossen en heiden. Helaas bleken deze terreinen tot het verleden te behoren, en een nauwkeurig onderzoek van wat er mogelijk nog kon zijn overgebleven te St. Andries en de Drie Hoefijzers, werd ons onmogelijk gemaakt door een geweldige stortregen. Mijn mede-bryologen deden dezelfde ervaringen op; en VAN DER WIJK vatte zijn resultaten samen in de woorden: „Schrijf maar een stuk of wat van de algemeenste mossen op, dan ben je er niet ver van af”.

Bij Neuzen zagen wij: *Barbula convoluta*, *Brachythecium albicans*, *rutabulum*, *salebrosum*, *Bryum capillare*, *Ceratodon purpureus*, *Drepanocladus aduncus pseudofluitans*, *Eurhynchium Stokesii*, *Fissidens taxifolius*, *Homalothecium sericeum*, *Mnium affine* en *Tortula muralis*.

St. Andries en de Drie Hoefijzers leverden op: *Ceratodon purpureus*, *Eurhynchium Stokesii*, *Homalothecium sericeum*, *Hypnum cupressiforme elatum*, *Mnium affine*, *Polytrichum juniperinum*, *Pseudoscleropodium purum*, *Rhytidiadelphus squarrosus*, *Tortula ruralis arenicola* en *subulata*.

In de buurt van Mauritsfort namen wij waar: *Brachythecium albicans* en *rutabulum*, *Frullania dilatata*, *Hypnum cupressiforme*, *Orthotrichum diaphanum*, *Tortula laevipila* en *muralis*, terwijl wij van Philippine nog *Calliergonella cuspidata* kregen.

W. H. WACHTER.