

*Bijlage B.*

**Lijst der waargenomen mossen en levermossen.**

Op een paar zeer algemene soorten na berusten ex. van de hieronder genoemde mossen in ons herbarium. Vergelijking met de opgaven in het „Kottenboek” was niet mogelijk door de aldaar gebruikte Hollandse namen. Vergelijking met de opgaven van de excursie 1925 leert ook niets, daar dit het eerste jaar was, dat ik mossen verzamelde, die toen terloops werden meegenomen naast de Hogere Planten; bovendien kon nu een veel groter gebied worden afgezocht in verband met het toenemend aantal biologen, die een auto tot hun beschikking hebben; verder bezochten we nu een veel kleiner gedeelte van het Korenburgerveen. Alle opgaven hebben betrekking op het stafkaartblad P7, welke aanduiding dus is weggelaten.

*Alicularia geoscyphus* c.fr. 35 22; *Amblystegium serpens* 35 22; *Anthoceros levis* (leg. v. d. WIJK in het „Woold”).

*Blasia pusilla* 35 22; *Brachythecium glareosum* 26 43, 27 31; *Br. rutabulum* 35 24, 43; *Br. salebrosum* 35 22; *Breidleria arcuata* 35 22 (1925, det. Loeske); *Bryum argenteum* 35 22.

*Calliergon stramineum* 35 41; *Calliergonella cuspidata* 27 31; *Calypogeia Trichomanis* 35 22, 41; *Catharinaea undulata* 26 44, 35 44; *Cephalozia bicuspidata* 35 22, 41; *Ceratodon purpureus* 26 44, 27 13; *Conocephalus conicus* 17 32, 27 31, 35 22, 37 12.

*Dicranella heteromalla* 17 32, 26 44, 27 31, 35 41; *Dicranoweisia cirrata* 35 22; *Dicranum scoparium* 35 44; *Diplophyllum albicans* 34 44, 35 24; *Drepanocladus aduncus* 27 31 (ook pseudofluitans); *Dr. exannulatus* 34 43; *Dr. lycopodioides* 27 31; *Dr. Sendtneri* 25 12; *Dr. vernicosus* 27 31.

*Eurhynchium Stokesii* 26 44, 27 31, 35 44.

*Fissidens taxifolius* 27 31; *Fontinalis antipyretica* 27 31; *Funaria hygrometrica* 27 31, 35 41.

*Georgia pellucida* 26 44; *Grimmia pulvinata* 35 43; *Gymnocola inflata* 25 12, 35 22.

*Haplozia crenulata* 25 12; *Hypnum cupressiforme* 27 31, 35 41; var. *ericetorum* 34 44.

*Isopterygium elegans* 26 43, 35 41, 43.

*Leptodictyum riparium* 25 12, 27 31; *Leucobryum glaucum* 35 43;

*Lophocolea bidentata* 35 22; *L. heterophylla* 25 12, 35 22 (ook met broedkorrels).

*Marchantia polymorpha* 27 13; var. *aquatica* 26 44; *Mniobryum albicans* 27 31; *Mnium affine* 35 22; *M. cuspidatum* 27 31; *M. hornum* 26 44, 34 44, 35 41; *M. rostratum* 26 44; *M. undulatum* 27 31, 37 12.

*Pellia epiphylla* 17 32, 26 44; *Plagiothecium curvifolium* 35 22; *P. silvaticum* var. *neglectum* 35 22; *Pleurozium Schreberi* 34 44, 35 43, 37 12; *Pogonatum aloides* 26 44, 27 31, 35 43 (hier één ex. als afgebeeld in N.K.A. 49 p. 47); *Polytrichum attenuatum* 37 12; *P. commune* 35 44, 37 12; *P. piliferum* 27 31; *Pseudoscleropodium purum* 26 44, 34 44, 35 41, 44.

*Rhynchostegium megapolitanum* 27 31; *Rhytidiadelphus squarrosus* 34 44, 35 44; *Ricciella fluitans* 25 21.

*Scorpidium scorpioides* 37 31 (leg. SLOFF); *Sphagnum auriculatum* 35 41, 37 31 (leg. SLOFF); *S. compactum* 27 31; *S. cuspidatum* 34 43; *S. fimbriatum* 37 12; *S. inundatum* 34 43; *S. palustre* 25 12, 27 31; *S. recurvum* 35 41, var. *amblyphyllum* 25 12, var. *mucronatum* (leg. SISSINGH); *S. subsecundum* 35 41.

*Thuidium tamariscinum* 27 31; *Tortula muralis* 35 22, 24, 43.

*Ulota ulophylla* 35 22 (op dezelfde boom als in 1925).

Dit is de eerste maal, dat de naam ***Plagiothecium curvifolium*** Schlieph. in de Ned. literatuur vermeld wordt. Of de plant een nieuwe indigeen is, kunnen we pas beoordelen na onderzoek van de *Plagiothecia* in het Herb. N.B.V. Ze verschilt van *P. denticulatum* vooral door de smallere cellen en de tegen de grond aan gedrukte takken met naar beneden gekromde blaadjes. Misschien is het beter, de plant *P. denticulatum* var. *recurvum* Warnst. te noemen.

Zeer veel moeite gaf de *Hypnum cupressiforme* var. *ericetorum*. De paraphylliën, die anders de gedaante van twee smalle blaadjes hebben, waren hier zeer sterk ingesneden, soms nog meer dan bij *Heterophyllum*. Dr F. KOPPE determineerde de plant, maar voegde erbij: „abweichend”.

W. H. W.