

*Bijlage C.***MOSSEN OM OIRSCHOT.**

Alicularia scalaris B; *Amblystegium serpens* B, S; *Aulacomnium androgynum* B.
Brachythecium rutabulum B, *salebrosum* B, 32, 24; *Bryum argenteum* 32, 24, *caespiticiu*m 32, 24.
Cephaloziella Hampeana B; *Ceratodon purpureus* E, S, 32, 24, 41, 41.
Dicranella cerviculata B, *heteromalla* 32, 24; *Dicranum scoparium*

- 32, 24; *Diplophyllum albicans* B, 32, 24; *Ditrichum homomallum* B; *Drepanocladus fluitans* 42, 41.
Eurhynchium Stokesii B.
Fossombronia spec. (steriel) B, 32, 31; *Funaria hygrometrica* E, 23, 23, 32, 11.
Grimmia pulvinata 32, 24; *Gymnocolea inflata*.
Haplozia crenulata B, id. fm. *gracillima* E; *Homalothecium sericeum* 32, 24; *Hypnum cupressiforme* B, S, 32, 24.
Isopterygium elegans H.
Lepidozia reptans B; *Leucobryum glaucum* B, 13, 24, 23, 23, 32, 31, 32; *Lophocolea heterophylla* B, 32, 24; *Lophozia excisa* H.
Marchantia polymorpha 22, 34, 32, 41; *Mnium hornum* B, *rostratum* B.
Orthotrichum affine S, *diaphanum* 32, 24.
Pellia epiphylla B, *Fabbroniana* B.; *Pleurozium Schreberi* B. H;
Pogonatum aloides B; *Polytrichum commune* 32, 24, *juniperinum* 41, 41, *piliferum* 32, 24, 41, 43; *Pseudoscleropodium purum* 32, 24; *Ptilidium ciliare* B, 41, 43.
Riccia glauca B; *Ricciella duplex* ???, *fluitans* B, 22, 34; *Rhytidadelphus squarrosus* B.
Sphagnum auriculatum E, *compactum* B, *cuspidatum* 42, 41, *fimbriatum* 23, 31, *molle* B, 42, 41, *palustre* B, 32, 14, *plumulosum* B, *subsecundum* B.
Tortula muralis 32, 24.
Webera nutans B.

De opgaven hebben betrekking op stafkaartblad R 5. Verder betekent B: „de Baast”, E: de „Heilige Eik”, H: de „Oirschotse Hei” en S: „Spoordonk”.

Voor het eerst wordt hier in de Ned. literatuur vermeld *Haplozia crenulata* fm. *gracillima* (Sm.) Heeg., kenbaar aan het zeer groot aantal jonge stengels met zeer kleine bladen zonder de anders zo kenmerkende grote cellen aan de bladrand, waardoor men meent, met een *Cephaloziella spec.* te doen te hebben. Twijfelachtig blijft *Riccia* (*Ricciella*) *duplex* Lorbeer. In de tweede druk van KARL MUELLER: *Die Lebermoose*, afl. 2 (1940) wordt een begin gemaakt met het genus *Riccia*, dat geheel is omgewerkt, welke omwerking helaas onbruikbaar is voor gewone botanici, omdat (en dat niet alleen bij *Riccia*) gebruik gemaakt wordt van kenmerken, ontleend aan de chromosomen. *R. fluitans* heeft er 8, *R. duplex* 16, wat natuurlijk bij gedroogd materiaal niet meer is na te gaan. Verder zijn de uiteinden der takken bij *fluitans* iets verbreed, bij *duplex* niet; hebben de ventrale schubben bij *duplex* een aanhangsel en zijn de velden aan de thallusbovenzijde minder duidelijk.

Een eigenaardige alg stuurde ik op aan Mej. Dr Jos. KOSTER, die haar determineerde als: *Cladophora fracta* (Dillw.) Kütz.; onvertakte vorm; draden 140—200 μ dik. De vindplaats was: Oirschot, in een sloot vlak bij de brug (bij het klooster) over het kanaal; 18 Aug. 1941.

W.