

BRYOLOGIESE NOTITIES X

door

P. JANSEN en W. H. WACHTER.

Opgave, waar Nederlandse mossen in de Nederlandse literatuur zijn genoemd.

In onderstaande lijst kan men nagaan, waar een Nederlands mos is vermeld, en daar de opgaven in chronologische volgorde zijn gerangschikt, blijkt tevens, wie een mos voor ons land heeft ontdekt. Bovendien zijn alle synoniemen opgenomen, waaronder de mossen vermeld zijn, niet echter die, welke slechts achter een andere naam als synoniem geplaatst staan, gelijk b.v. in de tweede editie van de *Prodromus* het geval is, waarin men tientallen namen vindt, die men nergens anders in de Ned. literatuur aantreft.

Met nadruk zij er op gewezen, dat men zo mogelijk de mossen uit het herbarium der Ned. Bot. Ver. en andere herbaria dient te kontroleren, alvorens uit een of andere opgave een konklusie te trekken: helaas is niet altijd melding gemaakt van fouten, die men bij het revideren van materiaal vond, dat in de *Prodromus* genoemd wordt. Dit moest niet voorkomen, daar de *Prodromus* tot heden nog altijd de belangrijkste bron is voor de kennis van de verspreiding der Ned. mossen en als zodanig nog steeds gebruikt wordt.

HEPATICAE.

Alicularia geoscyphus De Not. (*A. minor* Limpricht) — P I n. 1651 (als *A. scalaris minor* Nees); Garj. H; Garj. L; Garj. V; Un 39. *Alicularia minor* Limpr. = *A. geoscyphus* De Not.

Alicularia scalaris (Schräd.) Corda (*Jungermannia scalaris* Nees) — Ut n. 120; Cat I; P I n. 1651 (als varr. *major* Nees en *compressa* Rabenh.); NKA V p. 76; NKA V, 2, p. 292; Ov II; Nijm II n. 1050 (als *major* Nees); P II n. 3; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Un 36; Un 38; BN VIII; BN IX; Un 41.

Aneura latifrons Lindb. = *Riccardia latifrons* (Lindbg.) Lindbg.

Aneura multifida Dum. (of L.) = *Riccardia multifida* (L.) Gray

Aneura palmata Nees = *Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth.

Aneura pinguis Dum. = *Riccardia pinguis* (L.) Gray

- Aneura pinnatifida* Nees = *Riccardia sinuata* (Dicks.) Trev.
Aneura sinuata (Dicks.) Dum. = *Riccardia sinuata* (Dicks.) Trev.
Anthoceros crispulus (Mont.) Douin (*Anth. multifidus* Lindb.)
 — Ov II; P II n. 66.
Anthoceros levis L. — Comm p. 66; Linn. (h. Cliff.) p. 477;
 Gort Belg n. 893; Loos n. 254; G VII n. 942; FBS n. 206; Cat I;
 Lac. H; P I n. 1594; Bu; NKA VI p. 197; Hov II; Ov II; P II n.
 67; Garj. L; Fr; Un 39; NKA L p. 218, 233, 249, 250; BN VIII; Pl.
Anthoceros multifidus Lindb. = *Anth. crispulus* (Mont.) Douin
Anthoceros punctatus L. — Ehrh.; Geuns n. 96; FBS n. 207;
 Lac. H (zegt daar, dat deze soort in ons land nog ontbreekt);
 P I n. 1595; Lac. L; Bu; NKA VI p. 311; Ov II; P II n. 65;
 Garj. H; Garj. L; NKA L p. 218; BN VIII.
Badula in Delf. (tweemaal) is een fout voor *Radula*.
Bazzania trilobata (L.) Gray (*Jungermannia trilobata* L.; *Mastigobryum trilobatum* Nees) — Geuns n. 88; FBS n. 179; Cat II;
 P I n. 1616; Ov II; Nijm II n. 1066; P II n. 41; Garj. H; Garj. L.
Blasia pusilla L. (*Jungermannia Blasia* Hook.) — Geuns n. 92;
 FBS n. 201; Ut n. 119; Cat I; Lac. H; P I n. 1605 (als α Hookeri
 Nees en β Funckii Nees); Trap; E; Ov. II; Nijm II n. 1073
 (als Funckii); P II n. 53; Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; Fr;
 Un 33; Un 34; Un 36; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; Na.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. (*Jungermannia trichophylla* L.) — Ov II; P II n. 32; Garj. H; Garj. L.
Blyttia Lyellii Endl. = *Pallavicinia Lyellii* (Hook.) Gray
Calypogeia arguta Mont. et Nees — NHG XV p. 137; Garj.
 V; V.B.
Calypogeia fissa (L.) Raddi = *Cal. Trichomanis* ssp. *fissa* (L.).
Calypogeia Neesiana (Mass. et Carr.) C. Müll. — V.B; Garj. V2.
Calypogeia sphagnicola (Arn. et Perss.) Warnst. et Loeske —
 V.B; Un 34; Bar.
Calypogeia suecica (Arn. et Perss.) C. Müll. — V.B vestigt de aandacht op deze nog niet inlands vermelde soort.
Calypogeia Trichomanis (L.) Corda (*Jungermannia Trichomanis* Hook.; ook Dicks.) — G VII n. 876; FBS n. 185; Dz L II;
 Ut n. 109; En IV; Cat I; Nijm I n. 905; P I n. 1618; Lac. L;
 Bu; E; Ov II; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1064; P II n. 39;
 Garj. H; Garj. L; Nat; V.S; Garj. V; V.B; Un 28; S; Un 32;
 Fr; Un 33; BN II; Acht; Un 36; Blok; Un 39; BN VIII; Bar;
 Na; MM; Gr.
 var. *adscendens* Nees — P I n. 1618; Lac. Am.
 var. *attenuata* Nees — P I n. 1618; NKA IV p. 244; Lac. Am.
 var. *communis* Nees — P I n. 1618; Nijm II n. 1064.

- fm. *compacta* Meyl. — V.B.
 ssp. *fissa* (L.) (*Calypogeia fissata* (L.) Raddi; *Mnium fissum* L.)
 Garj. V; V.B.
 fm. *luxurians* C. Müll. — V.S; V.B.
 fm. *repanda* Nees — P I n. 1618.
 fm. *Sprengelii* Nees — P I n. 1618; Nijm II n. 1064.
 var. *subimmersa* Schffn. — V.S; V.B.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. (*Jungermannia bicuspidata* L.)
 — Ehrh.; Geuns n. 83; FBS n. 190; Dz L II; Ut n. 112; En IV;
 Cat I; P I n. 1627; NKA III p. 176; NKA IV p. 238, p. 243;
 Lac. Am; Lac. L; E; Ov II; Nijm II n. 1060; P II n. 29; Garj.
 H; Garj. L; V.S; Garj. V; Un 27; W; S; Un 32; Un 33; Un 34;
 Acht; Un 36; Blok; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Na; MM; Gr.
 var. *conferta* Nees — P I n. 1627; Nijm II n. 1060.
 fm. *gemmafera* — V. S; Garj. V; V.B.
 var. *Lammersiana* — Bar.
 var. *rigidula* Nees — P I n. 1627.
 var. *uliginosa* Nees — P I n. 1627.
 var. *vulgaris* Nees — P I n. 1627; NKA IV p. 243; Lac. Am;
 Nijm II n. 1060.
Cephalozia connivens (Dicks.) Spruce (*Jungermannia connivens*
 Dicks.) — FBS n. 192; Cat I; P I n. 1626; Lac. Am; Ov II;
 P II n. 30; Garj. H; Garj. L; V.S; Garj. V; S; Bar; Gr.
 var. *conferta* Nees — P I n. 1626; Lac. Am.
 var. *laxa* Nees — Cat I; P I n. 1626.
 var. *sphagnorum* Nees — Cat I.
 var. *conferta* Nees is volgens C. Müller: *Ceph. media* var. *conferta*;
 maar of dit voor de exx. uit de Prod. geldt?
Cephalozia Francisci (Hook.) Dum. (*Jungermannia Francisci*
 Hook.) — En IV; P I n. 1630; Ov II; P II n. 27; Garj. H; Garj. L;
 Garj. V2.
Cephalozia macrostachya Kaalaas — V.L.
Cephalozia media Lindb. — V.S; V.B.
Cephaloziella divaricata (Franc.) Schffn. = *Ceph. Starkei* (Funck)
 Schffn.
Cephaloziella elachista (Jack) Schffn. — V.S; V.B.
Cephaloziella Hampeana (Nees) Schffn. — N II; BN II; Un 35;
 Un 38; BN VI; Un 41.
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. — BN II.
Cephaloziella Starkei (Funck) Schffn. (*Jungermannia Starckii*
 Hb. Funck; *Jung. divaricata* E. Bot.; *Jung. byssacea* Roth; *Cepha-*
loziella divaricata (Franc.) Schffn.) — Dz L II; Ut n. 113; Cat I;
 Cat II (met de varr. *filiformis* Nees, *globulifera* en *laxa*); P I n.

- 1628 (met varr. filiformis Nees en rubriflora Rabenh.); P I n. 1629 (in de varr. julacea Nees en procerior Nees); NKA IV p. 243; Lac. Am; E; Ov II; Nijm II n. 1059 (als julacea Nees); P II n. 28; Garj. H; Garj. L; Garj. V; K.M; Un 34; Acht; Un 38; BN VI; Bar; MM; Gr.
- Chiloscyphus pallescens** (Ehrh.) Dum. (ook wel Corda of Nees); — Geuns n. 80; Cat II; P I n. 1620; NKA IV p. 244; Lac. Am; Lac. L; Bu; NKA VII p. 95; Ov II; Nijm II n. 1062; P II n. 37; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Na?
- Chiloscyphus polyanthus** (L.) Corda (ook Nees) — Cat II; MDk; P I n. 1619; NKA III p. 174; Ov II; Nijm II n. 1063; P II n. 38; Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; Un 28; Fr; Acht.
var. *fragilis* (Roth) C. Müll. — V.B; Na.
var. *grandis* Buse = var. *fragilis* (Roth) C. Müll.
var. *rivularis* Loeske — BN VIII.
- Cladopus fluitans* (Nees) Meylan. V.B vestigt de aandacht op deze nog niet inlands vermelde soort.
- Conocephalus conicus** (L.) Dum. (*Marchantia conica* L.; *Fegatella conica* Corda) — Boerh p. 17 n. 15 en 17; Gort Belg n. 891; G VII n. 940; FBS n. 203; Lac. H; P I n. 1597; Lac. L; Bu; NKA VI p. 107, 202, 249; Ov II; NKA X p. 531; P II n. 62; Garj. H; Garj. L; Un 25; Nat; Garj. V; Acht; Un 36; BN III; Un 39; Pl.
- Diplophyllum albicans** (L.) Dum. (*Jungermannia albicans* L.; *Jung. varia* L.) — Meese n. 470; Gort Belg n. 887; Zut. n. 514; G VII n. 933; Mul p. 105; FBS n. 170; Ut n. 103; En IV; Cat I; Lac. H; Nijm I n. 897; P I n. 1644; Lac. L; Hov II; Ov II; Nijm II n. 1055; P II n. 9; Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; Un 27; Fr; Un 33; Un 36; Un 39; NKA L p. 233; BN VIII; BN IX; Un 41.
var. *vittata* Nees — P I n. 1644; Nijm II n. 1055.
- Diplophyllum obtusifolium** (Hook.) Dum. (*Jungermannia obtusifolia* Hook.) — FBS n. 174; Cat II; Lac. H; P I n. 1643; Hov. II; Ov II; Nijm II n. 1056; P II n. 10; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Un 38.
- Diplophyllum taxifolium* (Whlbg) Dum. — V.S. Dit zal wel een verschrijving zijn, want V.L geeft haar niet.
- Eucalyx hyalinus** (Lyell) Breidl. (*Jungermannia hyalina* Lyell) — P I n. 1639; Ov II; P II n. 14; Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; Fr.
var. *colorata* Nees — P I n. 1639.
var. *major* Nees — P I n. 1639.
- Eulejeunea cavifolia* = *Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb.
Fegatella conica Corda = *Conocephalus conicus* (L.) Dum.

- Fimbriaria pilosa** (Wahlenbg) Taylor (*Marchantia tenella* L.) — G VII n. 939; FBS n. 205; Lac. H; P I; NKA LI p. 269.
- Fossombronia angulosa** (Dicks.) Raddi — Garj. L. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Fossombronia cristata** Lindb. = Foss. *Wondraczeki* Dum.
- Fossombronia Dumortieri** (Hüb. et Genth) Lindb. — V.L; BN II; Un 34; NKA L p. 218, 223; Pl.
- Fossombronia pusilla** (L.) Dum. (ook Nees) — Cat I; Beek; P I n. 1608; NKA V p. 76; Lac. L; Hol. n. 1608; E; Ov II; P II n. 49; Garj. H; Garj. L; Garj. V; BN II; NKA L p. 223. Voor zover was na te gaan, behoren deze opgaven tot Foss. *Dumortieri* of *F. Wondraczeki*; goed-herkenbare, d.w.z. vrucht-exemplaren, zijn bij ons nog niet gevonden.
- Fossombronia Wondraczeki** (Corda) Dum. (*Foss. cristata* Lindb.) — Beek; Garj. L; Garj. V2; BN II; NKA L p. 218, 233; Pl.
- Frullania dilatata** (L.) Dum. (ook Nees; *Jungermannia dilatata* L.; *Jung. tamariscifolia* Schreb., ook wel Schmid.) — Meese n. 469; Gort Belg n. 885; G VII n. 930; Ehrh; Mul p. 105; FBS n. 176; Dz L I; Ut n. 106; En II; Cat I; Lac. H; Nijm I n. 901; Camp. I n. 592; P I n. 1610; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 531; NKA VI p. 202; NKA VII p. 125; Ov II; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1071; Camp II n. 661; P II n. 47; Add; Garj. H; Garj. L; Garj. V; VZ; V; Un 28; W; Fr; BN II; Un 34; Un 37; Un 38; BN VI; BN VIII; Bar; Gr.
- var. *anomala* Corb. — V.B; BN IV.
- var. *microphylla* Nees — Cat. I; P I n. 1610 β ; Lac. Am; E; Nijm. II n. 1071 β .
- var. *squarrosa* — BN II..
- Frullania Tamarisci** (L.) Dum. (ook Nees; *Jungermannia Tamarisci* L.; *Jubula Tamarisci* Dum.) — GZA n. 657; Gort Belg n. 886; G VII n. 931; Ehrh; FBS n. 177; Ut n. 107; Beek; Cat I; Lac. H; Nijm I n. 902; P I n. 1609; E; Ov II; P II n. 48; Garj. H; Garj. L; Fr; BN II; BN VI; BN VIII; Bar.
- Geocalyx graveolens** (Schräd.) Nees — Garj. H („1901 en 1902”); Garj. L („1899 en later”). Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Gymnocolea inflata** (Huds.) Dum. (*Jungermannia inflata* Huds.) — Cat I; P I n. 1637; NKA V, 2, p. 292; Bu; Hol n. 1637; NKA VI p. 197; Hov. II; Ov II; P II n. 16; Garj. H; Garj. L; V. S; Garj. V; V.B; Un 32; Un 33; Un 34; Un 36; Un 38; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41.
- fm. *compacta* Nees — V.B.
- var. *hercynica* Nees — P I n. 1637.
- var. *laxa* Nees — P I n. 1637; Hov II; V.B.

- fm. natans Schffn. — V. B.
 var. subaggregata Nees — Cat I; P I n. 1637.
Haplozia caespiticia (Lindenbg) Dum. — Garj. A; Garj. V;
 Un 36; Un 38; NKA L p. 233; BN IX.
Haplozia crenulata (Sm.) Dum. (*Jungermannia crenulata* Sm.) —
 FBS n. 182; Ut n. 108; En IV (zie bij *Jungermannia bicuspidata*);
 Cat I; P I n. 1640; Lac. L; Hol n. 1640; Hov II; Ov II; P II n. 13;
 Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; Un 27; S; Un 33; Un 38; Un 39;
 BN IX; Un 41.
 var. gracillima Hook. — K.M; Un 41.
Jubula Tamarisci Dum. = *Frullania Tamarisci* (L.) Dum.
Jungermannia acuta Lindb. (ook *Lindenb.*) = *Lophozia Mülleri*
 (Nees) Dum.
Jungermannia albicans L. = *Diplophyllum albicans* (L.) Dum.
Jungermannia alpestris Schleich. = *Lophozia alpestris* (Schleich.)
 Evans. Foutieve opgave uit Cat II.
Jungermannia anomala Hook. = *Leptoscyphus anomalus* (Hook.)
 Lindb.
Jungermannia arenaria Nees = *Lophozia excisa* (Dicks.) Dum.
Jungermannia asplenioides L. = *Plagiochila asplenioides* (L.) Dum.
Jungermannia attenuata Lindb. (ook *Lindenbg*) = *Lophozia gracilis*
 (Schleich.) Steph.
Jungermannia barbata Schreb. = *Lophozia barbata* (Schmid.) Dum.
Jungermannia barbata var. *attenuata* Mart. = *Lophozia gracilis*
 (Schleich.) Steph.
Jungermannia barbata var. *quinquedentata* = *Lophozia quin-*
quedentata (Huds.) Cogn.
Jungermannia barbata var. *Schreberi* = *Lophozia barbata* (Schmid.)
 Dum.
Jungermannia bicrenata Lindb. (ook *Lindenb.*) = *Lophozia bicre-*
nata (Schmid.) Dum.
Jungermannia bicuspidata L. = *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum.
 In En IV staat op p. 114 tweemaal *J. bicuspidata*; in zijn handex.
 veranderde v. d. BOSCH de eerste opgave in *J. crenulata*, wel
 bedoelend *Haplozia crenulata* (Sm.) Dum.
Jungermannia bidentata L. = *Lophocolea bidentata* (L.) Dum.
Jungermannia Blasia Hook. = *Blasia pusilla* L.
Jungermannia byssacea Roth = *Cephaloziella Starkei* (Funck)
 Schffn. De ex. uit FBS n. 193 zijn volgens P I p. 98 een mengsel
 van verschillende soorten.
Jungermannia ceratophylla Chev. — Fr. (onvindbare soort?).
Jungermannia ciliaris L. = *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe
Jungermannia complanata L. = *Radula complanata* (L.) Dum.

- Jungermannia connivens* Dicks. = *Cephalozia connivens* (Dicks.) Spruce
Jungermannia crenulata Sm. = *Haplozia crenulata* (Sm.) Dum.
Jungermannia curvifolia Hook. in Dz L. II is volgens P I een verkeerde opgave voor *Jung. bicuspidata* var. *conferta*.
Jungermannia denudata Nees = *Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dum.
Jungermannia dilatata L. = *Frullania dilatata* (L.) Dum.
Jungermannia divaricata Engl. bot. = *Cephaloziella Starkei* (Funck) Schffn.
Jungermannia epiphylla L. = *Pellia epiphylla* (L.) Corda
Jungermannia excisa Dicks. (ook Hook.) = *Lophozia excisa* (Dicks.) Dum.
Jungermannia exsecta Schmid. = *Tritomaria exsecta* (Schmid.) Loeske
Jungermannia Francisci Hook. = *Cephalozia Francisci* (Hook.) Dum.
Jungermannia furcata L. = *Metzgeria furcata* (L.) Dum.
Jungermannia globulifera Roth = *Tritomaria exsecta* (Schmid.) Loeske, maar de ex. uit FBS behoren volgens P I deels tot deze soort, deels tot *Lophozia bicrenata* (Schmid.) Dum.
Jungermannia heterophylla Schrad. = *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dum.
Jungermannia hyalina Lyell = *Eucalyx hyalinus* (Lyell) Breidl.
Jungermannia incisa Schrad. = *Lophozia incisa* (Schrad.) Dum.
Jungermannia inflata Huds. = *Gymnocolea inflata* (Huds.) Dum.
Jungermannia inflata var. *laxa* Nees bij Lac. H en Cat I = *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dum.
Jungermannia intermedia Lindb. (ook Lindenb.) = *Lophozia excisa* (Dicks.) Dum.
Jungermannia lanceolata L. = *Lioclaena lanceolata* (Schrad.) Nees. Vermeld bij Ehrh.; dezelfde opgave in FBS n. 181; Lac. H; P I n. 1623; maar deze opgave is nooit bevestigd.
Jungermannia Lyellii Hook. = *Pallavicinia Lyellii* (Hook.) Gray
Jungermannia minuta Crantz = *Sphenolobus minutus* (Crantz) Steph.
Jungermannia montana uit Ut n. 121 is *Jung. montana* Mart. = *Scapania curta* (Mart.) Dum.; het erbij vermelde synoniem *J. umbrosa* Schrad. = *Scapania umbrosa* (Schrad.) Dum.; de ex. vindt men in P I en P II terug als *Scapania curta* (Mart.) Dum.
Jungermannia multifida L. = *Riccardia multifida* (L.) Gray
Jungermannia nemorea = *Scapania nemorosa* (Mich.) Dum.
Jungermannia nemorosa L. = *Scapania nemorosa* (Mich.) Dum.

- Jungermannia obtusifolia* Hook. = *Diplophyllum obtusifolium* (Hook.) Dum.
- Jungermannia pinguis* L. = *Riccardia pinguis* (L.) Gray
- Jungermannia platyphylla* L. = *Madotheca platyphylla* (L.) Dum.
- Jungermannia pulcherrima* Web. Zie bij *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe
- Jungermannia quinquedentata* Web. (ook L.) = *Lophozia quinquedentata* (Huds.) Cogn.
- Jungermannia resupinata* L. = *Sphenolobus saxicolus* (Schrad.) Steph. Deze opgave uit van Geuns n. 87 is onwaarschijnlijk en nooit bevestigd. Herhaald in FBS n. 171. Lac. H noemt deze opgave twijfelachtig; Nijm I n. 898 is vermoedelijk *Scapania compacta*.
- Jungermannia saxicola* Schrad. in P I zie bij *J. resupinata* L.
- Jungermannia scalaris* Nees = *Alicularia scalaris* (Schrad.) Corda
- Jungermannia setacea* Web. = *Lepidozia setacea* (Web.) Mitt.
- Jungermannia Sphagni* Dicks. = *Odontoschisma Sphagni* (Dicks.) Dum.
- Jungermannia Tamarisci* L. = *Frullania Tamarisci* (L.) Dum.
- Jungermannia tamariscifolia* wordt door Ehrh. genoemd. Volgens VERDOORN is *J. tamariscifolia* Schreb. (en volgens DUMORTIER — Sylloge — *J. tamariscifolia* Schmid.) synoniem met *Frullania dilatata*; maar Ehrh. zal wel *Frullania Tamarisci* bedoelen daar hij *Frullania dilatata* ook noemt.
- Jungermannia trichomanes* Hook. = *Calypogeia Trichomanis* (L.) Corda
- Jungermannia Trichomanis* Dicks. = *Calypogeia Trichomanis* (L.) Corda
- Jungermannia trichophylla* L. = *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum.
- Jungermannia trilobata* L. = *Bazzania trilobata* (L.) Gray
- Jungermannia undulata* L. = *Scapania undulata* (L.) Dum.
- Jungermannia varia* L. = *Diplophyllum albicans* (L.) Dum.
- Jungermannia ventricosa* Dicks. = *Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dum.
- Jungermannia viticulosa* L. Volgens de meeste auteurs is dit een synoniem van *Saccogyna viticulosa* (Mich.) Dum.; volgens C. MÜLLER (I p. 826) is *J. viticulosa* L. ten dele *Chiloscyphus pallescens* (Ehrh.) Dum. Hierdoor zou dus de opgave van Van Geuns en FBS n. 184 minder onbegrijpelijk worden. Lac. H en P I noemen deze opgave twijfelachtig.
- Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb. (*Lejeunea serpyllifolia*; *Eulejeunea cavifolia*; ook wel *Lejeunia*) — Garj. H; Garj. L. Bewijsmateriaal ontbreekt.

- Lepidozia reptans** (L.) Dum. (ook Nees) — Cat I; P I n. 1617; NKA III p. 176; Ov II; Nijm II n. 1065; P II n. 40; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Fr; Acht; Un 36; BN VIII; Un 41.
var. *julacea* Rab. — NKA III p. 176.
fm. *tenera* Hüb. — P I n. 1617.
- Lepidozia setacea** (Web.) Mitt. (*Jungermannia setacea* Web.; *Microlepidozia setacea* (Web.)) — En IV; Cat I; P I n. 1625 (als varr. minor Nees, *Schultzii* Hüb. en *sertularioides* Hüb.); Ov II; P II n. 31; Garj. H; Garj. L; V.S; Garj. V.
- Leptoscyphus anomalus** (Hook.) Lindb. (*Jungermannia anomala* Hook.; *Jung. Taylori* Hook. var. *anomala* Nees) — Cat I; P I n. 1641 β ; Ov II; P II n. 12; Garj. H; Garj. L; V.S; Garj. V; Un 33.
- Leptoscyphus Taylori** (Hook.) Mitt. komt voor in P I als n. 1641 J. *Taylori* α *genuina* naast β *anomala*. Beide vormen zouden door VAN DEN BOSCH te Smilde zijn gevonden; maar later wordt van deze α *genuina* nergens meer gewag gemaakt.
- Liochlaena lanceolata** Nees — Zie op *Jung. lanceolata* L.
- Lophocolea bidentata** (L.) Dum. (ook Nees; *Jung. bidentata* L.) — Ehrh.; Geuns n. 82; FBS n. 188; Dz L I; Ut n. 110; En II; Cat I; Cat II; MDk; Nijm I n. 906; Camp I n. 590; P I n. 1622; Trap; NKA III p. 174; NKA IV p. 238 en 244; NKA V p. 76; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1622; E; NKA VII p. 125; Hov II; Ov II; Nijm II n. 1061; Camp II n. 663; P II n. 34; Garj. H; Garj. L; Nat; Un 25; Garj. V; V.D; Un 28; W; Fr; Un 33; BN II; Acht; Un 36; Un 38; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Na; Gr.
fm. *ciliata* Warnst. — BN VIII.
- Lophocolea cuspidata** Limpr. — Garj. A; Garj. V; V.B; V.
fm. *luxurians* Schffn. — V.
- Lophocolea heterophylla** (Schr.) Dum. (ook Nees; *Jung. heterophylla* Schrad.) — FBS n. 189; Dz L I; Ut n. 111; En II; Cat I; P I n. 1621; Lac. Am.; E; NKA VII p. 125; Ov II; P II n. 36; Garj. H; Garj. L; Nat; V.S; Garj. V; V.R (met broedkorrels); V; Un 28; W; S; Un 32; Fr; Un 33 (met broedkorrels); BN II; Un 34; Acht; Un 36; Blok; Un 39 (met broedkorrels); BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; MM; Gr.
fm. *hygrophila* Verd. — V.S; V.B.
fm. *multiformis* Nees — V.S; V.B; V.R; V.
- Lophocolea minor** Nees — Lac. L; Ov II; P II n. 35; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Acht p. 84.
- Lophozia barbata** (Schmid.) Dum. (*Jung. barbata* Schreb.) — Cat I; P I n. 1631; Ov II; P II n. 25; Garj. H; Garj. L; Garj. V; V.B; BN II; Un 38; BN IV; BN VI; BN VIII.

- Lophozia bicrenata** (Schmid.) Dum. (Jung. bicrenata Lindb.; ook Lindenb.) — P I n. 1634; Ov II; P II n. 19; Garj. H; Garj. L; Garj. V; V.D; Fr; BN VI; BN IX.
- Lophozia excisa** (Dicks.) Dum. (Jung. arenaria Nees; J. excisa Dicks., ook Hook.; J. intermedia Lindb., ook Lindenb.; J. intermedia var. major Nees) — FBS n. 187; Dz L II; En IV; Lac. H; P I n. 1633; n. 1635; NKA III p. 487; NKA V p. 76; E; Ov II; P II n. 18, n. 20, n. 21; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Bar; Un 41.
- Lophozia gracilis** (Schleich.) Steph. (Jung. attenuata Lindb., ook Lindenb.; J. barbata var. attenuata Mart.) — Ov II; Nijm II n. 1058; P II n. 24; Garj. H; Garj. L; BN IV.
- Lophozia incisa** (Schr.) Dum. (Jung. incisa Schrad.) — FBS n. 196; Cat I (ook met broedknoppen); P I n. 1632 (ook met broedknoppen); NKA IV p. 244; Lac. Am; Ov II; P II n. 22; Garj. H; Garj. L; Garj. V2.
var. elongata Nees — Lac. Am.
- Lophozia Kunzea** (Hüb.) Evans — leg. Jansen et Wachter 12.8.1928 te Loenen op de Veluwe.
- Lophozia lycopodioides** (Wallr.) Cogn. — NKA XXXV p. 92; Un 38; BN IV; BN VI.
var. parvifolia Schffn. — V.B; BN IV.
- Lophozia marchica** (Nees) Steph. — Garj. A. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Lophozia Mildeana** (Gottsche) Schffn. — BN IV.
- Lophozia Mülleri** (Nees) Dum. (Jung. acuta Lindb.; ook Lindenb.) — P I n. 1638; Lac. L; Ov II; P II n. 15; Garj. H; Garj. L; Fr.
- Lophozia quinquedentata** (Huds.) Cogn. (Jung. quinquedentata L., ook Web.; J. barbata var. quinquedentata) — Ehrh.; Geuns n. 84; FBS n. 195; Dz L I; P I n. 1631; E; Ov II; P II n. 26; Garj. H; Garj. L; BN IV. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Lophozia ventricosa** (Dicks.) Dum. (Jung. ventricosa Dicks.) — FBS n. 191; Cat I; Lac. H; P I n. 1636 (ook met broedknoppen); NKA III p. 176; NKA IV p. 244; Hov II; Ov II; Nijm II n. 1057 (ook met broedknoppen); P II n. 17; Garj. H; Garj. L; V.S; Garj. V; Un 38; BN IV; BN VI; Bar?; BN IX.
var. attenuata — NKA IV p. 244; Lac. Am.
var. conferta Nees — P I n. 1636; Nijm II n. 1057; V.D.
var. laxa Nees — P I n. 1636; NKA IV p. 244; Lac. Am; Hov II.
- Lunularia vulgaris** Mich. (Marchantia cruciata L.) — Boerh p. 17 n. 16; Gort Belg n. 890; G VII n. 938; Geuns n. 91 (naar Linn. Hort. Cliff. p. 477); FBS n. 204; Lac. H; P I n. 1600; NKA III p. 292; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 311; Ov II; NKA IX p. 158; P II n. 59; Garj. H; Garj. L; Fr; BN VIII; Bar; Gr.

- Madotheca Baueri** Schffn. — Brs.
Madotheca levigata (Schrad.) Dum. — P I n. 1612; Ov II; P II n. 46; Garj. H; Garj. L; Brs; Fr.
Madotheca platyphylla (L.) Dum. (Jung. platyphylla L.) — Geer n. 99; FBS n. 178; En III; DMb III; Cat I; MDk; Nijm I n. 903; P I n. 1611; Lac. L; E; Ov II; Nijm II n. 1070; P II n. 45; Add; Garj. H; Garj. L; V.Z; V; Brs; Un 32; Fr; BN II; BN VIII; Bar.
 var. *communis* Nees — P I n. 1611 (fm. *convexula*); Lac. Am.
 var. *subsquarrosa* — Brs.
Marchantia conica L. = *Conocephalus conicus* (L.) Dum.
Marchantia cruciata L. = *Lunularia vulgaris* Mich.
Marchantia polymorpha L. — Comm p. 66; Boerh p. 17 n. 11, 12 en 13; GZ n. 579, 580; Meese n. 471 (ook *March. stellata*); Gort Belg n. 889; Zut. n. 515; G VII n. 937; Mul p. 105; FBS n. 202; Dz L I; Ut n. 122; En II; Cat I; Lac. H; MDk; Hov I; Nijm I n. 909; Camp I n. 594; P I n. 1599; Trap; NKA IV p. 238; Lac. L; Delf n. 529; NKA VI p. 197; E; NKA VII p. 95; Hov II; Ov II; NKA X p. 531; Camp II n. 658; P II n. 60; Add; Garj. H; Garj. L; Nat; Garj. V; V.Z; Un 28; W; S; Un 32; Fr; Un 34; NKA XLVI p. 201; Un 36; Un 38; Un 39; NKA L p. 259, 260; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; Gr.
 fm. *aquatica* Nees — P I n. 1599a; Hol n. 1599a; Un 39.
 fm. *domestica* — Lac. H; P I n. 1599y; Lac. Am; Nijm II n. 1075.
 fm. *riparia* — P I n. 1599β; Lac. Am.
Marchantia tenella L. = *Fimbriaria pilosa* (Wahlb.) Tayl.
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. (*Sarcoscyphus* Ehrharti Corda) — Cat I; P I n. 1653; Hov II; Ov II; Nijm II n. 1049; P II n. 1; Garj. H; Garj. L; Garj. V2; Acht; BN VIII; BN IX.
Marsupella Funckii (Web. et Mohr) Dum. (*Sarcoscyphus* Funckii Nees) — Cat I; P I n. 1652 (als minor Nees); Ov II; P II n. 2; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Acht; BN VIII.
Mastigobryum trilobatum Nees (ook *α grande* Nees) = *Bazzania trilobata* (L.) Gray
Metzgeria conjugata Lindb. — V.B.
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) Evans (*Metz. violacea*) — Cat I; V.B; V.R; BN IX.
Metzgeria furcata (L.) Dum. (ook Nees; Jung. *furcata* L.) — G VII n. 935; Ehrh.; FBS n. 197; Dz L I; Ut n. 115; En II; Cat I; MDk; Camp I n. 593; P I n. 1601; Trap; Delf n. 530; NKA VI p. 202; E; NKA VII p. 125; Ov II; P II n. 58; Garj. H; Garj. L; Garj. V; V.B; V; Un 28; Un 32; BN II; BN VIII; Bar.

- var. *minor* Gottsche — P I n. 1601a; Lac. Am; Nijm II n. 1074;
Camp II n. 659.
- var. *gemmaefera* Nees — P I n. 1601β; E.
fm. *ulvula* Nees — V.B; BN VIII.
- Microlepidozia setacea* (Web.) = *Lepidozia setacea* (Web.) Mitt.
Mnium fissum L. is ten dele *Calypogeia fissia* (L.) Raddi; maar
G VII n. 876 zal wel zeker *Calyp. Trichomanis* bedoelen.
- Mnium Jungermannia* L.; zie op *Pleurozia purpurea* (Scop.) Lindb.
- Moerckia Flotowiana* (Nees) Schffn. — BN VIII.
- Odontoschisma denudatum*** (Mart.) Dum. (*Jung. denudata* Nees;
Sphagnoecetis communis Nees var. *macrior* Nees) — FBS n. 183;
Lac. H; P I n. 1624; P II n. 33.
- Odontoschisma Sphagni*** (Dicks.) Dum. (*Jung. Sphagni* Dicks.;
Sphagnocoetis communis Nees) — FBS n. 186; Dz L I; En IV;
Cat I; NKA IV p. 243; Bu; Ov II; P II n. 33; Garj. H; Garj. L;
V.S; Garj. V; Fr; BN IX; Pl.
var. *vegetior* Nees — Cat I (ook *fusca*); P I n. 1624; NKA IV
p. 243; Lac. Am.
- Pallavicinia Lyellii*** (Hook.) Gray (*Jung. Lyellii* Hook.; *Blyttia*
Lyellii var. *Flotowiana* Rabenh.) — Dz L II; P I n. 1607; NKA
III p. 487; NKA IV p. 244; Lac. Am; Ov II; P II n. 50; Garj. H;
Garj. L; V.S; Garj. V; Bar; MM; Gr.
- Pellia calycina* Nees = *Pellia Fabbrioniana* Raddi
- Pellia epiphylla*** (L.) Corda (ook Nees of (Dill.) Gottsche; *Jung.*
epiphylla L.) — Comm p. 66; Boerh p. 17 n. 14; GZA n. 658;
Gort Belg n. 888; G VII n. 934; Mul p. 105; FBS n. 198; Dz L I;
Ut n. 116; En II; Cat I; Nijm I n. 907; P I n. 1066; NKA V p. 76;
Lac. L; Hol n. 1066; NKA VI p. 202; E; Ov II; NKA VIII p. 425;
P II n. 51; Garj. H; Garj. L; Un 25; Nat; Garj. V; Un 27; V;
Un 28; Un 32; Fr; Un 33; Un 34; Acht; Un 36; Blok; Un 38;
Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl.
fm. *aeruginosa* Nees — P I n. 1066; Lac. Am.
fm. *fertilis* Nees — P I n. 1066; Lac. Am; Hov. II; Nijm II
n. 1072.
var. *loreä* Nees — Cat I.
fm. *speciosa longifolia* Nees — P I n. 1066.
fm. *undulata* Nees — P I n. 1066; V.S.
- Pellia Fabbrioniana*** Raddi (*Pellia epiphylla* var. *furcigera* Hook.;
Pellia calycina Nees) — Cat I; P I n. 1066 (aantekening); Ov II;
P II n. 52; Garj. H; Garj. L; Garj. V; BN VIII; Bar; Un 41.
- Plagiochila asplenoides*** (L.) Dum. (ook met M. et N. of Nees
et Mtge; *Jung. asplenoides* L.) — GZA n. 656; Gort Belg n. 883;
G VII n. 928; FBS n. 180; Cat II (als *major* Nees); Beek; Nijm I

- n. 904; P I n. 1650 (als major Nees); Lac. L.; Bu; Ov II; Nijm II n. 1051 (als major Nees); P II n. 4; Garj. H; Garj. L; Nat; J.L; Fr; Acht.
- Pleurozia purpurea** (Scop.) Lindb. — Algemeen beschouwt men *Mnium Jungermannia* L. als synoniem van deze soort; niet meer is na te gaan, wat G VII n. 877: „te Leiden op de Stads-muuren Meerburgh” geweest is. Deze plant is een goed voorbeeld, hoe onnauwkeurig tal van synoniemen-opgaven zijn. HOOKER (1814) noemt Jung. cochleariformis **Weis** (1770) en Jung. purpurea **Scop.** (1772); maar MÜLLER citeert Jung. cochleariformis (**Hook.**), evenals MAC VICAR. Een tweede onnauwkeurigheid begaan beide laatsten door bij *Pleurozia cochleariformis* Dum. op te geven: Sylloge p. 38, terwijl *Pleurozia* pas onderscheiden is door DUMORTIER in 1835 (Rec. d’Obs.) en hij in Sylloge (1831) nog schrijft *Radula cochleariformis*. Verder vindt men vaak *Pleurozia purpurea* (Light.) Lindb.; maar LIGHTFOOT gaf zijn naam 5 jaar later dan SCOPOLI.
- Preissia commutata** Nees = **Preissia quadrata** (Scop.) Nees
- Preissia quadrata** (Scop.) Nees (*P. commutata* Nees) — Dz LI; Cat I; Lac. H; P I n. 1598; Lac. L; Bu; E; Ov II; P II n. 61; Garj. H; Garj. L.
- Ptilidium ciliare** (L.) Hampe (ook Nees; Jung. ciliaris L.) — G VII n. 932; Ehrh; Geuns n. 89; FBS n. 169; Ut n. 102; Cat I; Nijm I n. 896; P I n. 1614; Ov II; P II n. 43; Add; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Acht; Un 36; Un 38; BN VI; BN VIII; BN IX; Un 41.
- fm. *ericetorum* Nees — Nijm II n. 1068; V.B.
- fm. *inundata* Schffn. — V.B.
- VAN GEUNS noemt als n. 89 *Jungermannia pulcherrima* en zegt, dat deze niet verward moet worden met Jung. ciliaris L. (en G VII n. 932), welke EHRHART Jung. *Tomentella* noemt. Deze opmerking is ontleend aan EHRHART kolom 276, en zal daar wel steunen op het feit, dat DE GORTER bij n. 932 zet: Dill. t. 73 f. 35, die *Trichocolea* voorstelt (en niet Dill. t. 69 f. 3, welke *Ptilidium* is). Vreemd is het, dat bijna alle auteurs bij *Trichocolea Tomentella* citeren: Ehrhart in Beitr. II — van 1788 — terwijl dit een woordelijke herdruk is van het stuk in Hannoverisches Magazin van 3 Maart 1783.
- Ptilidium pulcherrimum** (Web.) Hampe — NKA LIII (1943).
- Radula complanata** (L.) Dum. (*Jung. complanata* L.) — Meese n. 468; Gort Belg n. 884; G VII n. 929; Ehrh; Mul p. 105; FBS n. 175; Dz L I; Ut n. 105; En II; Cat I; Beek; MDk; Nijm I n. 900; Camp I n. 591; P I n. 1613 (ook met broedknoppen);

- Trap; Lac. Am. (ook met broedkorrels); Delf n. 532 (aldaar Badula); NKA VI p. 202; E; Ov II; Nijm II n. 1069; Camp II n. 662; P II n. 44; Garj. H; Garj. L; Garj. V; V.Z; Fr; BN VIII (ook broedkorrels); Bar; BN IX.
- Reboulia hemisphaerica** (L.) Raddi. — P I n. 1596; NKA VI p. 107; Ov II; P II n. 63; Garj. H; Garj. L; Fr.
- Riccardia latifrons** (Lindb.) Lindb. (*Aneura latifrons* Lindb.) — Ov II; P II n. 56; Garj. H; Garj. L; V. S; Fr.
- Riccardia multifida** (L.) Gray (Jung. *multifida* L.; *Aneura multifida* Dum., ook L.) — FBS n. 200; Dz L I; Dz L II; Ut n. 118; En II; Cat I; P I n. 1603 (als *ambrosioides* Rabenh.); NKA V p. 76; Lac. Am (als *ambrosioides* Nees); Hol n. 1603; E; NKA VII p. 125; Ov II; Camp II n. 660 (als *ambrosioides* Rabenh.); P II n. 55; Garj. H; Garj. L; V.S; Garj. V; Fr; Un 36; BN IX; Gr.
- Riccardia palmata** (Hedw.) Carruth (*Aneura palmata* Nees) — Cat I (als *polyblasta conferta*); P I n. 1602 (als *polyblasta* Rabenh.); Bu; Ov II; P II n. 57; Garj. H; Garj. L.
- Riccardia pinguis** (L.) Gray; (Jung. *pinguis* L.; *Aneura pinguis* Dum.) — Geuns n. 90; FBS n. 199; Ut n. 117; En II; Cat I; Nijm I n. 908; P I n. 1604 (als α *lobulata* Nees met *crassior* Nees en *tenuis* Nees, en als β *denticulata* Nees); Trap; NKA IV p. 244 (en *crassior*); Lac. Am (als *crassior* en *tenuis*); Bu; Hol n. 1604; E; Ov II; P II n. 54; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Acht; Un 40; Bar; Pl.
- var. *denticulata* Nees heet bij C. MÜLLER: fm. *angustior* (Hooker).
- Riccardia sinuata** (Dicks.) Trev. (*Aneura sinuata* (Dicks.) Dum.; *A. pinnatifida* Nees) — NKA III p. 487 (verkeerde opgave); Lac. Am (als var. *viridis*; verkeerde opgave); Bu; Garj. H; V.B.; Garj. V2; Un 34; Blok; BN VIII; Bar.
- Riccia bifurca** Hoffm. — BN VIII.
- Riccia ciliata** Hoffm. — Garj. H; Garj. L. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Riccia crystallina** L. — Ehrh; Geuns n. 93; FBS n. 209; Dz L I; Lac. H; P I n. 1592; Bu; NKA VI p. 239; E; Ov II; Nijm II n. 1077; P II n. 72; Garj. H; Garj. L; Un 29; Fr; BN VIII; Pl.
- Riccia duplex** Lorbeer = *Ricciella duplex* (Lorbeer) J. et W.
- Riccia fluitans** L. = *Ricciella fluitans* (L.) Braun
- Riccia glauca** L. — Ehrh.; Geuns n. 94; FBS n. 208; Dz L I; En II; Cat I; Lac. H; P I n. 1593; Trap; Lac. L; NKA VI p. 197; p. 202; E; Ov II; NKA X p. 531; Nijm II n. 1076; P II n. 69; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Un 32; NKA L p. 218, 247, 249, 259; BN VIII; Un 41; Pl.

- Riccia natans* L. = *Ricciocarpus natans* (L.) Corda
Riccia sorocarpa Bisch. — NKA VI p. 311; Ov II; P II n. 70; Garj. H; Garj. L.
Ricciella duplex (Lorbeer) J. et W. (*Riccia duplex* Lorbeer) — Un 41?
Ricciella fluitans (L.) A. Braun (ook Brown; *Riccia fluitans* L.); — Meese n. 472; Gort Belg n. 892; G VII n. 941; FBS n. 210; Dz L I; Cat I; Beek; Lac. H; Hov I; P I n. 1590; Lac. L; NKA VI p. 197, p. 239; Hov II; Ov II; NKA X p. 531; Nijm II n. 1078; P II n. 73; Add; Garj. H; Garj. L; V.S. (fm. *fluitans* en fm. *terrestris*); Garj. V; Un 32; Un 33; Un 34; Un 36; Un 38; Un 39; BN VIII (fm. *natans* en *terrestris*); Un 40; Bar; Un 41; NKA LII; Na; Pl.
 var. *canaliculata* (Hoffm.) — Dz L I; Cat I; Lac. H; P I n. 1590 β ; Hov II; P II n. 73 var.; Garj. H; Garj. L; Bar.
Ricciocarpus natans (L.) Corda (*Riccia natans* L.) — Geuns n. 95; FBS n. 211; Lac. H; P I n. 1591; NKA V p. 435; Ov II; P II n. 71; Garj. H; Garj. L; V.B.; Fr; Na.
Saccogyna viticulosa (Mich.) Dum. Zie op *Jungermannia viticulosa* L.
Sarcoscyphus Ehrharti Corda = *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dum.
Sarcoscyphus Funckii Nees = *Marsupella Funckii* (Web. et Mohr) Dum.
Scapania compacta (Roth) Dum. (ook Lindb.) — Cat I; P I n. 1649; Hov II; Ov II; Nijm II n. 1052; P II n. 5; Garj. H; Garj. L; Garj. V2; V.D; Brs; Un 38; BN IV; BN VI; BN VIII; BN IX.
Scapania curta (Mart.) Dum. (ook Nees; *Jung. montana* Mart.) — Ut n. 121; Cat I; P I n. 1645; Lac. L; Ov II; Nijm II n. 1054; P II n. 8; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Brs; BN VIII.
Scapania dentata Dum. is volgens C. MÜLLER *Scap. nemorosa* var. *purpurascens* Hook.; maar deze komt bijna uitsluitend op silikaathoudende bodem in de Middelgebergten voor; bijna nooit in het lage land, zodat de opgave in P I n. 1646 wel betrekking zal hebben op var. *Jörgenseni* (Schffn) C. Müller van *S. nemorosa*.
Scapania irrigua (Nees) Dum. (ook Nees) — Cat I; P I n. 1647 (ook met broedknoppen); NKA V p. 76; Bu; Hol n. 1647; NKA VI p. 202; Ov II; P II n. 6; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Brs; W.
Scapania nemorosa (Mich.) Dum. (ook Nees; *Jung. nemorosa* L; *J. nemorea*) — Ehrh.; Geuns n. 86; FBS n. 173; Ut n. 104; Cat I; Nijm I n. 899; P I n. 1646 (als *communis* Nees en *purpurascens* Hook.; zie op *Scap. dentata*); NKA III p. 174; Ov II; Nijm. II

- n. 1053; (als communis Nees); P II n. 7; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Brs; BN VIII.
- Scapania umbrosa* (Schrad.) Dum. Zie op *Jungermannia montana*.
- Scapania undulata* (L.) Dum. (ook Nees et Mtge; Jung. undulata L.) — Vermeld door Ehrh.; deze opgave is nooit bevestigd. De andere opgaven uit FBS n. 172 vindt men in Prod. II terug onder *Scapania compacta*. Ook Cat I en NKA VI p. 311 zijn verkeerd.
- Sphaerocarpus Michelii* Bell. = *Sphaerocarpus terrestris* (Mich.) Sm.
- Sphaerocarpus terrestris*** (Mich.) Sm. (*S. Michelii* Bell.) — NKA VI p. 22, p. 311; Ov II; P II n. 68; Garj. H; Garj. L; Fr. *Sphagnocoetis communis* Nees = *Odontoschisma Sphagni* (Dicks.) Dum.
- Sphagnocoetis communis* var. *macrior* Nees = *Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dum.
- Sphenolobus exsectiformis* = *Tritomaria exsectiformis* (Breidl.) Loeske
- Sphenolobus exsectus* = *Tritomaria exsecta* (Schmid.) Loeske
- Sphenolobus minutus*** (Crantz) Steph. (*Jung. minuta* Crantz) — NKA III p. 487; Bu; P II n. 23; Garj. H; Garj. L.
- Sphenolobus saxicolus* (Schrad.) Steph. Zie op *Jung. resupinata* L.
- Targionia hypophylla*** L. (*T. Michelii*) Corda — Comm p. 66; Gort Belg n. 1037; G VII n. 936; Lac. H; („is waarschijnlijk in Limburg te vinden”); NKA VI p. 22; Ov II; P II n. 64; Garj. H; Garj. L; V.D; Fr.
- Targionia Michelii* Corda = *Targ. hypophylla* L.
- Trichocolea tomentella*** (Ehrh.) Dum. (ook Nees; Jung. *tomentella* Ehrh.) — Geer n. 100; FBS n. 168; Beek; Nijm I n. 895; P I n. 1615; Ov II; Nijm II n. 1067; P II n. 42; Garj. H; Garj. L; Garj. V; Fr. Zie bij *Ptilidium ciliare*, fm. *subsimplex* Nees — P I n. 1615; Nijm II n. 1067.
- Tritomaria exsecta*** (Schmid.) Loeske (*Jung. exsecta* Schmid.; *J. globulifera* Roth; *Sphenolobus exsectus*) — FBS n. 194; Ut n. 114; Cat I; P I n. 1642; NKA VI p. 293; Hov II; Ov II; P II n. 11; Garj. H; Garj. L; V.B; Garj. V2; De meeste opgaven hebben betrekking op *Tritomaria exsectiformis*.
- Tritomaria exsectiformis*** (Breidl.) Loeske (*Sphenolobus exsectiformis*) — Garj. V; V.B; BN IX.
fm. *minor* Schffn. — V.B.
fm. *typica* — V.B.

MUSCI.

Abietinella abietina (Dill., L.) C. Müll. (*Hypnum abietinum* L.; *Thuidium abietinum* B. et Sch.) — Comm p. 77; Boerh p. 20 n. 11; p. 22 n. 52; Gort Belg n. 872; G VII n. 912; FBS n. 56; Dz L I; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 822; Camp I n. 544; P I n. 1339; Trap; Lac. L; E; Ov I; Nijm II n. 976; Camp II n. 610; P II n. 85; V.D; V.Z; V; Fr; Acht; Bar.

Acaulon muticum (Schreb.) C. Müll. (*Phascum muticum* Schreb.; *Sphaerangium muticum* Schpr.) — Geuns n. 64; FBS n. 157; M; P I n. 1588; Ov I; P II n. 303; BN IX.

Acrocladium cuspidatum (L.) Limpr. = *Calliergonella cuspidata* (L.) Loeske

Aloina aloides (Koch) Kindb. (*Barbula aloides* B. et Sch.) — P I n. 1512; Lac. Am; Ov I; P II n. 237.

Aloina ambigua (Br. eu.) Limpr. = *Al. ericaefolia* (Neck.) Kindb.

Aloina ericaefolia (Neck.) Kindb. (*Barbula ambigua* B. et Sch.; *Aloina ambigua* (Br. eu.) Limpr.) — P I n. 1513; Lac. Am; Lac. L; Bu; Ov. I; P II n. 238; Nat.

Aloina stellata (Schreb.) Kindb. (*Barbula rigida* B. et Sch.; ook Schultz) — Cat I; P I n. 1514; Lac. Am; Ov I; P II n. 239; Fr.

Amblyodon dealbatus P.B. — leg. V: de Vries, 1942, Vlieland. (det. W. Margadant).

Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske (*Leskia subtilis* Hedw.; *Hypnum subtile* Hoffm.; *Amblystegium subtile* B. et Sch.) — FBS n. 74 (foutief); M (foutief); P I (foutief); Delf n. 524 (wel verkeerd); Ov I; P II n. 45.

Amblystegium fallax Milde = *Hygroamblystegium irriguum* (Wils.) Loeske var. *spinifolia* Moenk. (volgens Prodr. II). Volgens MOENKEMEYER is het *Cratoneurum filicinum* (L.) Roth var. *fallax* (Brid.) Moenk.

Amblystegium filicinum Lindb. = *Cratoneurum filicinum* (L.) Roth

Amblystegium fluviatile B. et Sch. = *Hygroamblystegium fluviatile* (Sw.) Loeske

Amblystegium hygrophilum Schpr β *limosum* Schpr = *Campylium hygrophilum* Jur.

Amblystegium irriguum Wils. (ook Schpr) = *Hygroamblystegium irriguum* (Wils.) Loeske

Amblystegium Juratzkae Schpr = *Ambl. Juratzkanum* Schpr

Amblystegium Juratzkanum Schpr (*Am. Juratzkae* Schpr) — NKA V p. 379; NKA VI p. 108, p. 310; Ov I; P II n. 43; Un 28; Blok.

Amblystegium Kochii B. et Sch. = *Leptodictyum trichopodium* var. *Kochii* (Br. eu.) Broth.

Amblystegium polygamum B. et Sch. = *Campylium polygamum* (Br. eu.) Bryhn.

Amblystegium radicale B. et Sch. = *Ambl. varium* (Hedw.) Lindb.

Amblystegium riparium B. et Sch. = *Leptodictyum riparium* (L.) Warnst.

Amblystegium serpens (L.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum serpens* L.) — Boerh p. 20 n. 6; Meese n. 466; Gort Belg n. 881; G VII n. 926; Mul p. 105; FBS n. 39; Dz L I; Ut n. 22; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 808; Camp I n. 547; P I n. 1389; Trap; Lac. Am; Lac. L; E; NKA VII p. 124; Ov I; NKA X p. 381; Nijm II n. 958; Camp II n. 590; P II n. 44; Nat; V.D.; V.Z.; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Un 32; Fr; BN II (ook fm); Un 34; Un 36; Blok; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; MM; Gr.

var. *byssoides* Brid. — P I n. 1389δ; ons onbekend.

var. *contextum* Brid. — P I n. 1389β; P II n. 44 var.

var. *radicale* — De ex. uit P I n. 1389 vindt men in P II terug als *Amblystegium Kochii* B. et Sch.; voor de andere ex. zie *Amblystegium varium*.

var. *spinulosum* Hedw. — P I n. 1389γ; P II n. 44 var.

Amblystegium subtile B. et Sch. = *Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. (*Ambl. radicale* B. et Sch.; *Am. serpens* var. *radicale*); — Delf n. 521; NKA VI p. 108; p. 310; Ov I; NKA X p. 381; Camp II n. 591; P II n. 42; Acht.

Anacalypta lanceolata Roehl. = *Pottia lanceolata* (Hedw.) C. Müll.

Anacalypta recurvirostris Bruch, N. et H. = *Didymodon rubellus* (Hoffm.) Br. eu.

Anacalypta Starkeana N. et H. = *Pottia Starkeana* (Hedw.) C. Müll.

Andraea petrophila Ehrh. — N I; BN I; BN VI; Un 38.

Andraea Rothii Web. et Mohr (*A. rupestris* Schpr) — P I n. 1589;

NKA V p. 89; Ov I; P II n. 321; BN I; Un 38; BN VI.

Andraea rupestris Schpr = *Andraea Rothii* Web. et Mohr

Anisothecium crispum (Hedw.) Lindb. (*Dicranum Schreberi*

Hedw.; *Dicranum Schreberianum* Hedw.; *Dicranum majus* Turn.

var. *Schreberi* Sw.; *Dicranella Schreberi* Schpr) — Lac. B;

En III; Cat I; M; P I n. 1536; Lac. L; Bu; NKA V p. 393;

Ov I; P II n. 286.

Anisothecium rubrum (Huds.) Lindb. (*Dicranum varium* Hedw.; *Dicranella varia* Schpr) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat II; M;

- P I n. 1538; Lac. Am; Lac. L; Bu; NKA V p. 394; Ov I; P II n. 284; V.Z; K.F; Acht; BN VIII.
 var. *callistomum* (Dicks.) Br. eu. — P I n. 1538 β ; P II n. 284 var.
- Anisothecium rufescens** (Dicks.) Lindb. (*Dicranum rufescens* Turn.; *Dicranella rufescens* Schpr) — P I n. 1537; NKA V p. 394; Ov I; P II n. 283; Fr; BN VIII.
- Anisothecium vaginale** (Dicks.) Loeske (*Dicranum crispum* Hedw.; *Dicranella crispa* Schpr) — NKA V p. 88; Bu; NKA V p. 396; Ov I; P II n. 287.
- Anomodon attenuatus** (Schreb.) Hübén. (ook Hartm.) — Bu; NKA V p. 421; Ov I; P II n. 88.
- Anomodon curtispendus* H. et T. = *Antitrichia curtispendula* (Hedw.) Brid.
- Anomodon viticulosus** (L.) Hook. et Tayl. (ook B. et Sch.; *Hypnum viticulosum* L.; *Neckera viticulosa* Leyss.) — Boerh p. 20 n. 9 en n. 20; Gort Belg n. 874; G VII n. 915; FBS n. 77; Dz L II; En II; Cat I; M; Nijm I n. 838; Camp I n. 534; P I n. 1404; Trap; Lac. L; NKA VI p. 202; E; Ov I; Camp II n. 611; P II n. 87; Nat; V.Z; Fr; BN VIII; Bar; BN IX.
- Antitrichia curtispendula** (Hedw.) Brid. (*Hypnum curtispendulum* L.; *Neckera curtispendula* W.; *Anomodon curtispendus* H. et T.) — Ehrh; Geuns n. 74; FBS n. 76; Dz L II; Ut n. 48; En II; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1405; NKA III p. 173; Lac. Am; E; Ov I; P II n. 91; Add; BN VIII.
- Archidium alternifolium** (Dicks.) Schpr — NKA VII p. 30; Ov I; P II n. 322.
- Astomum crispum** (Hedw.) Hampe (*Phascum crispum* Hedw.; *Systegium crispum* Schpr) — Ut 99; En II; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1552; Lac. Am; Ov I; P II n. 296.
- Atrichum angustatum* B. et Sch. = *Catharinaea angustata* Brid.
- Atrichum tenellum* B. et Sch. = *Catharinaea tenella* Roehl.
- Atrichum undulatum* P. Beauv. = *Catharinaea undulata* (L.) Web. et Mohr
- Aulacomnion* = *Aulacomnium*.
- Aulacomnium androgynum** (L.) Schwaegr. (*Mnium androgynum* L.; *Bryum androgynum* Hedw.) — G VII n. 868; Ehrh; FBS n. 87; Dz L I; Ut N. 53; En III; Cat I; M; P I n. 1459; Trap; Lac. Am; E; Hov. II; Ov I; Nijm II n. 994; P II n. 121; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 32; Fr; BN II; Acht; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Gr.
- Aulacomnium palustre** (L.) Schwaegr. (*Mnium palustre* L.; *Bryum palustre* Sw.; *Gymnocybe palustris* Fr.) — Ehrh; Geuns n. 69; FBS n. 91; Wtt; Dz L I; Ut n. 55; Beek; Cat I; As; M;

- Nijm I n. 845; P I n. 1458; NKA IV p. 238, 243; Lac. Am; Hol n. 1458; NKA VI p. 197; E; Ov I; Nijm II n. 993; P II n. 120; Add; Un 25; Un 26; V.S; V.D; V.Z; K.F; Un 28; Pol; W; S; Fr; Un 33; Un 34; Nop; Acht; Un 36; Blok; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Na; Pl; Ver. Am; MM; Gr.
 var. polycephalum (Brid.) Br. eu. (ook Schpr) — P I n. 1458; Lac. Am; P II n. 120 var.; BN VIII; Un 40.
 P I noemt zonder nadere vindplaatsen nog de varr. fasciculare (Brid.) Br. eu. en imbricatum Br. eu.; volgens LIMPRICHT varr. uit alpine en subalpine streken.
- Barbula aloides* B. et Sch. = *Aloina aloides* (Koch) Kindb.
Barbula ambigua B. et Sch. = *Aloina ericaefolia* (Neck.) Kindb.
Barbula Brebissoni Brid. = *Dialytrichia mucronata* (Brid.) Limpr.
Barbula cavifolia Schpr = *Pterygoneurum lamellatum* (Lindb.) Jur.
Barbula convoluta Hedw. — G VII n. 871; FBS n. 125; Dz L II; Lac. B; En III; Cat II; M; P I n. 1507; Lac. Am; E; Ov I; NKA VIII p. 424; P II n. 227; V.D; K.F; V; NKA XLVI p. 201; Un 37; Bar.
Barbula cylindrica Schpr = *Barb. vinealis* Brid. var. *cylindrica* (Tayl.) Boul.
Barbula Drummondii Mitt. = *Tortella fragilis* (Drumm.) Limpr.
Barbula fallax Hedw. — FBS n. 127; Dz L II; Lac. B; En III; Cat II; M; P I n. 1508; Lac. Am; Lac. L; E; Ov I; P II n. 232; V.D; Gr.
Barbula fragilis Wils. = *Tortella fragilis* (Drumm.) Limpr.
Barbula Hornschuchiana Schultz — V.D; BN II.
Barbula inclinata Prodr. Ed. I (ook Schwg.) = *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth.
Barbula inclinata Verslag 1873 (non Prodr.) = *Hymenostomum tortile* (Schwaegr.) Br. eu.
Barbula intermedia Wils. = *Tortula montana* (Nees) Lindb.
Barbula intermedia Wils. var. *pulvinata* Milde = *Tortula pulvinata* (Jur.) Limpr.
Barbula laevipila Brid. (ook v. Hall of B. et Sch.) = *Tortula laevipila* (Brid.) de Not.
Barbula laevipila forma in P I is volgens NKA V p. 304 *Tortula papillosa* Wils.
Barbula latifolia B. et Sch. = *Tortula latifolia* Bruch
Barbula marginata B. et Sch. = *Tortula marginata* (Br. eu.) Spruce
Barbula muralis Brid. (ook Hedw. of Timm) = *Tortula muralis* (L.) Hedw.
Barbula muralis var. *aestiva* Schultz (ook B. et Sch.) = *Tortula aestiva* (Brid.) Pal.

- Barbula papillosa* Wils. = *Tortula papillosa* Wils.
Barbula pulvinata Juratz. = *Tortula pulvinata* (Jur.) Limpr.
Barbula revoluta (Schr.) Brid. (ook Schwaegr.) — P I n. 1506;
 Lac. L; Bu; Ov I; P II n. 228; Nat; V.D; Fr; BN VIII.
Barbula rigida B. et Sch. (ook Schultz) = *Aloina stellata* (Schreb.)
 Kindb.
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. (ook Milde; *Trichostomum rigidulum* Sm.) — Cat II; M; P I n. 1515; Lac. Am; Lac. L; Ov I;
 P II n. 231; Un 32; Un 36.
Barbula ruralis Hedw. = *Tortula ruralis* (L.) Ehrh.
Barbula ruralis β *rupestris* Br. eu. = *Tortula montana* (Nees) Lindb.
Barbula squarrosa Brid. = *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb.
Barbula subulata Brid. (ook Schultz) = *Tortula subulata* (L.) Hedw.
Barbula tortuosa Web. et Mohr uit M en P I is een verkeerde determinatie voor *Tortella fragilis* (Drumm.) Limpr. Zie NKA V, 4, p. 290 en NKA V p. 398.
Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. (*Tortula mucronulata* Sw).
 — Geer n. 84; FBS n. 124; Dz L I; Ut n. 77; En II; Cat I; M;
 Nijm. I n. 869; P I n. 1509; Trap; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 489;
 NKA VI p. 201; E; NKA VII p. 124; Ov I; Nijm II n. 1026;
 Camp II n. 643; P II n. 233; Nat; V.Z; K.F; W; K.M; Un 32;
 Fr; NKA XLVI p. 201; Un 35; BN VIII; Bar; BN IX; Gr.
 var. *apiculata* (Hedw.) Hübén. (ook B. et Sch.) — P I n. 1509
 var.; P II n. 233 var.
 var. *cuspidata* (Schultz) Hübén. (ook B. et Sch.) — FBS n. 124 β ;
 P I n. 1509 var.; P II n. 233 var.
 var. *elongata* Brid. = var. *cuspidata* (Schultz) Hübén.
 var. *fastigiata* (Schultz) Hübén. (ook B. et Sch.) — P I n. 1509
 var.; P II n. 233 var.
 var. *microcarpa* (Schultz) Hübén. (ook Schpr) — P I n. 1509
 var.; P II n. 233 var.
 var. *obtusifolia* (Schultz) Br. eu. (ook B. et Sch.) — P I n. 1509
 var.; P II n. 233 var.
 fm. *torta* — K.F.
Barbula vinealis Brid. — NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 229.
 var. *cylindrica* (Tayl.) Boul. (*Barbula cylindrica* Schpr) — Ov I;
 P II n. 230; Bar.
Bartramia fontana Brid. (ook Sw.) = *Philonotis fontana* (L.) Brid.
Bartramia ithyphylla (Hall.) Brid. (ook Schwaegr.) — FBS n. 84;
 M; NKA II p. 71 (verklaart FBS n. 84 voor *B. pomiformis*);
 P I n. 1465; Bu; NKA VI p. 309; Ov I; P II n. 119; Fr.
Bartramia marchica Brid. = *Philonotis marchica* (Willd.) Brid. De
 ex. van Dz L II staan met andere in P I sub n. 1461; die andere

vindt men in P II terug onder *Philonotis fontana*; het ex. van Dozy niet.

Bartramia Oederi Sw. — P I n. 1464; Fr.

Bartramia pomiformis (L. ex p.) Hedw. (*Bryum pomiforme* L.)

— G VII n. 880; Ehrh; FBS n. 83; Ut n. 51; En II; DMb II; Cat I; M; Hov. I; Nijm I n. 841; P I n. 1462; NKA III p. 174; Lac. L; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 992; P II n. 118; V.D; K.F; V; Un 28; Fr; BN VIII; Bar; BN IX.

Brachythecium albicans (Neck.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum albicans* L. of Neck.) — FBS n. 44; Wtt; Dz L I; Ut n. 25; En II; Cat II; Beek; M; Hov I; Camp I n. 550; NKA II p. 70; P I n. 1383; Trap; NKA IV p. 237; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1383; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 950; Camp II n. 588; P II n. 74; Un 26; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; K.M; NKA XLVI p. 201; Un 35; Blok; Un 37; NKA L p. 299; BN VIII; Bar; BN IX; Pl.

var. *dumetorum* Limpr. — Un 35.

Brachythecium glareosum (Bruch) Br. eu. (ook B. et Sch.; *Hypnum glareosum* B. et Sch.) — P I n. 1382; Lac. L; NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 75; Un 39; Gr.

Brachythecium Mildeanum (Schimp.) Schimp. (ook Buse) — Bu; Hol zonder nummer; E; NKA X p. 381; Nijm II n. 954; Camp II n. 585; P II n. 76 var.; K.M; NKA XLVI p. 201; Blok; Un 40.

Brachythecium nitens Buse = *Tomenthypnum nitens* (Schreb.) Loeske

Brachythecium plumosum (Sw.) Br. eu. (*Hypnum plumosum* L.) — P I n. 1379; Delf n. 514; Ov I; Nijm II n. 951; P II n. 69; Fr; Acht.

Brachythecium populeum (Hedw.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum populeum* Hedw.; ook Sw.) — FBS n. 36; Dz L I; Ut n. 20; En II; Cat I; M; Nijm I n. 805; NKA II p. 70; P I n. 1378; Lac. Am; Delf n. 515; E; Ov I; P II n. 70; Acht; BN VIII; Bar.

var. *erythropodium* Brid. uit P I vindt men in P II terug onder de hoofdsort.

var. *subfalcata* Br. eu. — P II n. 70 var.

Brachythecium purum Dixon = *Pseudoscleropodium purum* (L.) Fleisch.

Brachythecium rivulare Br. eu. (*Hypnum rivulare* Brid. of B. et Sch.) — DMb I; En IV; Cat II; M; P I n. 1371; Lac. Am; E; Ov I; P II n. 71; Nat; BN VIII; BN IX; Pl. Bijna alle opgaven zijn verkeerd.

Brachythecium rutabulum (L.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum*

rutabulum L.) — Boerh p. 20 n. 5 en p. 22 n. 44; Meese n. 460; Gort Belg n. 866; Zut n. 508; G VII n. 906; FBS n. 45; Dz LI; Ut n. 26; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 813; Camp I n. 553; P I n. 1370; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 513; Hol n. 1370; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 952; Camp II n. 587; P II n. 71; Un 25; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; S; Un 32; Fr; BN II; Un 34; NKA XLVI p. 201; Un 35; Acht; Un 36; Blok; Un 37; Un 38; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; NKA LII; Na; Pl; MM; Gr. var. auro-virens Brid. — BN II.
var. flavescens — BN IX.
var. lutescens Warnst. — Un 35.
fm. robustum — Un 32.

Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Br. eu. (ook Schpr; Hypnum salebrosum Hoffm.) — En II; M; P I n. 1381; Lac. Am; Delf n. 512; Ov I; NKA X p. 381; Nijm II n. 955; Camp II n. 584; P II n. 76; Nat; Un 28; W; S; Acht; Un 36; Blok; Un 37; Un 39; Un 41; Na; Gr.

var. palustre Schpr = *Brachythecium Mildeanum* (Schimp.) Schimp.

Brachythecium Starkei (Brid.) Br. eu. — Garj. M. Bewijsmateriaal ontbreekt.

Brachythecium velutinum (L.) Br. eu. (ook Schpr; Hypnum velutinum L.) — Boerh p. 20 n. 3; Meese n. 465; Gort Belg n. 880; G VII n. 925; Mul p. 104; FBS n. 37; Dz L I; Ut n. 21; En II; Cat I; M; Nijm I p. 806; Camp I n. 548; P I n. 1373; NKA III p. 173; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 511; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 953; Camp II n. 586; P II n. 73; Add; Nat; V.D; K.F; V; W; Fr; BN II; Acht; Blok; BN VIII; Bar; BN IX; Gr. var. intricatum (Hedw.) Br. eu. (ook Schreb.; Hypnum intricatum Schreb.) — FBS n. 38; Cat I; M; Nijm I n. 807; P I var. γ.

var. sericeum Rabenh. uit P I vindt men in P II onder de hoofdsoort terug.

Breidleria arcuata (Lindb.) Loeske (*Hypnum arcuatum* Lindb.; H. Lacostei Buse; H. Patientiae Lindb.) — NKA V, 4, p. 281;

Bu; NKA VI p. 197, p. 202 en p. 249; Ov I; P II n. 17; Un 39.

Bryum affine (Bruch) Lindb. (*Br. cuspidatum* Schimp.) — P II n. 153; BN VIII; Un 40.

Bryum affine zonder auteursnaam in Ut n. 62 is *Mnium affine* Bland.

Bryum alpinum Huds. (ook L.) — Cat II; M; P I n. 1455; NKA III p. 489; Bu; Hov II; Ov I.

Bryum androgynum Hedw. = *Aulacomnium androgynum* (L.) Schwaegr.

Bryum annotinum Hedw. = *Webera annotina* (Hedw.) Bruch

Bryum apocarpum L. = *Grimmia apocarpa* (L.) Hedw.

Bryum argenteum L. — Comm p. 77; Boerh p. 22 n. 49; GZA n. 650; Gort Belg n. 858; Loos n. 253; Zut n. 503; G VII n. 895; Mul p. 103; FBS n. 88; Dz L I; Ut n. 54; En II; Cat II; M; Nijm I n. 844; Camp I n. 568; P I n. 1456; Trap; NKA IV p. 237; Lac. Am; Delf n. 503; Hol n. 1456; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1001; Camp II n. 625; P II n. 143; Add; Un 26; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; S; Un 32; Fr; Un 33; NKA XLVI p. 201; Acht; Un 36; Blok; Un 38; BN VI; Un 39; NKA L p. 220, p. 242, 252, 259, 260; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Gr.

var. *lanatum* (P. Beauv.) Br. eu. — P I n. 1456 γ ; Nijm II n. 1001 var.; P II n. 143 var.; V; W.

var. *majus* Br. eu. (ook Schwaegr.; *Bryum julaceum* Schrad.) — FBS n. 89; M; P I n. 1456 β ; Lac. Am; P II n. 143 var. G VII n. 895 var. β siteert Dillen plaat 50 fig. 63, waarover de deskundigen verschillend oordelen.

Bryum atropurpureum Web. et Mohr = *Br. bicolor* Dicks.

Bryum badium Bruch — En II (als *Br. annotinum* Hedw.); Ov I; P II n. 144.

Bryum bicolor Dicks. (*B. atrò-purpureum* Web. et Mohr) — Dz L II; En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1454; Lac. Am; Bu; Delf n. 501; Ov I; P II n. 147; V.Z; Un 35; NKA L p. 259; BN VIII; Bar.

Bryum bimum Schreb. — DMb I; M; Camp I n. 571; P I n. 1445; NKA IV p. 243; Lac. Am; Ov I; NKA VIII p. 425; Camp II n. 623; P II n. 152; Add; Nat; Fr; BN VIII; Bar.

Bryum caespitium L. — Comm p. 91; GZ n. 572; Meese n. 456; Gort Belg n. 860; G VII n. 897; Mul p. 103; FBS n. 95; Dz L I; Ut n. 56; En II; Cat I; M; Nijm I n. 847; P I n. 1452; Trap; NKA III p. 287; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 502; Hol n. 1452 (verkeerd); E; Hov II; Ov I; NKA X p. 382; Nijm II n. 1002; Camp II n. 624; P II n. 145; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; W; Un 32; Fr; Un 34; NKA XLVI p. 201; Un 35; Un 36; Blok; BN III (met broeddraden); BN VIII; Bar; Un 41.

var. *gracilescens* Br. eu. — En III; M; P I n. 1452 β (wel een onbeduidende standplaatsvorm).

var. *imbricatum* Br. eu. — En III; M; P I n. 1452 γ ; Lac. Am; P II n. 145 var.

Deze var. *imbricatum* werd door LIMPRICHT als aparte soort:

Bryum Kunzei Hornsch. in ere hersteld; maar hij betwijfelt of alle ex., var. *imbricatum* genoemd, tot deze *Bryum Kunzei* behoren. MOENKEMEYER brengt haar als var. *Kunzei* (Hornsch.) Warnst. weer onder *Bryum caespiticium*.

***Bryum capillare* L.** (ook Hedw.; *Mnium capillare* L.) — Comm p. 91; Boerh p. 21 n. 38; Gort Belg n. 861; G VII n. 873; FBS n. 93; Dz L I; En II; Cat I; M; Camp I n. 569; P I n. 1448; Trap; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 504; NKA VI p. 202; E; Ov I; NKA VIII p. 425; Camp II n. 626; P II n. 142; Un 26; Nat; V.D; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Un 32; BN II; Un 35; Un 36; Blok; Un 37; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX; MM; Gr.

var. *cuspidatum* Schpr = var. *macrocarpum* Hüben.

var. *flaccidum* Br. eu. (ook Schpr) — P I n. 1448γ; P II n. 142 var.; K.F; Un 32.

var. *macrocarpum* Hüben. (var. *cuspidatum* Schpr) — P II n. 142 var.; V.

var. *majus* B. et Sch. = var. *macrocarpum* Hüben.

Hoewel var. *cuspidatum* in P II met aparte vindplaatsen vermeld staat, vindt men daar de ex. van var. *majus* uit P I onder de hoofdsoort.

Bryum carneum L. = *Mniobryum carneum* (L.) Limpr.

***Bryum cernuum* (Sw.) Lindb.** (ook B. et Sch.; *Br. uliginosum* B. et Sch.) — En II; Lac. B; DMb I; Cat II; M; Camp I n. 570; P I n. 1431 (de opgaven hieruit vindt men in P II terug als *Bryum pendulum*); P I n. 1433; Bu; Hol n. 1431 (hij geeft als synoniem *Bryum pendulum*!); E; Ov I; P II n. 157; Bar.

***Bryum cirratum* Hoppe et Hornsch.** — Ov I; P II n. 154; NKA XLVI p. 201 (als *Bryum „serratum* H. et H.”).

Bryum crudum Schreb. = *Webera cruda* (L.) Bruch

Bryum cuspidatum Schpr = *Bryum affine* (Bruch) Lindb.

Bryum cuspidatum Sw. = *Mnium cuspidatum* (L. ex p., Schreb.) Leyss.

Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Br. eu. staat in M, welke opgave nergens bevestigd is, hoewel de soort later weer opduikt in Ov I voor Utrecht.

Bryum decipiens D.C. = *Webera annotina* (Hedw.) Bruch

Bryum Duvalii Kit. in Cat. II; wel verkeerde auteursnaam.

Bryum Duvalii Voit. in Lac. B en bij M; later komt de naam *Duvalii* niet meer voor en is dus verkeerd geweest.

Bryum ellipticum v. d. S. Lac. = *Bryum ventricosum* Dicks.

***Bryum erythrocarpum* Schwaegr.** — Cat I; M; P I n. 1453; NKA V,2, p. 292; Bu; Hol n. 1453; E; Ov I; Nijm. II n. 1003;

P II n. 149; Add; NKA XII p. 45; V; NKA XLVI p. 201; Acht; Bar.

var. murale Schpr staat in Garj. M zonder nadere vindplaatsen. (Schrijffout voor murorum Schpr = *Bryum murale* Wils.?)

Bryum extincitorium L. = *Encalypta vulgaris* (Hedw.) Hoffm.

Bryum extincitorium var. majus L. = *Encalypta ciliata* (Hedw.) Hoffm.

Bryum fallax Milde — NKA VI p. 107, p. 250, 308; Ov I; P II n. 156.

Bryum filiforme Dicks. Zie bij Br. *julaceum* Sm.

Bryum flexuosum L. = *Campylopus flexuosus* (L.) Brid.

Bryum glaucum L. (ook Dill.) = *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.

Bryum heteromallum L. = *Dicranella heteromalla* (L.) Schimp.

Bryum hornum Sw. = *Mnium hornum* L.

Bryum hypnoides L. = *Rhacomitrium hypnoides* (L.) Lindb.

Bryum hypnoides var. *virescens* L. = *Rhacomitrium canescens* (Weis, Timm) Brid.

Bryum inclinatum (Sw.) Br. eu. — DMb I, En IV, Cat I, M; P I n. 1432; NKA IV p. 238; Lac. Am; NKA V, 2, p. 292; Hol n. 1432; E; Ov I; P II n. 161; V.D; K.F; W; Un 35; BN VIII; Bar.

Bryum intermedium (Ludw.) Brid. (ook B.S.) — P I n. 1443;

NKA IV p. 238; Lac. Am; Ov I; P II n. 155; W; Un 32; Acht; Gr.

Bryum julaceum Schrad. = Br. *argenteum* L. var. *majus* Br. eu.

Bryum julaceum Sm. = Br. *filiforme* Dicks. Deze opgave van DE GEER n. 97 is nooit bevestigd. FBS ziet de auteursnaam bij DE GEER over het hoofd en brengt deze opgave terug tot Br. *argenteum* var. *majus*.

Bryum lacustre Bland. (ook Brid.) — Lac. Am; Bu; NKA VI p. 250; Ov I; P II n. 159; V.D; BN VIII.

Bryum latifolium Br. et Sch. (in P I) = Br. *Marratii* Wils. Zie NKA IV p. 48 en 49.

Bryum ligulatum Schreb. = *Mnium undulatum* (L.) Weis

Bryum litorum Baur — Blok; NKA LI p. 396. Het vinden van kapseldragende ex. wees uit, dat de ex. uit NKA LI *Bryum bicolor* zijn geweest.

Bryum Ludwiggii Spr. = *Webera Ludwiggii* (Spreng.) Schimp.

Bryum luridum Ruthe — NKA VIII p. 101; Ov I; P II n. 163; V.D; BN II (hier de vermelding dat de opgave zeker verkeerd is en vermoedelijk Br. *inclinatum*)

Bryum Marratii Wils. (Br. *latifolium* B. et Sch.) — P I n. 1434.

NKA IV p. 48 en 185; Lac. Am; NKA V p. 397; Ov I; P II n. 158.

Bryum murale L. = *Tortula muralis* (L.) Hedw.

Bryum murale Wils. — Ov I; P II n. 148.

Bryum neodamense Itzigs. — P I n. 1450; Hol n. 1450; E; Ov I; P II n. 139; V.D.

Bryum nutans Schreb. (ook Web.) = *Webera nutans* (Schreb.) Hedw.

Bryum pallens Sw. — DMb I; En III; M; P I n. 1451; Lac. Am; Bu; Delf n. 505; NKA VI p. 197, 202, 250; Ov I; P II n. 141; Nat; BN VIII.

Bryum pallescens Schleich. — NKA VI p. 22; P II n. 150.

Bryum palustre Sw. = *Aulacomnium palustre* (L.) Schwaegr.

Bryum pellucidum L. = *Dichodontium pellucidum* (L.) Schimp.

Bryum pendulum (Hornsch.) Schimp. (ook Hornsch.) — Lac. Am; Lac. L; Ov I; Camp II n. 622; P II n. 162; Nat; V.S; V.D; Un 35; Bar; Na.

Bryum polymorphum B. et Sch. = *Webera polymorpha* (H. et H.) Schimp. Vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V, 4, p. 290. De ex. uit P I n. 1435 vindt men in P II onder *Webera nutans* (Schreb.) Hedw.

Bryum pomiforme L. = *Bartramia pomiformis* (L. ex p.) Hedw.

Bryum pseudotriquetrum Schwaegr. (ook Brid.) = *Br. ventricosum* Dicks.

Bryum pulchellum Hedw. = *Webera pulchella* (Hedw.) Schimp.

Deze opgave bij M wordt nergens herhaald; in Cat. II met een ?.

Bryum pulvinatum L. = *Grimmia pulvinata* (L.) Sm.

Bryum punctatum Schreb. = *Mnium punctatum* (L., Schreb.) Hedw.

Bryum pyriforme Hedw. (ook Mart. of Sw.) = *Leptobryum pyriforme* (L.) Wils.

Bryum pyriforme L. = *Physcomitrium pyriforme* (L.) Brid.

Bryum roseum Schreb. = *Rhodobryum roseum* (Weis) Limpr.

Bryum rurale L. = *Tortula ruralis* (L.) Ehrh.

Bryum scoparium L. = *Dicranum scoparium* (L.) Hedw.

Bryum serratum H. et H. met een ? in NKA XLVI p. 201 is een schrijffout voor *Bryum cirratum* H. et H.

Bryum Sphagni Brid. = *Webera sphagnicola* (Br. eu.) Schimp.

Deze staat in P I n. 1437, waar duidelijk het tweehuizig zijn naar voren wordt gebracht; dit in tegenstelling met *Webera nutans* en zijn variëteiten, die eenhuizig zijn. In NKA V, 4, p. 290 zegt BUSE, dat *Bryum Sphagni* als inlands moet vervallen, als berustend op een vergissing. In P II vindt men deze ex. terug onder *Webera nutans* var. *sphagnetorum* Schimp.

Bryum sphagnicola B. et Sch. Zie bij *Bryum Sphagni*.

Bryum striatum L. = *Orthotrichum striatum* (L.) Schwaegr.

Bryum striatum var. *ulophyllum* Ehrh. = *Ulota ulophylla* (Ehrh.) Brot.

Bryum subulatum L. = *Tortula subulata* (L.) Hedw.

Bryum torquescens Br. eu. (ook B. et Sch.) — DMb I; En III; M; P I n. 1444; NKA V,4, p. 290 (hier zegt BUSE, dat Br. torquescens als inlands vervalt); NKA VI p. 22, 250; E; Ov I; P II n. 151.

Bryum truncatulum L. = *Pottia truncatula* (L.) Lindb.

Bryum turbinatum (Hedw.) Schwaegr. (ook Hedw.) — P I n. 1449; NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 138; V.D; Nat.

Bryum uliginosum B. et Sch. = *Br. cernuum* (Sw.) Lindb.

Bryum undulatum L. = *Catharinaea undulata* (L.) Web. et Mohr.

Bryum ventricosum Dicks. (Br. ellipticum v. d. S. Lac.; Br. pseudotriquetrum Brid., ook Schwgr.) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat II; M; NKA II p. 71; P I n. 1446; Lac. Am; NKA V,2, p. 292, 294; Hol n. 1446; E; Ov I; P II n. 140; Add; Nat; V.D; Fr; BN VIII; Bar; Gr.

var. *gracilescens* Schimp. — P II n. 140 var.

fm. *propagulifera* Amann — V.

Bryum viridulum L. = *Weisia viridula* (L.) Hedw.

Bryum Wahlenbergii Schwaegr. = *Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr.

Bryum Warneum Bland. (ook Brid.) — Bu; NKA VIII p. 101; Ov I; P II n. 160; BN VIII.

Buxbaumia aphylla L. (ook Hall.) — Geuns n. 66; FBS n. 120; En IV; Cat. I; M; Nijm I n. 865; P I n. 1410; NKA V,4, p. 292; Bu; NKA VI p. 300; Ov I; Nijm II n. 979; P II n. 101; BN VIII; BN IX.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. (*Hypnum cordifolium* Hedw., ook L.) — Ut n. 42; Lac. B; DMb I; En IV; Cat I; M; P I n. 1347; NKA IV p. 238; NKA V,2, p. 292; NKA V,4, p. 282; Bu; E; Ov I, P II n. 12; Add; V.S; V.D; K.F; W; Un 32; Un 34; Un 35; Acht; BN VIII; Bar; NKA LII; Na; Gr.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. (*Hypnum giganteum* Schpr) — NKA V,4, p. 282; Bu; Hol zonder nr; E; Ov I; P II n. 11, V.D, S, BN II, Un 34, NKA XLV p. 268, Nop; Acht; NKA LII; Na.

Calliergon stramineum (Dicks.) Kindb. (*Hypnum stramineum* Dicks.) — P I n. 1346; NKA III p. 236; NKA V p. 87; Bu; Ov I; P II n. 7; Un 33; Un 39; Bar; MM; Gr.

Calliergonella cuspidata (L.) Loeske (*Hypnum cuspidatum* L.; *Acrocladium cuspidatum* (L.) Limpr.) — G VII n. 923; FBS n. 52; Dz L I; Ut n. 31; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 819;

- Camp I n. 541; P I n. 1345; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; Lac. L; Bu; Delf. n. 527; Hol n. 1345; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 942; Camp II n. 582; P II n. 10; Add; Un 25; Un 26; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; S; Un 32; Fr; Un 33; Un 34; Un 35; Acht; Un 36; Blok; Un 37; Un 39; NKA L p. 242, 251, 300; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; NKA LII; Na; MM; Gr.
 var. caespitosum Whitehead — Un 26.
 fm. fluitans v. Klinggr. — Bu; P II n. 10 var.; BN II.
 var. fontinaloides (Buse) = fm. fluitans v. Klinggr.
 fm. inundata Lamy = BN II.
- Camptothecium lutescens** (Huds.) Br. eu. (ook Schpr en B. et Sch.; Hypnum lutescens Huds., ook Dill.) — Ehrh; Geuns n. 78; FBS n. 43; Dz L I; Ut n. 24; En II; Cat I; M; Nijm I n. 812; Camp I n. 549; P I n. 1380; NKA IV p. 238; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1380; E; Hov II; Ov I; NKA X p. 382; Nijm II n. 956; Camp II n. 589; P II n. 78; Add; Un 26; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Fr; Un 35; Blok; BN VIII; Bar; BN IX; Gr.
- Camptothecium nitens** Schpr = *Tomenthypnum nitens* (Schreb.) Loeske
- Camptothecium trichodes** = *Tomenthypnum nitens* (Schreb.) Loeske
- Campylium chrysophyllum** (Brid.) Bryhn (Hypnum chrysophyllum Brid.) — Dz L I; M; P I n. 1354; E; Ov I; P II n. 34.
- Campylium helodes** (Spruce) Broth. (Hypnum elodes Spruce; Hygrohypnum elodes) — P I n. 1355; E; Ov I; P II n. 35; V.D; Un 28; Bar.
 var. hamulosum Schpr (volgens MOENKEMEYER en WARNSTORF is dit var. falcata Everken); P II n. 35 var.
- Campylium hispidulum** (Brid.) Mitt. var. **Sommerfeltii** (Myr.) Lind. (Hypnum Sommerfeltii Myrin; H. stellatum var. tenellum C. Müll.) — P I n. 1353 var. γ ; Bu; NKA VI p. 22; Ov I; P II n. 36.
- Campylium hygrophilum** Jur. (Hypnum hygrophilum Jur.; Amblystegium hygrophilum Schimp. β limosum Schpr) — NKA VI p. 250; P II n. 39.
- Campylium polygamum** (Br. eu.) Bryhn (Hypnum polygamum Schpr; ook Schpr et Gümbe.; H. riparium var. pseudostellatum Dz et Mb; Amblystegium polygamum B. et Sch.) — P I n. 1384 var. ϵ ; NKA IV p. 244; NKA V p. 76; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; Bu; Hol n. 1384; E; Ov I; P II n. 32; Un 26; V.D; K.F; S; Un 35; BN VIII; Bar; Na; Gr.
 var. submersum — Zie bij Fontinalis gracilis.

- Campylium protensum** (Brid.) Broth. (*Hypnum stellatum* var. *protensum* Rabenh.) — P I n. 1353 var. (verkeerd); BN II; NKA L p. 300.
fm. *tenera* Moenk. — V; Bar.
- Campylium stellatum** (Schreb.) Lang. et C. Jens. (*Hypnum stellatum* Schreb.; *Hygrohypnum stellatum*) — FBS n. 50; Dz L I; Ut n. 29; En II; Lac. B; Cat II; As; M; P I n. 1353; Trap; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; Lac. L; Hol n. 1353; NKA VI p. 197; Ov I; P II n. 33; Add; NKA XII p. 45; Un 26; V.D; K.F; Pol; Fr; Blok; BN VIII; Bar; Gr.
var. *protensum* = *Campylium protensum* (Brid.) Broth.
var. *tenellum* (vermoedelijk een vorm van *Campylium chrysophyllum*) — E; P II n. 33 var.
- Campylopus atrovirens** de Not. Verkeerde determinatie in P I n. 1543 voor *C. brevipilus*; NKA III p. 236; NKA V,4, p. 290 (hier wijst BUSE er op, dat deze soort als inlands moet vervallen).
- Campylopus brevipilus** Br. eu. (ook Schpr) — P I n. 1543 (als *C. atrovirens*); NKA V p. 88 (als *C. decipiens* v. d. S. Lac., die in een noot op de verschillen met *C. brevipilus* wijst); NKA V,2, p. 294; Bu; NKA VI p. 197; p. 249; Ov I; P II n. 270; K.F. var. *Molkenboeri* (v. d. S. Lac.) Milde staat uit Holland vermeld in Limpr. I p. 403.
- Campylopus decipiens** v. d. S. Lac. = *C. brevipilus* Br. eu. volgens Limpr. I p. 401.
- Campylopus densus** B. et Sch. = *C. fragilis* (Dicks.) Br. eu. var. *densus* (Schleich.) Schimp.
- Campylopus flexuosus** (L.) Brid. (*Bryum flexuosum* L.; *Dicranum flexuosum* Hedw.) — Meese n. 452; Gort Belg n. 853; G VII n. 890; FBS n. 134; Ut n. 84; Lac. B; DMb I; DMb II; En IV; Cat I; M; Nijm I n. 875; Bu; Ov I; P II n. 273; V.Z; Un 38; BN VI; BN VIII; Bar.
P I verklaart *Dicranum flexuosum* uit Meese en FBS voor *C. fragilis*; daarentegen vindt men alle opgaven van *C. fragilis* uit P I terug in P II onder *C. turfaceus* = *C. pyriformis*.
- Campylopus fragilis** (Dicks.) Br. eu. (ook Schpr) — P I n. 1545; (alle verkeerd volgens P II); NKA V. p. 421; E; Ov I; P II n. 272; V.D; BN II; Un 36; Bar.
var. *densus* (Schleich.) Schimp. — P I n. 1544.
- Campylopus pyriformis** (Schantz) Brid. (*C. turfaceus* B. et Sch.) — P I n. 1545 (volgens P II); Bu; Ov I; NKA VIII p. 424; P II n. 271; V.S; K.F; Un 28; Bar.
- Campylopus turfaceus** B. et Sch. (ook *C. torfaceus* Sch.) = *C. pyriformis* (Schantz) Brid.

Catharinaea angustata Brid. (*Atrichum angustatum* B. et Sch.) — Ov I; P II n. 113.

Catharinaea Callibryon Ehrh. = *Catharinaea undulata* (L.) Web. et Mohr

Catharinaea minor Br. = *C. undulata* (L.) Web. et Mohr var. minor (Hedw.) Web. et Mohr

Catharinaea tenella Roehl. (*Atrichum tenellum* B. et Sch.) — P I n. 1421; NKA V p. 76, p. 88; Bu; Hol n. 1421; E; Ov I; P II n. 112; Nat; V.D; Acht; NKA L p. 218, 233.

Catharinaea undulata (L.) Web. et Mohr (ook Brid.; *Bryum undulatum* L.; *Atrichum undulatum* P.B.; *Catharinaea Callibryon* Ehrh.) — Boerh. p. 22 n. 47; Gort Belg n. 850; G VII n. 887; Ehrh; FBS n. 109; Dz L I; Ut n. 68; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 857; Camp I n. 565; P I n. 1420; Trap; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1420; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 988; Camp II n. 616; P II n. 114; Nat; V.S. V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Un 32; J.L; Fr; BN II; NKA XLV p. 267; Acht; Un 36; Blok; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Pl; MM; Gr.

var. abbreviatum Br. et Sch. = var. minor.

var. minor (Hedw.) Web. et Mohr (*Catharinaea minor* Br.) — FBS n. 109 β ; DMb I; DMb II; M; P I n. 1420 β ; Hov II; P II n. 114 var.; BN VIII.

Catoscopium nigrum (Hedw.) Brid. — Dz L II; M; P I n. 1466; NKA III p. 490; E; Ov I; P II n. 125; V.D.

Ceratodon conicus Lac. = *C. purpureus* ssp. *conicus* (Hampe) Dixon

Ceratodon purpureus (L.) Brid. (*Mnium purpureum* L.; *Dicranum purpureum* Hedw.; *Didymodon purpureum* H. et T.) — G VII n. 870; n. 898; FBS n. 137; Dz L I; Ut n. 86; En II; Cat I; M; Nijm I n. 877; Camp I n. 580; P I n. 1527; Trap; NKA IV p. 237; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 488; Hol n. 1527; NKA VI p. 197, 201; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1020; Camp II n. 641; P II n. 257; Add; Un 25; Un 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; S; NKA XLIII p. 386; Un 32; Fr; Un 33; BN II; Un 34; NKA XLVI p. 201; Un 35; Acht; Un 36; Blok; Un 38; BN VI; Un 39; NKA L p. 259, 260; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; MM; Gr.

fm. *cuspidatus* Warnst. — K.F; Un 28; W.

fm. *rufescens* Warnst. — W; Un 32.

stat. *propagulifera* — NKA XLI p. 178; W; K.M; Un 35; Un 37.

ssp. *conicus* (Hampe) Dixon — P II n. 258; V.D; BN II.

- Met zijn n. 898 wist G VII geen raad; hij siteert Dillen pl. XLIX fig. 50, welke volgens WILSON, BRAITHWAITE en LIMPRICTH voorstelt: *Ceratodon purpureus*. FBS noemt dit *C. purpureus* var. *bipartitus* Brid. De varr. *bipartitus* Brid. en *palustris* Brid. uit FBS vindt men in P I en P II onder de hoofdsoort terug. M noemt nog var. *tripartitus* Brid., welke in FBS zou voorkomen (wel schrijffout voor *bipartitus*).
- Cinclidium stygium** Sw. — Ov I; P II n. 126.
- Cinclidotus fontinaloides** (Hedw.) Pališ. — Lac. B; Cat I; M; Ov I; P II n. 215; Un 32; BN VIII.
- Cinclidotus riparius** (Host) Arn. (ook Br. et Sch. of Walk. Arn.) — Lac. B; Cat I; M; P I n. 1408; E; Ov I; P II n. 216.
var. *terrestris* Br. et Sch. = *Dialytrichia mucronata* (Brid.) Limpr.
- Cirriphyllum crassinervium** (Tayl.) Loeske et Fleisch. (*Hypnum crassinervium* Wils.; *Eurhynchium crassinervium* Schpr) — P I n. 1372; Ov I; P II n. 65.
- Cirriphyllum piliferum** (Schreb.) Grout (*Hypnum piliferum* Schreb.; *Eurhynchium piliferum* Schpr) — FBS n. 51; Dz L I; Ut n. 30; En II; Lac. B; Cat I; As; M; Nijm I n. 818; Camp I n. 554; P I n. 1369; Lac. Am; Lac. L; E; Ov I; Camp II n. 595; P II n. 64; Add; Un 28; S; BN IX.
- Climacium dendroides** (Dill., L.) Web. et Mohr (*Hypnum dendroides* L.) — Boerh p. 21 n. 24; GZA n. 651; Gort Belg n. 877; Zut n. 512; G VII n. 919; FBS n. 75; Dz L I; Ut n. 47; En II; DMb I; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 837; Camp I n. 540; P I n. 1395; Trap; NKA III p. 283 (2 fmm); NKA V p. 75; Lac. Am; Lac. L; Bu; Delf n. 508; Hol n. 1395; NKA VI p. 202; E; NKA VII p. 124; Hov II; Ov I; Nijm II n. 971; Camp II n. 604; P II n. 81; Un 25; Un 26; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; S; Un 32; Fr; Un 35; Acht; Un 36; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Gr.
- Cratoneurum filicinum** (L.) Roth (*Hypnum filicinum* L., *Amblystegium filicinum* Lindb.) — Boerh p. 21 n. 25; Gort Belg n. 867; Zut n. 509; G VII n. 907; Mul p. 104; FBS n. 61; Dz L I; Dz L II; Lac B; Cat I; M; Nijm I n. 826; P I n. 1341; Trap; E; Ov I; NKA X p. 381; Camp II n. 592; P II n. 22; Nat; V.D; Fr; BN VIII.
- Cratoneurum glaucum** (Lam.) C. Jens. (*Hypnum commutatum* Hedw.) — Geer n. 96; FBS n. 62; Cat II; M; Nijm I n. 827; NKA II p. 70; P I n. 1340; Lac. L; Ov I; Nijm II n. 945; P II n. 21; Fr.
var. *falcatum* (Brid.) C. Jens. — P I n. 1340 β .
- Cryphaea arborea** (Huds.) Lindb. (*Neckera heteromalla* Hedw.; *Daltonia heteromalla* H. et T.; *Cryphaea heteromalla* Brid. of

- Mohr) — Boerh p. 22 n. 42?; Geer n. 87; FBS n. 79; Dz L I; Ut n. 49; En II; Lac. B; Cat I; Cat II; M; Nijm I n. 839; P I n. 1401; Trap; Lac; Am; Bu; E; Ov I; P II n. 98; V.D; V.Z; Un 32; BN II; BN VIII.
- Ctenidium molluscum** (Hedw.) Mitt. (*Hypnum molluscum* Hedw.) — Boerh p. 21 n. 27; Gort Belg n. 871; G VII n. 911; FBS n. 60; Dz L I; Cat I; M; NKA II p. 70; P I n. 1362; Lac. L; Bu; NKA VI p. 107; E; Ov I; P II n. 15; Nat; V.D; Fr; BN VIII.
- Cylindrothecium concinnum* Schpr = *Entodon orthocarpus* (La Pyl.) Lindb.
- Cynodontium Bruntoni** (Sm.) Br. eu. (*Dicranoweisia Bruntoni* Schpr) — P I n. 1526; Ov I; P II n. 289.
- Daltonia heteromalla* H. et T. = *Cryphaea arborea* (Huds.) Lindb.
- Desmatodon flavicans* Br. et Schpr = *Tortula obtusifolia* Schleich., maar de ex. uit P I n. 1521 zijn verkeerd gedetermineerd.
- Dialytrichia mucronata** (Brid.) Limpr. (*Barbula Brebissoni* Brid.; *Cinclidotus riparius* var. *terrestris* Br. et Schpr) — Lac. B; DMb III; Cat I; M; P I n. 1408 β ; Bu; Ov I; P II n. 224.
- Dichelyma capillaceum** (Dill.) Schimp. (*Dichelyma falcatum* Myrin; *Fontinalis capillacea* L.; *Font. falcata* Hedw.) — Meese n. 439.
- Deze opgave is nooit bevestigd; en is herhaald in Gort Belg n. 836; G VII n. 866; FBS n. 82; M; P I.
- Dichodontium pellucidum** (L.) Schimp. (*Bryum pellucidum* L.; *Dicranum pellucidum* Hedw. of Sw.) — Boerh p. 20 n. 15; Gort Belg n. 852; G VII n. 889; FBS n. 135; M; P I n. 1542.
- Tot heden geldt nog, wat BUSE zegt in NKA V p. 396: „Het indigene van deze soort heeft zich tot nu toe nog niet bevestigd”.
- Dicranella cerviculata** (Hedw.) Schimp. (*Dicranum cerviculatum* Hedw.) — FBS n. 138; Dz L I; Lac. B; En IV; Cat I; M; P I n. 1541; NKA III p. 174; Lac. Am; Bu; NKA V p. 395; E; Ov I; NKA X p. 116, 382; Camp II n. 657; P II n. 285; Add; V.S; V.D; K.F; Un 28; S; Un 33; Un 34; Acht; Un 36; Un 38; BN IX; Un 41.
- var. *pusilla* (Hedw.) Schpr — P I n. 1541 β ; NKA V p. 395; P II n. 285 var; K.F.
- Dicranella crispa* Schpr = *Anisothecium vaginale* (Dicks.) Loeske
- Dicranella heteromalla** (L.) Schimp. (*Bryum heteromallum* L.; *Dicranum heteromallum* Hedw.) — Boerh p. 22 n. 43; GZA n. 648; Meese n. 453; Gort Belg n. 854; Zut n. 502; G VII n. 891; Ehrh; FBS n. 133; Dz L I; En II; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 874; P I n. 1540; Trap; Lac. L; NKA V p. 395; Hol n. 1540; NKA VI p. 197, 201; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II

- n. 1038; P II n. 281; Un 25; Uñ 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; S; Un 32; Fr; Un 33; BN II; Un 34; Acht; Un 36; Blok; Un 38; BN VI; Un 39; NKA L p. 233; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; MM; Gr.
 var. *interrupta* (Hedw.) Br. eu. — P I n. 1540 β ; P II n. 281 var.
 var. *sericea* (Schpr) H. Müll. — P II n. 281 var.
- Dicranella rufescens* Schpr = *Anisothecium rufescens* (Dicks.) Lindb.
- Dicranella Schreberi* Schpr = *Anisothecium crispum* (Hedw.) Lindb.
- Dicranella secunda*** (Sw.) Lindb. var. *curvata* Hag. — P I n. 1539 (verkeerde opgave volgens BUSE in NKA V p. 395); P II n. 282; Acht.
- Dicranella varia* Schpr = *Anisothecium rubrum* (Huds.) Lindb.
- Dicranodontium denudatum* (Brid.) Hag. (*Dicranodontium longirostre* Schpr) — Garj. M. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Dicranoweisia Bruntoni* Schpr = *Cynodontium Bruntonii* (Sm.) Br. eu.
- Dicranoweisia cirrata*** (L.) Lindb. (*Weisia cirrhata* Hedw.) — FBS n. 147; Dz L I; Ut n. 93; En II (verkeerde opgave voor *Zygodon*); Lac. B; Cat I; M; P I n. 1549; Lac Am; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1039; P II n. 290; Add; Nat; V.D; K.F; V; BN I; Un 32; Fr; Un 33; BN II; Un 36; Un 38; BN VI; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Gr.
- Dicranum Bonjeani*** de Not. (*D. palustre* Br. et Schpr; ook La Pyl.) — Cat II; M; P I n. 1533; NKA IV p. 244; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; NKA V p. 391; Hol. n. 1533; NKA VI p. 239; E; Ov I; Nijm II n. 1035; P II n. 276; Un 25; V.S; V.D; K.F; V; Un 28; Pol; W; S; Un 34; Nop; Blok; Bar; Na; MM; Gr.
 var. *polycladum* Br. eu. — P I n. 1533 β ; Lac. Am; P II n. 276 var.
 In NKA V p. 392 wijst BUSE op een vorm uit de duinen, uitgegeven in zijn *exsiccata* n. 14, waarbij hij met de hand heeft geschreven: „forma foliis subundulatis” doch die hij beter wil noemen: *Dicranum palustre* var. *scoparioides* Buse.
- Dicranum cerviculatum* Hedw. = *Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp.
- Dicranum congestum* Brid. is een alpenmos: *D. fuscescens* Turn. In DMb I; M; P I; Hol en E is een vorm bedoeld van *D. scoparium*, ook van var. *recurvatum* (Schultz) Brid. *D. congestum* vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V,4, p. 290. Zie vooral NKA V p. 390.
- Dicranum crispum* Hedw. = *Anisothecium vaginale* (Dicks.) Loeske

Dicranum flagellare Hedw. = *Orthodicranum flagellare* (Hedw.) Loeske

Dicranum flexuosum Hedw. = *Campylopus flexuosus* (L.) Brid.

Dicranum fuscescens Turn. uit Camp II n. 655 vindt men in Prod. II terug onder *D. scoparium*. Zie verder bij *D. congestum*.

Dicranum glaucum Hedw. = *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.

Dicranum heteromallum Hedw. = *Dicranella heteromalla* (L.) Schimp.

Dicranum majus Sm. (ook Schwaegr. of Turn.; *D. polysetum* Brid.) — Lac. B; Cat I; Cat II; M; P I n. 1532; Lac. L; NKA V p. 390; Ov I; Nijm II n. 1036; P II n. 277; BN VIII; Bar.

Dicranum majus Turn. var. *Schreberi* Sw. = *Anisothecium crispum* (Hedw.) Lindb.

Dicranum montanum (Hedw.) = *Orthodicranum montanum* (Hedw.) Loeske

Dicranum palustre Brid. = *D. Bonjeani* de Not. wat oudere opgaven betreft. Volgens BUSE in NKA V p. 391 is *D. palustre* Brid. door BRIDEL zelf later met *Ceratodon purpureus* verenigd.

Dicranum palustre La Pyl. (ook B. et Schpr) = *D. Bonjeani* de Not.

Dicranum pellucidum Hedw. (ook Sw.) = *Dichodontium pellucidum* (L.) Schimp.

Dicranum polysetum Brid. = *D. majus* Sm.

Dicranum purpureum Hedw. = *Ceratodon purpureus* (L.) Brid.

Dicranum rufescens Turn. = *Anisothecium rufescens* (Dicks.) Lindb.

Dicranum rugosum Brid. = *D. undulatum* Ehrh.

Dicranum Schraderi Schwaegr. = *D. Bergeri* Bland. (verkeerde opgave bij M).

Dicranum Schreberi of *Schreberianum* Hedw. = *Anisothecium crispum* (Hedw.) Lindb.

Dicranum scoparium (L.) Hedw. (ook Leyss; *Bryum scoparium* L.) — Boerh p. 21 n. 34; Meese n. 451; Gort Belg n. 849; Zut n. 501; G VII n. 886; FBS n. 131; Dz L I; Ut n. 82; En II; Cat I; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 873; Camp I n. 579; P I n. 1530 en n. 1531; Trap; NKA IV p. 237; NKA V p. 73; Hol n. 1530; NKA VI p. 201; E; NKA VII p. 124; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1037; Camp II n. 655 en 656; P II n. 278; Un 26; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; S; Un 32; J.L; Fr; Un 33; BN II; Un 34; NKA XLV p. 267; Un 35; Acht; Un 36; Un 38; BN VI; Un 39; NKA L p. 299; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; Gr.

var. *atratum* Steudel — FBS n. 131 β (welk ex. volgens P II is:

var. *curvulum* Brid.); M.

- var. *curvulum* Brid. — P II n. 278 var.; Un 33.
 fm. *integrifolia* Lindb. — Un 35.
 var. *orthophyllum* Brid. — P I n. 1530 β ; E; Hov II; P II n. 278 var.; V; Un 29; BN VIII.
 var. *paludosum* Schpr — P II n. 278 var.; V.D; S; Un 35.
 var. *recurvatum* (Schultz) Brid. — Nijm II n. 1037 var.; P II n. 278 var.
- Dicranum spurium** Hedw. — Ut n. 87; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1529; NKA III p. 174; Bu; NKA V p. 388; NKA VI p. 197; Hov II; Ov I; P II n. 275; V.D; Un 33; Acht; Un 38; Bar?
- Dicranum subulatum* Hedw. in Cat II = *Dicranella secunda* (Sw.) Lindb. en vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V,4, p. 290 en NKA V p. 395.
- Dicranum undulatum** Ehrh. (ook Turn. of Voit; *Dicranum rugosum* Brid.) — FBS n. 132; Dz L I; Ut n. 83; En II; Lac. B; Cat II; Beek; M; P I n. 1528; Trap; NKA V p. 386; E; Ov I; P II n. 274; Un 26; V.D; K.F; Un 33; Acht; Un 36; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX; Na; Pl.
- Dicranum varium* Hedw. = *Anisothecium rubrum* (Hedw.) Lindb.
- Didymodon cordatus** Jur. — Ov I; P II n. 243; Un 32.
- Didymodon cylindricus* Br. et Schpr = *Trichostomum cylindricum* (Bruch) C. Müll.
- Didymodon flexifolius* Hook. et Tayl. = *Leptodontium flexifolium* (Dicks.) Hampe
- Didymodon homomallus* Hedw. = *Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hampe
- Didymodon luridus** Hornsch. (ook Br. et Sch.) — Cat II; M; P I n. 1523; Lac. Am; NKA V p. 421; Ov I; P II n. 244.
- Didymodon purpureum* Hook. et Tayl. = *Ceratodon purpureus* (L.) Brid.
- Didymodon pusillus* Hedw. = *Ditrichum tortile* (Schrad.) Lindb.
 var. *pusillum* (Hedw.) Limpr.
- Didymodon rubellus** (Hoffm.) Br. eu. (*Weisia curvirostra* Brid.; ook Hedw.; *Anacalypta recurvirostris* Bruch, N. et H; *Trichostomum rubellum* Rabenh.) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat I; Cat II; M; Hov I; P I n. 1522; Lac. Am; Lac. L; E; Ov I; Nijm II n. 1028; P II n. 245; V.D; V (met monstr.); NKA XLVI p. 201; BN VIII; Bar.
- Didymodon tophaceus** (Brid.) Jur. (*Trichostomum tophaceum* Brid.) — M; Ov I; P II n. 241; V.D; Blok; Un 40.
 var. *acutifolia* Schpr — P II n. 241 var.
 var. *brevifolius* (Br. eu.) Limpr. (*Trichostomum limosum* Doz.

- et Molk.) — P I n. 1519; Lac. Am; Hol n. 1519; E; P II n. 241 var.
- var. *humilis* Schimp. — K.F; Un 28; NKA XLVI p. 201.
- Diphyscium foliosum* Mohr (ook Web. et Mohr) = *D. sessile* (Schmid.) Lindb.
- Diphyscium sessile*** (Schmid.) Lindb. (*D. foliosum* Mohr, ook Web. et Mohr) — Cat I; M; P I n. 1409; Bu; Ov I; Nijm II n. 980; P II n. 102; Fr.
- Distichium inclinatum* (Ehrh.) Br. eu. (ook B. et Sch.) vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V,4, p. 290; in NKA V p. 397 zegt hij, dat alles *Ditrichum flexicaule* (Schleich.) Hampe is.
- Ditrichum flexicaule*** (Schleich.) Hampe (*Leptotrichum flexicaule* Hampe) — P I n. 1520; Lac. L; Bu; E; Ov I; P II n. 253; V.D; BN VIII.
- var. *densa* Br. eu. — P II n. 253 var.; V; Bar.
- Ditrichum homomallum*** (Hedw.) Hampe (*Didymodon homomallum* Hedw.; *Leptotrichum homomallum* Schpr; *Trichostomum homomallum* B. et Sch., ook Sw.) — FBS n. 139; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 878; P I n. 1517; NKA VI p. 250; Ov I; P II n. 254; Add; Acht; Un 38; BN IX; Un 41.
- Ditrichum pallidum*** (Schleich.) Hampe (*Leptotrichum pallidum* Hampe; *Trichostomum pallidum* Hedw.) — P I n. 1518; Lac. L; Ov I; Nijm II n. 1018; P II n. 252; Fr.
- Ditrichum tortile*** (Schr.) Lindb. var. ***pusillum*** (Hedw.) Limpr. (*Didymodon pusillus* Hedw.; *Leptotrichum tortile* Hampe var. *pusillus* Schpr; *Trichostomum tortile* Schrad. var. *pusillus* B. et Schpr) — FBS n. 140; M; P I p. 57; NKA V p. 88; NKA VI p. 250; Ov I; P II n. 256; BN VIII.
- Ditrichum vaginans*** (Sull.) Hampe (*Leptotrichum vaginans* Schpr) — NKA VI p. 250; Ov I; P II n. 255.
- Dolichotheca silesiaca*** (Selig.) Fleisch. (*Hypnum silesiacum* P.B., ook Web. et Mohr; *Plagiothecium silesiacum* B. et Sch.) — FBS n. 32; Dz L I; M; Nijm I n. 801; P I n. 1388; Delf n. 518; E; Ov I; P II n. 46; V.D; Acht; BN VIII; Bar.
- Drepanocladus aduncus*** (Hedw.) Moenk. (*Hypnum aduncum* Hedw.) — G VII n. 914; FBS n. 65; Dz L I; Ut n. 38; En III; M; Camp I n. 561; NKA II p. 71; P I n. 1356; Trap; Lac. Am; E; Ov I; P II n. 31; Add; V.D; K.F; Fr; Acht; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; NKA LII; Na; Gr.
- var. *ambiguum* Schrad. uit P I is volgens NKA VI p. 108 en P II: *Drep. intermedius* (Lindb.) Warnst.
- fm. *capillacea* — V.
- var. *Kneiffii* (Schimp.) Warnst. (*Hypnum Kneiffii* Schpr; *Drepa-*

- nocladus Kneiffii) — P I n. 1357 (als var. remotifolium); NKA VI p. 108; Nijm II n. 946; P II n. 31 var.; V.D; Un 28; Un 35.
- var. Kneiffii fm. pseudofluitans (Sanio) Moenk. (Hypnum pseudofluitans v. Klinggr.) — Un 26; K.F; Un 37; Un 39; NKA L p. 242.
- var. polycarpus — Na.
- var. polycarpus tenuis — Un 32.
- var. revolvens Brid. uit FBS n. 65 var. β is volgens P II: Drep. intermedius (Lindb.) Warnst.; var. revolvens uit P I is volgens P II: Drep. Sendtneri (Schimp.) Warnst.
- Drepanocladus exannulatus** (Gümb.) Warnst. (Hypnum exannulatum Gümb.) — Bu; NKA VI p. 108, 250; Ov I; P II n. 26; V.S; V.D; K.F; V; Un 33; Un 38; Un 39; BN VIII.
- var. serratus (Milde) Schimp. — V.S; K.F.
- fm. submersa — K.F.
- Drepanocladus fluitans** (Dill.) Warnst. (Hypnum fluitans L., ook Dill.) — G VII n. 922; FBS n. 66; Dz L I; Dz L II; En II; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 829; Camp I n. 559; P I n. 1357; NKA V p. 76; Lac. Am; E; Hov. II; Ov I; NKA VIII p. 425; Camp II n. 580; P II n. 25; V.S; V.D; W; Fr; Un 33; Un 34; Nop; Un 36; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41.
- var. amphibium — Un 36.
- var. circinnatus — Un 36.
- var. diffusum (Bland.) — P I var.; P II n. 25 var.
- var. falcatus Br. eu. — K.F;
- var. intermedium — Un 36.
- var. orthophyllum (Dozy et Molk.) — P I var.; P II n. 25 var.
- var. plumosum (Dozy et Molk.) — P I var.; E; P II n. 25 var.
- var. polycarpon — P I var.; deze opgaven vindt men in P II bij andere soorten terug.
- var. pseudostramineum C. Müll. (Hypnum pseudostramineum C. Müll.) — P II n. 24.
- var. remotifolium (Dozy et Molk.) = Drep. aduncus var. Kneiffii volgens P II.
- var. scoparium (Brid.) — P I var.; P II n. 25 var.
- var. tenuissimum (Dozy et Molk.) — P I var.; E; Hov II; P II n. 25 var.
- Deze „variëteiten” (trouwens het gehele geslacht Drepanocladus) moeten hoognodig nader onderzocht worden; veel namen vindt men in de tegenwoordige literatuur niet terug, en er zijn ook wel vormen van Drep. exannulatus bij.
- Drepanocladus intermedius** (Lindb.) Warnst. (Hypnum inter-

- medium Lindb.) — FBS n. 65 var β ; M; P I n. 1356 var. γ ; NKA VI p. 108; Ov I; P II n. 29; Add; NKA XII p. 45; Un 33; Nop; BN VIII; Bar; MM; Gr.
- Drepanocladus Kneiffii* = *D. aduncus* var. *Kneiffii* (Schimp.) Warnst.
- Drepanocladus lycopodioides*** (Schwaegr.) Warnst. (*Hypnum lycopodioides* Schwaegr., ook Neck.) — DMb I; Cat II; M; P I n. 1358; NKA V p. 76; Hol n. 1358; E; Ov I; P II n. 27; Add; NKA XII p. 45; V.D; K.F; Acht; Un 39; BN VIII; Bar.
- Drepanocladus revolvens* — Pl (inlandse ex?).
- Drepanocladus Sendtneri*** (Schimp.) Warnst. (*Hypnum Sendtneri* Schpr.) Bu; NKA VI p. 108; E; Ov I; P II n. 28; W; Nop; Un 39; BN VIII.
- fm. *tenuis* — BN VIII.
- Drepanocladus uncinatus*** (Hedw.) Warnst. (*Hypnum uncinatum* Hedw.) — Ut n. 41; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1363; NKA III p. 173; Ov I; P II n. 23; V.S.; K.F; Pol; Un 34; Acht; BN VIII; Bar.
- fm. *plumosa* Schpr. — V.
- Drepanocladus vernicosus*** (Lindb.) Warnst. (*Hypnum vernicosum* Lindb.; *H. pellucidum* Wils.) — Bu; NKA VI p. 108; Ov I; P II n. 30; BN VIII; Bar.
- Encalypta ciliata*** (Hedw.) Hoffm. (*Bryum extincitorium* L. β majus L.). Deze opgave van v. Geuns p. 74 is nooit bevestigd. Verder genoemd in P I n. 1499, maar deze ex. zijn volgens BUSE in NKA IV p. 490 *E. vulgaris* (Hedw.) Hoffm. Zie ook NKA V,4, p. 290.
- Encalypta contorta*** (Wulf.) Lindb. (*E. streptocarpa* Hedw.) — P I n. 1497; NKA IV p. 487; Lac. L; NKA VI p. 22; E; Ov I; P II n. 179; Nat; V.D; Fr; BN VIII.
- Encalypta fimbriata* Brid. Dit is volgens MOLKENBOER de opgave van v. Geuns p. 74; ook volgens P I; maar BUSE wijst er in NKA IV p. 492 op, dat dit een synoniem is van *E. ciliata* (Hedw.) Hoffm.
- Encalypta rhabdocarpa* Schwaegr. Genoemd in P I n. 1498, maar de ex. zijn volgens BUSE in NKA IV p. 488 *E. vulgaris* (Hedw.) Hoffm. Zie ook NKA V,4, p. 290.
- Encalypta streptocarpa* Hedw. = *E. contorta* (Wulf.) Lindb.
- Encalypta vulgaris*** (Hedw.) Hoffm. (ook Hedw.; *Bryum extincitorium* L.) — Boerh p. 21 n. 32; Gort Belg n. 845; G VII n. 882; FBS n. 150; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 886; P I n. 1500; NKA IV p. 490; Lac. L; Ov I; P II n. 180; Fr.
- var. β *mutica* Rabenh. in P I behoort tot de hoofdsoort. Zie de opmerking in Limpricht II p. 110.

- Entodon orthocarpus** (La Pyl.) Lindb. (*Cylindrothecium concinnum* Schpr) — Lac. L.; Ov I; P II n. 82.
- Entosthodon ericetorum* Schpr (ook C. Müll.) = *Funaria obtusa* (Dicks.) Lindb.
- Entosthodon fascicularis* Müll. = *Funaria fascicularis* (Dicks.) Schimp.
- Ephemerella recurvifolia* Schpr = *Ephemerum recurvifolium* (Dicks.) Boul.
- Ephemerum cohaerens*** (Hedw.) Hampe (*Phascum cohaerens* Hedw.) — M; P I n. 1584; Ov I; P II n. 306.
- Ephemerum pachycarpon* Hampe = *E. recurvifolium* (Dicks.) Boul.
- Ephemerum recurvifolium*** (Dicks.) Boul. (*Phascum pachycarpon* Schwaegr; *Ephemerum pachycarpon* Hampe; *Ephemerella recurvifolia* Schpr) — En II; Cat II; M; P I n. 1583; Ov I; P II n. 304.
- Ephemerum serratum*** (Schreb.) Hampe (*Phascum serratum* Schreb.) — Dz L II; M; P I n. 1585; Ov I; P II n. 307; Acht.
- Eurhynchium abbreviatum* Schpr = *E. Schleicheri* (Hedw.f.) Lor.
- Eurhynchium androgynum* Sch. = *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst.
- Eurhynchium confertum* B. et Sch. = *Rhynchostegium confertum* (Dicks.) Br. eu.
- Eurhynchium crassinervium* Schpr = *Cirriphyllum crassinervium* (Tayl.) Loeske et Fleisch.
- Eurhynchium megapolitanum* B. et Sch. = *Rhynchostegium megapolitanum* (Bland.) Br. eu.
- Eurhynchium murale* B. et Sch. = *Rhynchostegium murale* (Neck.) Br. eu.
- Eurhynchium myosuroides* Schpr = *Isothecium myosuroides* (Dill., L.) Brid.
- Eurhynchium piliferum* Schpr (ook B. et Sch.) = *Cirriphyllum piliferum* (Schreb.) Grout
- Eurhynchium praelongum* Schpr (ook B. et Sch.) = *Oxyrrhynchium praelongum* (Hedw.) Warnst.
- Eurhynchium pumilum* Schpr = *Oxyrrhynchium pumilum* (Wils.) Broth.
- Eurhynchium rusciforme* B. et Sch. = *Platyhypnidium rusciforme* (Neck.) Fleisch.
- Eurhynchium Schleicheri*** (Hedw.f.) Lor. (ook Milde; *E. abbreviatum* Schpr) — NKA VI p. 310; Ov I; P II n. 61.
- Eurhynchium speciosum* Schpr = *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst.
- Eurhynchium Stokesii*** (Turn.) Br. eu. (ook *Stokesii* B. et Sch.)

- of Schpr; *Hypnum Stokesii* Turn.; *Hypnum praelongum* L. var. *Stokesii* Turn.) — Meese n. 461; Gort Belg n. 870; Zut n. 510; G VII n. 910; FBS n. 57; Dz L I; Ut n. 34; En II; DMb I (de eerste aparte vermelding als *Hypnum Stokesii* Turn.); En IV; Beek; M; P I n. 1368; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1369; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 597; P II n. 59; Add; Un 25; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; Un 32; J.L; BN II; Un 35; Un 36; Blok; Un 37; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; MM; Gr.
var. *fontanum* Buse — Bu; BN II.
fm. *propria* — K.F.
- Eurhynchium striatum** (Schreb.) Schimp. (*Hypnum striatum* Schreb.; *H. longirostrum* Brid., ook Ehrh.) — Boerh p. 20 n. 4; Geer n. 95; FBS n. 46; Dz L I; En II; Cat II; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 814; Camp I n. 552; P I n. 1350; NKA III p. 173; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 966; Camp II n. 594; P II n. 66; Add; V.D; V.Z; V; J.L; Fr; BN II; Acht; Un 36; NKA L p. 293; BN VIII; Bar; Pl.
- Eurhynchium tenellum* B. et Sch. = *Rhynchostegiella algeriana* (Brid.) Broth.
- Eurynchium* = *Eurhynchium*.
- Fissidens adianthoides** (L.) Hedw. (*Hypnum adiantoides* L.) — G VII n. 902; FBS n. 144; Dz L I; Ut n. 90; En II; Lac. B; Cat I; Beek; As; M; Hov I; Nijm I n. 881; P I n. 1565; NKA V p. 76; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1565; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1031; P II n. 259; Add; Un 26; V.D; K.F; V; S; Fr; NKA L p. 300; BN VIII; Bar.
var. *marginatus* Brid. — P I n. 1565 β , in P II tot de hoofdsoort teruggebracht; Hov II.
- Fissidens bryoides** (L.) Hedw. (*Hypnum bryoides* L.) — G VII n. 901; FBS n. 141; Dz L I; Ut n. 88; En II; Cat I; M; Nijm I n. 879; NKA II p. 72; P I n. 1567; Lac. L; Ov I; Nijm II n. 1033; P II n. 268; Add; Nat; V.Z; K.F; Un 28; Un 32; Fr; Acht; Un 36; BN VIII; BN IX; Gr.
var. *gymnandrus* (Buse) Ruthe (*Fissidens gymnandrus* Buse) — NKA V, 4, p. 286; Bu; Ov I; P II n. 263.
- Fissidens crassipes** Wils. — P I n. 1569; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 653; P II n. 264; Un 32.
- Fissidens cristatus** Wils. (*F. decipiens* de Not.) — NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 261; Fr.
- Fissidens decipicus* de Not. in Garj. M is een drukfout voor *decipiens*.
- Fissidens decipiens* de Not. = *F. cristatus* Wils.

Fissidens exilis Hedw. — Lac. Am; Ov I; P II n. 267 (alle verkeerde opgaven); BN VIII.

Fissidens gymnandrus Buse = *F. bryoides* var. *gymnandrus* (Buse) Ruthe

Fissidens incurvus Stark (ook Schwaegr.) — DMb I; En III; Cat I; M; P I 1568 (volgens P II is dit *F. pusillus* Wils.); Ov I; P II n. 266; Nat; V.D; Acht.

Volgens P I behoren DMb I en En III, dus ook Cat I en M, tot *F. bryoides*.

Fissidens osmundioides (Sw.) Hedw. (ook Hedw.) — FBS n. 142; M; NKA II p. 72 (verklaart FBS voor *F. bryoides*); NKA V, 2, p. 292; Bu; Ov I; P II n. 262.

Fissidens pusillus Wils. — NKA VI p. 106; Ov I; P II n. 265; Nat.

Fissidens taxifolius (L.) Hedw. (ook Wils.; *Hypnum taxifolium* L.) — Meese n. 457; Gort Belg n. 862; Zut n. 505; G VII n. 899; Mul p. 104; FBS n. 143; Dz L I; Ut n. 89; En II; Cat I; M; Nijm I n. 880; P I n. 1566; Trap; Lac. Am; Delf n. 485; Ov I; NKA X p. 382, 531; Nijm II n. 1032; Camp II n. 654; P II n. 260; Nat; V.D; V.Z; K.F; Un 32; Fr; Acht; Un 36; Un 37; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Gr.

Fontinalis antipyretica L. (*F. laxa* Milde) — Meese n. 437; Gort Belg n. 834; G VII n. 864; Mul p. 102; FBS n. 80; Dz L I; Ut n. 50; En II; DMb I; Cat II; Beek; M; Nijm I n. 840; Camp I n. 562; P I n. 1407; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 107; E; NKA VII p. 95; Hov II; Ov I; Nijm II n. 975; Camp II n. 608; P II n. 99 en n. 100; Add; V.D; V.Z; K.F; Un 32; Un 34; NKA XLV p. 267; Un 36; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; NKA LII; Na.

Fontinalis capillacea L. = *Dichelyma capillaceum* (Dill.) Schimp.

Fontinalis falcata Hedw. = *Dichelyma capillaceum* (Dill.) Schimp.

Fontinalis gracilis Lindb. — NKA VI p. 22 (reeds op p. 108 hersteld als een slanke vorm van *F. antipyretica*); voorts vermeld in het Breda-nummer van *Natura* (nr 355, 1928) door H. J. Thielier voor Terheiden (N.Br.); maar een ex. van hem ontvangen (in herb. J. et W.) is door MOENKEMEYER gedetermineerd als *Canpylium polygamum* var. *submersum*.

Fontinalis Kindbergii (Ren. et Card.) = BN II.

Fontinalis laxa Milde = *F. antipyretica* L.

Fontinalis squamosa L. — Meese n. 438. Deze opgave is nooit bevestigd en wordt aangehaald: Gort Belg n. 835; G VII n. 865; FBS n. 81; M; P I.

Funaria fascicularis (Dicks.) Schimp. (*Gymnostomum fasciculare* Brid.; *Physcomitrium fasciculare* B. et Sch.; *Entosthodon fascicu-*

laris Müll.) — Wtt; En II; DMb I; M; P I n. 1562; Lac. Am; Lac. L; Ov I; P II n. 172; Fr.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. (ook Hedw. of Schreb.; Mnum hygrometricum L.) — Comm p. 91; Boerh p. 21 n. 37 (mist het teken voor inlands) en p. 22 n. 41; Meese n. 441; Gort Belg n. 838; Zut n. 497; G VII n. 869; Mul p. 102; FBS n. 86; Dz L. I; Ut n. 52; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 843; Camp I n. 567; P I n. 1564; Trap; NKA IV p. 237; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 499; Hol n. 1564; NKA VI p. 197, 202; E; Hov II; Ov I; NKA X p. 382; Nijm II n. 1005; Camp II n. 629; P II n. 171; Add; NKA XII p. 45; Un 25; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; NKA XXXVIII p. 163; Un 28; W; NKA XLIII p. 386; Un 32; Fr; Un 33; BN II; NKA XLV p. 267; NKA XLVI p. 201; Acht; Un 36; Blok; Un 39; NKA L p. 260; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; MM; Gr.

var. *calvescens* (Schwaegr.) Br. eu. — P I n. 1564γ.

var. *patula* Br. eu. — P I n. 1564β; E; Hov II; P II n. 171 var.

Funaria obtusa (Dicks.) Lindb. (*Physcomitrium ericetorum* de Not.; *Entosthodon ericetorum* Schpr of C.M.) — Cat I; M; P I n. 1563; Bu; Ov I; P II n. 173.

Georgia Mnemosynum Ehrh. = *G. pellucida* (L.) Rabenh.

Georgia pellucida (L.) Rabenh. (*G. Mnemosynum* Ehrh.; *Tetraphis pellucida* Hedw.) — FBS n. 151; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1422; NKA IV p. 474; Ov I; Nijm II n. 989; P II n. 178; K.F; Fr; Un 33; Acht; Un 39; BN VIII; BN IX.

Grimmia apocarpa (L.) Hedw. (*Bryum apocarpum* L.; *Schistidium apocarpum* B. et Sch.) — Meese n. 445; Gort Belg n. 842; G VII n. 878; Mul p. 103; FBS n. 148; Ut n. 94; Lac B; En III; Cat I; M; Nijm I n. 884; NKA II p. 72; P I n. 1474; Lac. Am; Ov I; P II n. 213; V.Z; K.F; Un 32; Fr; Un 34; BN VIII; Bar; BN IX; Gr.

var. *gracilis* Web. et Mohr = *Grimmia gracilis* Schleich. (volgens Loeske, Monogr. 1930: *Schistidium apocarpum* (L.) Br. eu. ssp. *gracile* (Schwaegr.) Loeske).

var. *rivularis* Web. et Mohr (ook B. et Sch.) — Dz L II; Lac. B. Cat. I; M; P I n. 1474γ; Lac. Am; Nijm II n. 1017; P II n. 213 var.; Fr.

Volgens LIMPRICHT behoort var. *rivularis* Web. et Mohr bij *Schistidium alpicola* (Sw.) Limpr. als var. *rivulare* (Brid.) Wahlenb.; maar LOESKE noemt behalve deze ook *Schistidium apocarpum* ssp. *vulgare* (Chal.) Loeske var. *rivulare* Warnst., waartoe onze ex. wel zullen behoren.

Grimmia commutata Hüb. (= *G. ovata* Web. et Mohr) staat bij M

in de tweede kolom, dus berust op een of andere opgave na FBS; ons is niet bekend welke.

Grimmia conferta Funck — NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 214.

Grimmia crinita Brid. — P I n. 1473; Ov I; P II n. 212; Fr.

Grimmia gracilis Schleich. — Cat II; M; P I n. 1474β; Lac. Am; P II n. 213 var. Zie bij G. apocarpa.

Grimmia orbicularis Bruch — NKA VI p. 309; Ov I; P II n. 211; BN I.

Grimmia pulvinata (L.) Sm. (ook H. et Tayl.; Bryum pulvinatum L.) — Comm p. 91 (volgens de Gorter; volgens ons zeer dubieus); Boerh p. 21 n. 39; p. 22 n. 48; GZ n. 573; Gort Belg n. 859; Zut n. 504; G VII n. 896; FBS n. 149; Dz L I; Ut n. 95; En II; Cat I; M; Nijm I n. 885; Camp I n. 587; P I n. 1472; Trap; Lac. Am; Delf n. 494; Hol n. 1472; NKA VI p. 201; E; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1016; Camp II n. 640; P II n. 210; Un 26; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; Un 32; Fr; Un 33; BN II; Un 35; Un 36; Blok; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; Un 41; Gr.

var. *viridis* Schpr — P II n. 210 var.

Grimmia rivularis Brid. = *G. apocarpa* (L.) Hedw. var. *rivularis* Web. et Mohr

Grimmia trichophylla Grev. — NKA VI p. 309; Ov I; P II n. 209; BN I; BN II; Un 38; BN VI; BN IX.

Grimmia tristicha Schw. = *Seligera tristicha* B. et Sch.

Gymnocybe palustris Fr. = *Aulacomnium palustre* (L.) Schwaegr.

Gymnostomum affine N. et Hornsch. = *Pottia Heimii* (Hedw.) Br. eu.

Gymnostomum calcareum Br. germ. — Ov I; P II n. 292.

Gymnostomum calcareum N. et H. in NKA V p. 311 is *Gyroweisia tenuis* (Schrad.) Schimp.; in Ov I en P II *G. calcareum* Br. germ.

Gymnostomum conicum Schw. in Dz L II en En II is volgens P I: *Pottia minutula* B. et Sch. var. *conica* Rabenh.; staat in P II onder *Pottia minutula* B. et Sch., waarvan LIMPRICHT een var. *conica* (Schleich.) Br. eu. noemt uit Z.-Europa.

Gymnostomum fasciculare Brid. = *Funaria fascicularis* (Dicks.) Schimp.

Gymnostomum Heimii Hedw. = *Pottia Heimii* (Hedw.) Br. eu.

Gymnostomum intermedium Turn. = *Pottia intermedia* (Turn.) Fürnr.

Gymnostomum minutulum Schwgr. = *Pottia rufescens* (Schultz) Warnst.

Gymnostomum ovatum Hedw. = *Pterygoneurum cavifolium* (Ehrh.) Jur.

- Gymnostomum pyriforme* Hedw. = *Physcomitrium pyriforme* (L.) Brid.
- Gymnostomum tenue* Schrad. = *Gyroweisia tenuis* (Schrad.) Schimp.
- Gymnostomum truncatulum* D.C. = *Pottia truncatula* (L.) Lindb.
- Gymnostomum truncatum* Hedw. = *Pottia truncatula* (L.) Lindb.
- Gyroweisia tenuis*** (Schrad.) Schimp. (*Gymnostomum tenue* Schrad.) — Lac. L; Bu; NKA VI p. 22; Ov I; P II n. 293.
- Hedwigia albicans*** (Web.) Lindb. (*H. ciliata* Hedw. of Ehrh.; *Schistidium ciliatum* Brid.) — FBS n. 153; M; P I n. 1475; NKA V p. 88; Ov I; P II n. 203; Add; BN I; Fr; BN II; Un 38; BN VI; BN VIII; BN IX.
- Helodium lanatum*** (Stroem.) Broth. (*Thuidium Blandowii* B. et Sch.) — NKA V p. 88; Ov I; P II n. 84.
- Heterophyllum Haldanianum*** (Grev.) Kindb. (*Hypnum Haldani* Grev.; *H. Haldanianum* Grev.) — NKA V, 4, p. 285; Bu; Ov I; P II n. 16.
- Homalia trichomanoides*** (Schreb.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum trichomanoides* Schreb.; *Leskia trichomanoides* Schreb. of Hedw. of Leyss; *Leskea trichomanoides* Leyss; *Omalia trichomanoides* B. et Sch.) — Geer n. 90; FBS n. 69; Dz L I; Dz L II; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 832; Camp I n. 536; P I n. 1400; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 973; Camp II n. 606; P II n. 93; V.D; V.Z; Fr; BN VIII; Bar; BN IX.
- Homalothecium sericeum*** (L.) Br. eu. (ook B. et Sch.; *Hypnum sericeum* L.; *Leskia* of *Leskea sericea* Hedw.) — GZA n. 653; Meese n. 464; Gort Belg n. 879; Zut n. 513; G VII n. 924; Mul p. 104; FBS n. 70; Dz L I; Ut n. 44; En II; Cat I; M; Nijm I n. 833; Camp I n. 537; P I n. 1391; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 510; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 970; Camp II n. 603; P II n. 79; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Un 32; Fr; BN II; Un 35; Blok; Un 37; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Gr.
- Hookeria lucens*** (L.) Sm. (*Pterygophyllum lucens* Brid.) — P I n. 1396; NKA IV p. 185; Ov I; Nijm II n. 967; P II n. 90; Fr.
- Hygroamblystegium fallax* (Brid.) = *Hygroamblystegium irriguum* (Wils.) Loeske
- Hygroamblystegium fluviatile*** (Sw.) Loeske (*Hypnum fluviatile* Sw.; *Amblystegium fluviatile* Br. et Sch.) — Lac. B; Cat II; M; P I n. 1342; Delf n. 522; NKA VI p. 310; E; Ov I; P II n. 40; Un 32.
- Hygroamblystegium irriguum*** (Wils.) Loeske (*H. fa* :

- Amblystegium irriguum* Wils. of Schpr) — Lac. Am (verkeerde opgave); Delf n. 520 (verkeerd?); NKA VI p. 310; Ov I; P II n. 41; Pol.
 var. *spinifolium* (Schpr) Moenk. (*Amblystegium fallax* Milde) — NKA VI p. 310; P II n. 41; Nat.
- Hygrohypnum elodes* = *Campylium helodes* (Spruce) Broth.
- Hygrohypnum palustre*** (Huds.) Loeske (*Hypnum palustre* L.; *Limnobium palustre* Schpr) — G VII n. 917; FBS n. 64; Dz L II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1365; Lac. Am; Lac. L; E; Ov I; P II n. 13; Un 32; Un 36.
 var. *julacea* (Br. eu.) — P II n. 13 var.
- Hygrohypnum stellatum* = *Campylium stellatum* (Schreb.) Lang. et C. Jens.
- Hylocomium brevirostre* Schpr = *Loeskeobryum brevirostre* (Ehrh.) Fleisch.
- Hylocomium loreum* Schpr = *Rhytidiadelphus loreus* (Dill., L.) Warnst.
- Hylocomium proliferum*** (L.) Lindb. (*Hypnum proliferum* L.; *Hypn. parietinum* L.; *Hypn. splendens* Hedw. of Br. et Sch.; *Hylocomium splendens* Schpr) — GZ n. 576; Gort Belg n. 869; G VII n. 909; Ehrh; Geer n. 94; FBS n. 59; Dz L I; Ut 36; En II; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 825; Camp I n. 546; P I n. 1337; Trap; NKA III p. 173; NKA IV p. 492; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1337; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 939; Camp II n. 577; P II n. 5; Add; Un 26; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; Fr; Un 33; BN II; Un 35; Acht; Un 36; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX.
- Hylocomium splendens* Schpr = *Hyl. proliferum* (L.) Lindb.
- Hylocomium squarrosum* Schpr = *Rhytidiadelphus squarrosus* (L.) Warnst.
- Hylocomium triquetrum* Schpr = *Rhytidiadelphus triquetrus* (L.) Warnst.
- Hymenostomum microstomum*** (Hedw.) R.Br. — M; P I n. 1551; Ov I; P II n. 295; BN VIII.
- Hymenostomum rutilans* Nees = *Weisia rutilans* (Hedw.) Lindb.
- Hymenostomum tortile*** (Schwaegr.) Br. eu. — NKA VI p. 309; NKA VIII p. 101; Ov I; P II n. 294.
- Hypnum abietinum* L. = *Abietinella abietina* (Dill., L.) C. Müll.
- Hypnum adiantoides* L. = *Fissidens adianthoides* (L.) Hedw.
- Hypnum aduncum* Hedw. = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Moenk.
- Hypnum albicans* Neck. (ook L.) = *Brachythecium albicans* (Neck.) Br. eu.

- Hypnum Algirianum* Desf. = *Rhynchostegium algeriana* (Brid.) Broth.
- Hypnum alopecurum* L. = *Thamnium alopecurum* (L.) Br. eu.
- Hypnum arcuatum* Lindb. = *Breidleria arcuata* (Lindb.) Loeske
- Hypnum brevirostrum* Ehrh. = *Loeskeobryum brevirostre* (Ehrh.) Fleisch.
- Hypnum bryoides* L. = *Fissidens bryoides* (L.) Hedw.
- Hypnum caespitosum* Wils. = *Scleropodium caespitosum* (Wils.) Br. eu.
- Hypnum chrysophyllum* Brid. = *Campylium chrysophyllum* (Brid.) Bryhn
- Hypnum commutatum* Hedw. = *Cratoneurum glaucum* (Lam.) C. Jens.
- Hypnum complanatum* L. = *Neckera complanata* (L.) Hüben.
- Hypnum compressum* Schreb. = *Pleurozium Schreberi* (Willd.) Mitt.
- Hypnum confertum* Dicks. (ook Hedw.) = *Rhynchostegium confertum* (Dicks.) Br. eu.
- Hypnum cordifolium* Hedw. (ook L.) = *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.
- Hypnum crassinervium* Wils. = *Cirriphyllum crassinervium* (Tayl.) Loeske et Fleisch.
- Hypnum crispum* L. = *Neckera crispa* (L.) Hedw.
- Hypnum Crista-castrensis* L. = *Ptilium crista-castrensis* (L.) de Not.; maar bij de GORTER *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.
- Hypnum cupressiforme* L.** — Boerh p. 20 n. 7, p. 22 n. 45 (mist het teken voor inlands); Gort Belg n. 873; Zut n. 511; G VII n. 913; Ehrh; Mul p. 104; FBS n. 63; Wtt; Dz L I; Ut n. 37; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 828; Camp I n. 558; P I n. 1364; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Delf. n. 525 (abus. 325); Hol n. 1364; NKA VI p. 197, 202; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 944; Camp II n. 581; P II n. 18; Add; Un 26; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; BN I; Un 28; W; S; Un 32; J.L; Fr; Un 33; BN II; Un 34; NKA XLV p. 268; Un 35; Acht; Un 36; Un 37; Un 38; BN VI; Un 39; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; MM; Gr.
- var. *brevisetum* Schpr — P II n. 18 var.; K.F; W; BN VIII; Bar.
- var. *chrysocomum* Brid. = var. *ericetorum* Br. eu. volgens P I.
- var. *elatum* Br. eu. — P I var.; Nijm II n. 944 var.; P II n. 18 var.; Un 29; K.M; Un 35; Un 37; Bar; Pl.
- var. *ericetorum* Br. eu. — FBS n. 63β; M; P I n. 1364 var.; Nijm II n. 944 var.; P II n. 18 var.; Add; K.F; Un 35; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; Gr.

- var. *filiforme* Brid. (ook Schpr) — FBS n. 637; Beek; M; NKA II p. 71; P I n. 1364 var.; Nijm II n. 944 var.; P II n. 18 var.; Add; Un 25; K.F; Fr; BN VIII; Bar; MM; Gr.
- var. *lacunosum* Brid. = var. *elatum* Br. eu.
- var. *longirostre* Schpr — P II n. 18 var.; Bar.
- var. *pinnatum* Warnst. — Un 35.
- var. *resupinatum* (Wills.) Schpr (*Hypnum resupinatum* Wils.) — NKA VI p. 107; P II n. 18 var.; K.F; Bar.
- var. *tectorum* Br. eu. (ook Brid.) — P I n. 1364 var.; Delf. n. 526; P II n. 18 var.; Un 25; K.F; Un 28; Un 32; Un 35; Un 38; BN VIII; Bar.
- var. *turfosum* Dozy et Molk. = *Hypnum imponens* Hedw.
- var. *uncinatum* Schpr — P II n. 18 var.; K.F; Un 35.
- var. *uncinatum* — Bar; MM; Gr (wel schrijffout voor *uncinatum*).
- Hypnum curtipendulum* L. = *Antitrichia curtipendula* (Hedw.) Brid.
- Hypnum curvatum* Sw. = *Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb.
- Hypnum cuspidatum* L. = *Calliergonella cuspidata* (L.) Loeske
- Hypnum cypressiforme* L. = *H. cupressiforme* L.
- Hypnum delicatulum* L. — Bij Ehrh. en van Geuns zal wel *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Br. eu. bedoeld zijn; FBS brengt deze naam tot *Thuidium recognitum* (L., Hedw.) Lindb.
- Hypnum dendroides* L. = *Climacium dendroides* (Dill., L.) Web. et Mohr
- Hypnum denticulatum* L. (ook Hedw.) = *Plagiothecium denticulatum* (L.) Br. eu.
- Hypnum elegans* Hook. = *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb.
- Hypnum elodes* Spruce = *Campyllum helodes* (Spruce) Broth.
- Hypnum exannulatum* Güm. = *Drepanocladus exannulatus* (Güm.) Warnst.
- Hypnum filicinum* L. = *Cratoneurum filicinum* (L.) Roth
- Hypnum filifolium* L. — Zo beschouwt van Geuns n. 75 de opgave Boerh p. 22 n. 42. Zie aldaar. *H. filifolium* L. is volgens FBS: *Pylaisia polyantha* (Schreb.) Br. eu.
- Hypnum fluitans* L. (ook Dill.) = *Drepanocladus fluitans* (Dill.) Warnst.
- Hypnum fluviatile* Sw. = *Hygroamblystegium fluviatile* (Sw.) Loeske
- Hypnum fluviatile* Prod. I = *Hygroamblystegium irriguum* (Wils.) Loeske
- Hypnum giganteum* Schpr = *Calliergon giganteum* (Schimp.) Kindb.

- Hypnum glareosum* B. et Sch. = *Brachythecium glareosum* (Bruch) Br. eu.
Hypnum Haldani of *Haldanianum* Grev. = *Heterophyllum Haldanianum* (Grev.) Kindb.
Hypnum hygrophilum Jur. = *Campylium hygrophilum* Jur.
Hypnum imponens Hedw. (*H. cupressiforme* var. *turfosum* Dozy et Molk.) — P I n. 1364 var.; Bu; Ov I; P II n. 19; Un 38; Bar; Pl.
Hypnum incurvatum Schrad. — BN II.
Hypnum intermedium Lindb. = *Drepanocladus intermedius* (Lindb.) Warnst.
Hypnum intertextum Voit = *Rhynchostegium rotundifolium* (Scop.) Br. eu. Deze opgave van Cat I en M is nooit bevestigd.
Hypnum intricatum Schreb. = *Brachythecium velutinum* (L.) Br. eu. var. *intricatum* (Hedw.) Br. eu.
Hypnum inundatum Dicks. = *Leskea polycarpa* Ehrh. var. *paludosa* (Hedw.) Schimp.
Hypnum Kneiffii Schpr = *Drepanocladus aduncus* var. *Kneiffii* (Schpr) Warnst.
Hypnum Lacostei Buse = *Breidleria arcuata* (Lindb.) Loeske
Hypnum longirostre Ehrh. (... um Brid.) = *Eurhynchium striatum* (Schreb.) Schimp.
Hypnum loreum L. = *Rhytidiadelphus loreus* (Dill., L.) Warnst.
Hypnum lutescens Huds. (ook Dill.) = *Camptothecium lutescens* (Huds.) Br. eu.
Hypnum lycopodioides Schwaegr. (ook Neck.) = *Drepanocladus lycopodioides* (Schwaegr.) Warnst.
Hypnum medium Dicks. = *Leskea polycarpa* Ehrh.
Hypnum megapolitanum Bland. = *Rhynchostegium megapolitanum* (Bland.) Br. eu.
Hypnum molluscum Hedw. = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.
Hypnum murale Hedw. (ook Neck.) = *Rhynchostegium murale* (Neck.) Br. eu.
Hypnum muticum v. Geuns = *Pleurozium Schreberi* (Willd.) Mitt. blijkens de synoniemen bij v. Geuns en Braithwaite (III p. 141).
Hypnum myosuroides L. (ook Schreb.) = *Isothecium myosuroides* (Dill., L.) Brid.
Hypnum myurum Poll. = *Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb.
Hypnum nitens Schreb. = *Tomenthypnum nitens* (Schreb.) Loeske
Hypnum palustre L. = *Hygrohypnum palustre* (Huds.) Loeske
Hypnum parietinum L. = *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb. of *Pleurozium Schreberi* (Willd.) Mitt.
Hypnum Patientiae Lindb. = *Breidleria arcuata* (Lindb.) Loeske

- Hypnum pellucidum* Wils. = *Drepanocladus vernicosus* (Lindb.) Warnst.
- Hypnum piliferum* Schreb. = *Cirriphyllum piliferum* (Schreb.) Grout
- Hypnum plumosum* L. (ook var. *pseudoplumosum* Brid.) = *Brachythecium plumosum* (Sw.) Br. eu.
- Hypnum polyanthum* Schreb. = *Pylaisia polyantha* (Schreb.) Br. eu.
- Hypnum polygamum* Schpr (ook Sch. et Gumb.) = *Campylium polygamum* (Br. eu.) Bryhn
- Hypnum populeum* Hedw. (ook Sw.) = *Brachythecium populeum* (Hedw.) Br. eu.
- Hypnum praelongum* L. = *Oxyrrhynchium praelongum* (Hedw.) Warnst. Bij de Gorter, FBS en Dz L I is het *Eurhynchium Stokesii* (Turn.) Br. eu.; evenals β *atrovirens* in FBS en P I; in En II is het zowel *Oxyrrh. praelongum* als *Eurh. Stokesii* blijkens de toevoeging: (Polymorphum).
- Hypnum praelongum* L. var. *Stokesii* Turn. = *Eurhynchium Stokesii* (Turn.) Br. eu.
- Hypnum proliferum* L. = *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb.; maar bij de Gorter is het *Thuidium tamariscinum*.
- Hypnum pseudofluitans* v. Klinggr. = *Drepanocladus aduncus* var. *Kneiffii* fm. *pseudofluitans* (Sanio) Moenk.
- Hypnum pseudostramineum* C. Müll. = *Drepanocladus fluitans* (Dill.) Warnst. var. *pseudostraminea* C. Müll.
- Hypnum purum* L. = *Pseudoscleropodium purum* (L.) Fleisch.
- Hypnum resupinatum* Wils. = *H. cupressiforme* var. *resupinatum* (Wils.) Schpr.
- Hypnum riparioides* Hedw. = *Platyhypnidium rusciforme* (Neck.) Fleisch.
- Hypnum riparium* (L.) = *Leptodictyum riparium* (L.) Warnst.
- Hypnum riparium* var. *homomallum* Dozy et Molk. is ons onbekend.
- Hypnum riparium* var. *pseudostellatum* Dozy et Molk. = *Campylium polygamum* (Br. eu.) Bryhn. Zie NKA IV p. 241.
- Hypnum riparium* var. *trichopodium* Schultz = *Leptodictyum trichopodium* (Schultz) Warnst.
- Hypnum rivulare* B. et Sch. (ook Brid.) = *Brachythecium rivulare* Br. eu.
- Hypnum rugosum* Ehrh. = *Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb.
- Hypnum ruscifolium* Neck. = *Platyhypnidium rusciforme* (Neck.) Fleisch.
- Hypnum rusciforme* Weis = *Platyhypnidium rusciforme* (Neck.) Fleisch.

- Hypnum rutabulum* L. = *Brachythecium rutabulum* (L.) Br. eu.
Hypnum salebrosum Hoffm. = *Brachythecium salebrosum* (Hoffm.) Br. eu.
Hypnum Schreberi Willd. = *Pleurozium Schreberi* (Willd.) Mitt.
Hypnum scorpioides L. = *Scorpidium scorpioides* (L.) Limpr.
Hypnum Sendtneri Schpr = *Drepanocladus Sendtneri* (Schimp.) Warnst.
Hypnum sericeum L. = *Homalothecium sericeum* (L.) Br. eu.
Hypnum serpens L. = *Amblystegium serpens* (L.) Br. eu.
Hypnum silesiacum P. de Beauv. ook Web. et Mohr = *Dolichotheca silesiaca* (Selig.) Fleisch.
Hypnum Sommerfeltii Myrin = *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt. var. *Sommerfeltii* (Myr.) Lindb.
Hypnum splendens Hedw. (ook B. et Sch.) = *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb.
Hypnum squarrosus L. = *Rhytidiadelphus squarrosus* (L.) Warnst. Bij de Gorter ten dele ook Rhyt. loreus (Dill., L.) Warnst.
Hypnum stellatum Schreb. = *Campylium stellatum* (Schreb.) Lang. et C. Jens.
Hypnum stellatum var. *protensum* Rabenh. = *Campylium protensum* (Brid.) Broth.
Hypnum stellatum var. *tenellum* C. Müll. = *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt. var. *Sommerfeltii* (Myr.) Lindb.
Hypnum Stokesii Turn. = *Eurhynchium Stokesii* (Turn.) Br. eu.
Hypnum stramineum Dicks. = *Calliergon stramineum* (Dicks.) Kindb.
Hypnum striatum Schreb. = *Eurhynchium striatum* (Schreb.) Schimp.
Hypnum subtile Hoffm. = *Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske
Hypnum sylvaticum L. = *Plagiothecium sylvaticum* (Huds.) Br. eu.
Hypnum tamariscinum Hedw. = *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Br. eu.
Hypnum tamariscinum var. *recognitum* Hedw. = *Thuidium recognitum* (L., Hedw.) Lindb.
Hypnum taxifolium L. = *Fissidens taxifolius* (L.) Hedw.
Hypnum tenellum Dicks. = *Rhynchostegiella algeriana* (Brid.) Broth.
Hypnum tenellum β *rigidulum* Dozy et Molk. = *Rhynchostegiella curviseta* (Brid.) Lindb.
Hypnum trichomanoides Schreb. = *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Br. eu.
Hypnum triquetrum L. = *Rhytidiadelphus triquetrus* (L.) Warnst.
Hypnum uncinatum Hedw. = *Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst.

Hypnum undulatum L. = *Plagiothecium undulatum* (L.) Br. eu.
Hypnum velutinum L. = *Brachythecium velutinum* (L.) Br. eu.
Hypnum vernicosum Lindb. = *Drepanocladus vernicosus* (Lindb.)
 Warnst.

Hypnum viticulosum L. = *Anomodon viticulosus* (L.) Hook. et
 Tayl.

Hypnum viviparum Neck. = *Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb.

Hypopterygium ceylanicum Mitt. — BN VIII.

Isopterygium elegans (Hook.) Lindb. (*Hypnum elegans* Hook.;
Plagiothecium elegans Schpr) — NKA VI p. 22; 250; Ov. I;
 Nijm II n. 963; P II n. 50; K.F; Acht; Un 39; Un 41.

Isothecium myosuroides (Dill., L.) Brid. (*Hypnum myosuroides*
 L., ook Schreb.; *Eurhynchium myosuroides* Schpr) — Meese
 n. 467; Gort Belg n. 882; G VII n. 927; FBS n. 41; Dz L I;
 En III; Cat II; Beek; M; Nijm I n. 810; P I n. 1393; NKA VI
 p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 968; P II n. 67; V.D; Fr; Bar.

Isothecium myurum Brid. = *I. viviparum* (Neck.) Lindb.

Isothecium viviparum (Neck.) Lindb. (*Hypnum viviparum*
 Neck.; *H. Myurum* Poll.; *H. curvatum* Sw.; *Isothecium myurum*
 Brid.) — Ehrh.; Geuns n. 77; FBS n. 40; Dz L I; Dz L II;
 Ut n. 23; En II; Cat II; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 809; P I
 n. 1392; NKA III p. 173; Lac. Am; NKA VI p. 197; E; Ov I;
 Nijm II n. 969; P II n. 80; Add; V.D; V.Z; Fr; BN VIII; Bar.
Leptobryum pyriforme (L.) Wils. (ook Schpr of Hedw.; *Bryum*
pyriforme Hedw. of Mart. of Sw.) — FBS n. 100; Dz L I; Ut
 n. 60; En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1442; Lac. Am; Lac. L;
 Hol n. 1442; E; Ov I; Camp II n. 628; P II n. 170; V.D; S; Fr;
 Un 40; Bar; Gr.

Leptodictyum riparium (L.) Warnst. (*Hypnum riparium* L.;
Amblystegium riparium B. et Sch.) — Geer n. 91; FBS n. 34;
 Dz L I; En II; Cat II; M; Hov I; Nijm I n. 803; Camp I n. 556;
 NKA II p. 69; P I n. 1384; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 523; Ov I;
 NKA VIII p. 425; Nijm II n. 957 (abus. 357); Camp II n. 593;
 P II n. 37; Un 26; Nat; K.F; Un 28; W; S; Un 32; Fr; NKA
 XLVI p. 201; Un 35; Un 36; Blok; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX;
 NKA LII; Na; MM; Gr.

var. *elongatum* (Br. eu.) Warnst. — P II n. 37 var.

var. *homomallum* Dozy et Molk. — in P II n. 37 var. is ons
 onbekend.

var. *longifolium* (Schultz) Warnst. — En II; M; P I n. 1384β;
 P II n. 37 var.

var. *pseudostellatum* Dozy et Molk. staat bij Holkema; het is
Campylium polygamum (die in P I ontbreekt), en die bij

- Holkema als synoniem bij *Hypnum riparium* staat.
 var. *subhomomalla* Brid. in NKA II p. 70 is ons onbekend.
 fm. *tenuis* — Bar.
- Leptodictyum trichopodium** (Schantz) Warnst. (*Hypnum riparium* var. *trichopodium* Schantz) — P I n. 1384 var. γ ; P II n. 37 var.
- var. *Kochii* (Br. eu.) Broth. (*Amblystegium Kochii* B. et Sch.) — P I n. 1389 var.; NKA VI p. 108, 310; Ov I met een ?; P II n. 38; BN VIII.
- Leptodon Smithii** (Dicks.) Mohr (*Pterygonium Smithii* Sw.) — DMb III; M; P I n. 1402; NKA IV p. 185; Bu; E; Ov I; P II n. 97; V.D.
- Leptodontium flexifolium** (Dicks.) Hampe (*Didymodon flexifolius* H. et T.) — P I n. 1525; Fr.
- Leptotrichum flexicaule* Hampe = *Ditrichum flexicaule* (Schleich.) Hampe
- Leptotrichum homomallum* Schpr = *Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hampe
- Leptotrichum pallidum* Hampe = *Ditrichum pallidum* (Schr.) Hampe
- Leptotrichum tortile* Hampe var. *pusillum* Schpr = *Ditrichum tortile* (Schr.) Lindb. var. *pusillum* (Hedw.) Limpr.
- Leptotrichum vaginans* Schpr = *Ditrichum vaginans* (Sull.) Hampe
- Leskea complanata* Timm. (ook *Leskia complanata* L. of Timm. of Hedw.) = *Neckera complanata* (L.) Hüben.
- Leskea* (*Leskia*) *paludosa* Hedw. = *L. polycarpa* Ehrh. var. *paludosa* (Hedw.) Schpr
- Leskea* (*Leskia*) *polyantha* Hedw. (ook Schreb.) = *Pylaisia polyantha* (Schreb.) Br. eu.
- Leskea polycarpa*** Ehrh. (ook Hedw. of Schr. en *Leskia*; *Hypnum medium* Dicks.) — Geer n. 88; FBS n. 72; Dz L II; Ut n. 46; M; Nijm I n. 835; Camp I n. 539; P I n. 1403; Lac. Am; Delf n. 507; Hol n. 1403; E; Ov I; Nijm II n. 978; Camp II n. 612; P II n. 89; Add; Un 25; V.Z; Un 32; Un 36; BN IV; BN VIII; BN IX.
- var. *paludosa* (Hedw.) Schimp. (*Leskea paludosa* Hedw.; *Hypnum inundatum* Dicks.) — Geer n. 89; FBS n. 71; Dz L I; Dz L II; Ut n. 45; En II; Cat II; Beek; M; Nijm I n. 834; Camp n. 612 β .
- Leskea* (*Leskia*) *sericea* Hedw. = *Homalothecium sericeum* (L.) Br. eu.
- Leskia subtilis* Hedw. = *Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske.
 De opgave FBS n. 74 is foutief.

Leskea (*Leskia*) *trichomanoides* Leyss (ook *Leiss* of Hedw. of Schreb.) = *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Br. eu.

Leucobryum glaucum (L.) Schimp. (*Bryum glaucum* L. of Dill.; *Dicranum glaucum* Hedw.; *Leucobryum vulgare* Hampe; *Onophorus glaucus* B. et Sch.) — Boerh p. 20 n. 8 (mist het teken voor inlands), p. 21 n. 28; Gort Belg n. 851; G VII n. 888; Ehrh; FBS n. 136; Ut n. 85; En IV; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 876; P I n. 1546; Lac. L; NKA VI p. 197, 201; E; NKA VII p. 124; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1034; P II n. 269; V.S; V.D; K.F; S; Fr; Un 33; BN II; Un 34; Acht; Un 36; Un 38; Un 39; NKA L p. 295; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41.

Leucobryum vulgare Hampe = *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.

Leucodon sciuroides (L.) Schwaegr. — FBS n. 145; Dz L I; Ut n. 91; En II; DMb III; Cat II; M; Nijm I n. 882; Camp I n. 533; P I n. 1406; Trap; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 197, 202; E; Ov I; Nijm II n. 972; Camp II n. 605; P II n. 92; V.D; V.Z; K.F; Un 28; Un 32; Fr; Un 38; BN IV; BN VIII; BN IX.

Limnobia palustre Schpr = *Hygrohypnum palustre* (Huds.) Loeske

Loeskeobryum brevirostre (Ehrh.) Fleisch. (*Hypnum brevirostre* Ehrh.; *Hylocomium brevirostre* Schpr) — En III; Cat I; M; P I n. 1351; Bu; Ov I; P II n. 4; Add; Gr.

Meesea trichodes (L.) Spruce (*M. uliginosa* Hedw.) — M; P I n. 1457; E; Ov I; P II n. 124; V.D.

Meesea triquetra (L.) Aongstr. (*M. tristicha* B. et Sch.) — Bu; Ov I; P II n. 123.

Meesea tristicha B. et Sch. = *M. triquetra* Aongstr.

Meesea uliginosa Hedw. = *M. trichodes* (L.) Spruce

Meesia = *Meesea*

Mniobryum albicans (Wahlenb.) Limpr. (*Bryum Wahlenbergii* Schwaegr.; *Webera albicans* Schimp.) — Lac. B; M; P I n. 1441; Lac. L; Bu; Ov I; Nijm II 1004; P II n. 164; Add; Un 36; Un 39; NKA L p. 220.

Mniobryum carneum (L.) Limpr. (*Bryum carneum* L.; *Webera carnea* Schpr) — Dz L I; Dz L II; Ut n. 61; En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1440; E; Ov I; P II n. 165; V.Z; K.F; K.M.

Mnium affine Bland. (ook Schwaegr.; *M. serpyllifolium* L. var. *cuspidatum* L.) — Misschien Meese n. 444β; Ut n. 62; DMb III; Cat II; M; P I n. 1424; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 506 (abus. 536); NKA VI p. 202; NKA VII p. 124; Ov I; NKA X p. 382; Nijm II n. 997; Camp II n. 619; P II n. 135; Nat; V.D; K.F; S; BN II; Un 36; Un 37; Un 39; BN VIII; Un 40; Bar.

var. *elatum* (Br. eu. ex p.) Lindb. (*Mnium Seligeri* Jur.) — Cat II;

- M; P I n. 1424 β ; E; P II n. 135 var.; V.S; K.F; V; Un 28; Un 36; Un 38; BN VIII; Bar; NKA LII.
 var. integrifolium — Bar.
- Mnium androgynum* L. = *Aulacomnium androgynum* (L.) Schwaegr.
- Mnium annotinum* L. = *Webera annotina* (Hedw.) Bruch
- Mnium capillare* L. = *Bryum capillare* L.
- Mnium cinclidioides* (Blytt) Hübner. — NKA II p. 71; P I n. 1427; Ov I; P II n. 129.
- Mnium crudum* L. = *Webera cruda* (L.) Bruch
- Mnium cuspidatum* (L. ex p.; Schreb.) Leyss (ook Hedw.; *Bryum cuspidatum* Sw.; *Mnium serpyllifolium* L. var. *cuspidatum* L.) — Meese n. 444 β ; Gort Belg n. 841 var α ; G VII n. 875 var. β ; FBS n. 98; Dz L I; Ut n. 58; En II; Cat I; M; Nijm I n. 849; P I n. 1426; Trap; NKA III p. 174; NKA V p. 77; Lac. Am; Hol n. 1426; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 998; Camp II n. 618; P II n. 136; V.D; V; J.L; Acht; Un 39; BN VIII; Bar.
- Mnium fissum* L. is ten dele *Calypogeia fissa* (L.) Raddi; maar de Gorter VII n. 876 zal wel *Cal. Trichomanes* (L.) Corda bedoelen.
- Mnium fontanum* L. = *Philonotis fontana* (L.) Brid.
- Mnium hornum* L. (ook Hedw.) — Boerh p. 20 n. 16; Meese n. 442; Gort Belg n. 839; Zut n. 498; G VII n. 872; FBS n. 94; Dz L I; En II; Cat I; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 846; Camp I n. 573; P I n. 1430; Trap; NKA III p. 174; NKA IV p. 238, 244; NKA V p. 76; Lac. Am; Hol n. 1430; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 995; Camp II n. 621; P II n. 132; Add; Un 25; Un 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Pol; Un 29; W; K.M; S; Un 32; J.L; Fr; Un 33; BN II; Un 35; Acht; Un 36; Blok; Un 38; Un 39; NKA L p. 295; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; MM; Gr.
- Mnium hygrometricum* L. = *Funaria hygrometrica* (L.) Sibth.
- Mnium insigne* Mitt. — Genoemd in Ov I; waarmee volgens P II bedoeld is *Mnium Seligeri* Jur. Volgens DIXON zijn deze twee synoniem; maar de meeste auteurs beschouwen *M. insigne* Mitt. als een plant uit westelik N.-Amerika en *M. Seligeri* als synoniem van *M. insigne* Auct. plur. non Mitt., d.i. *M. affine* var. *elatum*.
- Mnium Jungermannia* L. = *Pleurozia purpurea* (Scop.) Lindb. Zie aldaar.
- Mnium marginatum* (Dicks.) Palis. (*M. serratum* Brid.) — Lac. L; Bu; NKA VI p. 107; Ov I; P II n. 131; Nat; Acht.
- Mnium palustre* L. = *Aulacomnium palustre* (L.) Schwaegr.
- Mnium polytrichoides* L. *longifructum* Ehrh. = *Pogonatum aloides* (Hedw.) Palis.

Mnium polytrichoides L. *rotundifructum* Ehrh. = *Pogonatum subrotundum* (Huds.) Lindb.

Mnium punctatum (L., Schreb.) Hedw. (*Bryum punctatum* Schreb.; *Mnium serpyllifolium* Sw.; *Mn. serp.* L. var. *punctatum* L.) — Meese n. 444; Zut n. 499; G VII n. 875; Mul p. 102; FBS n. 97; Dz L II; Ut n. 57; Lac. B; Cat II; M; Nijm I n. 848; NKA II p. 71; P I n. 1428; NKA V p. 76; Lac. L; Hol n. 1428; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 999; P II n. 128; Add; Nat; V.D; K.F; Fr; Acht; Un 36; BN VIII; Bar; BN IX.

Mnium purpureum L. = *Ceratodon purpureus* (L.) Brid.

Mnium riparium Mitt. — Un 36.

Mnium roseum Weis = *Rhodobryum roseum* (Weis) Limpr.

Mnium rostratum Schrad. (ook Schwaegr.) — DMb I; M; P I n. 1425; Trap; NKA VI p. 22, 107, 202, 249; E; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 617; P II n. 133; Nat; V; Fr; BN II; Un 34; Acht; Un 36; Un 39; BN VIII; Bar; Un 41; NKA LII; Na.

Mnium rugicum Laur. — Un 40.

Mnium Seligeri Jur. Zie op *Mnium insigne*.

Mnium serpyllifolium L. var. α *punctatum* L. = *M. punctatum* (L., Schreb.) Hedw.

Mnium serpyllifolium L. var. β *cuspidatum* L. = *M. cuspidatum* (L. ex p., Schreb.) Leyss en *M. affine* Bland.

Mnium serpyllifolium L. var. γ *proliferum* L. = *Rhodobryum roseum* (Weis) Limpr.

Mnium serpyllifolium L. var. δ *undulatum* L. = *M. undulatum* (L.) Weis.

Mnium serpyllifolium Sw. = *Mnium punctatum* (L., Schreb.) Hedw.

Mnium serratum Brid. = *M. marginatum* (Dicks.) Palis.

Mnium setaceum L. staat in G VII n. 871; de Gorter citeert DILLEN pl. XLVIII fig. 44, welke volgens BRAITHWAITE en LIMPRICHT voorstelt *Barbula revoluta* (Schrad.) Brid.; en volgens TAYLOR: *Barbula convoluta* Hedw. GISEKE noemt voor die plaat *Hypnum setaceum* Weiss, een synoniem van *Barbula convoluta*. Hoogstwaarschijnlijk heeft DE GORTER deze laatste bedoeld.

Mnium stellare Reich. (ook Hedw.) — Lac. L; Bu; Ov I; P II n. 130.

Mnium subglobosum Br. eu. (ook B. et Sch.) — P I n. 1429; Lac. Am; NKA V p. 421; Hov II; Ov I; P II n. 127; Nat; Un 36; Na.

Mnium undulatum (L.) Weis (ook Hedw. of Neck.; *Bryum ligulatum* Schreb.; *Mn. serpyllifolium* L. var. *undulatum* L.) — Boerh p. 20 n. 14 (mist het teken voor inlands) en p. 21 n. 36;

- Meese n. 444 var. δ ; Gort Belg n. 8417; G VII n. 875 δ ; FBS n. 99; Dz L I; Ut n. 59; En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 850; Camp I n. 574; P I n. 1423; Trap; NKA III p. 174; NKA IV p. 42; NKA V p. 77; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1423; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 996; Camp II n. 620; P II n. 134; Add; Un 25; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 29; Un 32; J.L; Fr; BN II; Acht; Un 36; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Pl; Gr.
- Myrinia pulvinata** (Wahlenb.) Schimp. — BN IV.
- Neckera complanata** (L.) Hüb. (ook B. et Sch.; Hypnum complanatum L.; Leskea of Leskia complanata L. of Hedw. of Timm) — G VII n. 903; FBS n. 68; Dz L I; Dz L II, Ut n. 43, En II; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 831; Camp I n. 535; P I n. 1399; Trap; Lac. L; NKA VI p. 202; E; Ov I; Nijm II n. 974; Camp II n. 607; P II n. 94; Add; Un 32; Fr; BN VIII; BN IX.
- Neckera crispa** (L.) Hedw. (ook W.; Hypnum crispum L.) — Boerh. p. 20 n. 13; Gort Belg n. 864; G VII n. 904; FBS n. 78; M; P I n. 1397; Lac. L; NKA VI p. 107; E; Ov I; P II n. 95; Fr; Bar; BN IX.
- Neckera curtispindula** W. = *Antitrichia curtispindula* (Hedw.) Brid.
- Neckera heteromalla** Hedw. = *Cryphaea arborea* (Huds.) Lindb.
- Neckera pennata** (L.) Hedw. — Lac. B; M; (deze twee opgaven worden later niet meer herhaald en berusten dus op een vergissing); Garj. M (bewijsmateriaal ontbreekt).
- Neckera pumila** Hedw. — Dz L I; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1398; NKA VI p. 202; Ov I; P II n. 96; Add; NKA XII p. 45; V.D.
- Neckera viticulosa** L. (ook Leyss.) = *Anomodon viticulosus* (L.) Hook. et Tayl.
- Oligotrichum incurvum** (Huds.) Lindb. — AB I; NKA LI p. 284.
- Omalia trichomanoides** B. et Sch. = *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Br. eu.
- Oncophorus glaucus** B. et Sch. = *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.
- Orthodicranum flagellare** (Hedw.) Loeske (*Dicranum flagellare* Hedw.) — Cat. I; M; P I n. 1535; NKA V p. 392; Ov I; P II n. 279; BN IX.
- Orthodicranum montanum** (Hedw.) Loeske (*Dicranum montanum* Hedw.) — Cat II; M; Hov I; P I n. 1534; Bu; NKA V p. 392; Ov I; P II n. 280.
- Orthothecium intricatum** (Hartm.) Br. eu. — Garj. M (bewijsmateriaal ontbreekt).
- Orthotrichum affine** Schrad. (ook Brid. of Sm.) — Meese n. 446?; Gort Belg n. 843?; Geer n. 85; FBS n. 105; Dz L I; Ut n. 65;

- En II; Cat I; M; Nijm I n. 853; Camp I n. 581; P I n. 1484; Trap; Delf n. 496; E; Ov I; Nijm II n. 1010; Camp II n. 633; P II n. 193; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 32; Fr; BN II; Un 34; Un 38; BN VI; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41.
- Orthotrichum affine** Brid. var. *tenellum* Bruch = *O. tenellum* Bruch
- Orthotrichum anomalum** Hedw. — FBS n. 103; Dz L II; Ut n. 63; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 852; Camp I n. 585; P I n. 1477; Lac. Am; NKA VI p. 107; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1013; Camp II n. 631; P II n. 196; Un 32; BN VIII; Gr.
- var. *saxatile* (Brid., Schimp.) Milde (= var. *elongatum* Lac.; *Orthotrichum saxatile* Brid. of Wood) — P II n. 196 var.; Fr. P I n. 1477 noemt een var. β , d.i. var. γ van B. et Sch. die in P II var. β *elongatum* Lac. wordt genoemd.
- Orthotrichum anomalum** Sm. = *O. cupulatum* Hoffm., wat in FBS over het hoofd wordt gezien.
- Orthotrichum coarctatum** P. Beauv. = *Ulota Bruchii* Hornsch.
- Orthotrichum crispulum** Hornsch = *Ulota crispula* Bruch
- Orthotrichum crispum** Hedw. = *Ulota ulophylla* (Ehrh.) Broth.
- Orthotrichum cupulatum** Hoffm. (*O. anomalum* Sm.) — Geer n. 86; FBS n. 102; Dz L II; Lac. B; M; NKA II p. 72; P I n. 1476; Lac. Am; Ov I; P II n. 195; Un 32.
- var. *commutatum* B. et Sch.; var. *capsula emersa*; var. *capsula exserta calyptra nuda*; var. *riparium* Schpr en var. *Rudolphianum* Schpr is alles *Orthotrichum nudum* Dicks.
- Orthotrichum diaphanum** (Gmel.) Schrad. — FBS n. 106; Dz L I; Ut n. 66; En II; Cat I; M; Nijm I n. 854; Camp I n. 583; P I n. 1491; Trap; NKA IV n. 238; Lac. Am; Delf n. 497; Hol n. 1491; NKA VI p. 201; E; Ov I; Camp II n. 635; P II n. 185; Add; V.D; V.Z; K.F; V; Un 32; Fr; BN II; Un 35; Blok; Un 37; BN VIII; Bar; Un 41; MM; Gr.
- Orthotrichum fallax** Bruch uit P I n. 1481 is volgens P II *O. pumilum* Sw.
- Orthotrichum fallax** Schpr = *O. Schimperii* Hamm.
- Orthotrichum fastigiatum** Bruch — P I n. 1485; NKA IV p. 238; Lac. Am; NKA VI p. 197, 201; E; Ov I; NKA VIII p. 424; Camp II n. 634; P II n. 192; Add; NKA XII p. 45; K.F; V; Un 28; W; Un 32; Un 34.
- Orthotrichum jutlandicum** Brid. = *Ulota phyllantha* Brid.
- Orthotrichum leiocarpum** B. et Sch. = *O. striatum* (L.) Schwaegr.
- Orthotrichum Ludwigii** Hornsch. (ook Schwaegr.) = *Ulota Ludwigii* (Brid.) Brid.
- Orthotrichum Lyellii** Hook. et Tayl. — Dz L II; Ut n. 67; Lac. B; DMb III; Cat I; M; Camp I n. 584; P I n. 1492; Trap; NKA III

- p. 174; Lac. Am; NKA VI p. 197, 202; E; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1008; Camp II n. 637; P II n. 183; Add; NKA XII p. 45; V.D; K.F; V; Un 28; Un 32; BN II; Un 34; Blok; Un 38.
- Orthotrichum nudum** Dicks.; (*O. cupulatum* varr.) — Lac. B; Cat I; M; P I n. 1476 (β en γ); P II n. 195 β en γ ; Un 32.
- Orthotrichum obtusifolium* Schrad. = *Stroemia obtusifolia* (Schrad.) Hag.
- Orthotrichum patens** Bruch — Cat II; M; P I n. 1483; Lac. Am; Ov I; P II n. 190.
- Orthotrichum phyllanthum* B. et Sch. = *Ulota phyllantha* Brid.
- Orthotrichum pulchellum** Brunt. (ook Hook. et Tayl. of Sm.) — Dz L I; Lac. B; M; P I n. 1494; Ov I; P II n. 184.
- Orthotrichum pumilum* Bruch van Lac. Am is vermoedelik *O. Schimperii* Hamm.
- Orthotrichum pumilum** Sw. (ook Schwaegr.) — Lac. B; En III; DMb II; Cat I; M; P I n. 1480 (deze opgaven staan in P II onder *O. fallax* Schpr = *O. Schimperii* Hamm.); P I n. 1481; Lac. Am; Delf n. 498; Ov I; P II n. 187; Fr; BN VIII.
- Orthotrichum saxatile* Brid. (ook Wood) = *O. anomalum* Hedw. var. *saxatile* (Brid., Schimp.) Milde
- Orthotrichum Schimperii** Hamm. (*O. fallax* Schpr) — Ov I; P II n. 188.
- Orthotrichum speciosum** Nees — Dz L II; Lac. B; DMb II; Cat. I; M; P I n. 1486; Lac. Am; E; Ov I; P II n. 191; V.D; BN VIII.
- Orthotrichum Sprucei** Mont. — Ov I; P II n. 181.
- Orthotrichum stramineum** Hornsch. — DMb I; Cat I; M; P I n. 1490; Lac. Am; Ov I; P II n. 189; V.D; Bar.
- Orthotrichum striatum** (L.) Schwaegr. (ook Hedw.; *Bryum striatum* L.; *Orth. leiocarpum* B. et Sch.) — Meese n. 446; Gort Belg n. 843; G VII n. 879; Ehrh; Mul p. 103; FBS n. 104; Dz L I; Ut n. 64; En II; Cat I; M; Camp I n. 582; P I n. 1493; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 201; E; Ov I; Nijm II n. 1009; Camp II n. 636; P II n. 182; V.D; V.Z; Fr; BN VIII; Bar.
- Orthotrichum tenellum** Bruch (*O. affine* Brid. var. *tenellum* Bruch) — Dz L I; En II; Lac. B; M; P I n. 1482; Trap; Lac. Am; Ov I; NKA X p. 382; Nijm II n. 1011; Camp II n. 632; P II n. 186; Un 32.
- Oxyrrhynchium praelongum** (Hedw.) Warnst. (*Hypnum praelongum* L.; *Eurhynchium praelongum* Schpr) — Boerh p. 21 n. 23 (twijfelachtig), p. 21 n. 26; En II; Cat I; M; Nijm I n. 823; Camp. I n. 551; P I n. 1367; Trap; NKA III p. 173; Lac. Am;

- Lac. L; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; Nijm II n.965; Camp II n. 596; P II n. 62; Add; Nat; V.D; K.F; S; Un 32; J.L; Fr; Un 33; Acht (omvat tevens *Eurhynchium Stokesii*); Un 38; BN VIII; Un 40; Bar; MM; Gr.
 var. *Swartzii* Vent. et Bot. = *O. Swartzii* (Turn.) Warnst.
- Oxyrrhynchium pumilum*** (Wils.) Broth. (*Eurhynchium pumilum* Schpr) — NKA VI p. 251; Ov I; P II n. 60.
- Oxyrrhynchium speciosum*** (Brid.) Warnst. (*Eurhynchium androgynum* Schpr; *E. speciosum* Schpr; *Rhynchostegium speciosum* Brid.) — Bu; Ov I; P II n. 63; Nat; K.F; Acht; Un 40; Bar; Na?
- Oxyrrhynchium Swartzii*** (Turn.) Warnst. — W(?).
- Paludella squarrosa*** (L.) Brid. (ook Ehrh.) — NKA V p. 87; Ov I; P II n. 122; Garj. M (zeer onwaarschijnlijk); Pol; Nop.
- Phascum acaulon*** L. (*Ph. cuspidatum* Schreb.) — Meese n. 436; Gort Belg n. 833; Zut n. 495; G VII n. 863; Mul p. 101; FBS n. 161; Dz L I; Ut n. 98; En II; M; Nijm I n. 889; Camp I n. 589; P I n. 1587; Trap; Lac. Am; Delf n. 483; E; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 652; P II n. 302; V.Z; K.F; Acht; BN VIII; BN IX; Gr.
 var. *curvisetum* (Dicks.) Braithw. — Dz L I; M; P I n. 1587e; P II n. 302 var.
 var. *mitraeforma* — W.
 var. *Schreberianum* (Dicks.) Brid. — En II; M; P I n. 1587γ, P II n. 302 var.
- Phascum affine* Nees = *Ph. acaulon* var. *affine* (Nees) Limpr. Door Fr. Nees ab Esenbeck in 1819 in de Leidse hortus ontdekt, vermeld in FBS n. 162 en Dz L II (als *Ph. affine* Nees et Hornsch.), in P I sub n. 1587 var. *Schreberianum*; in P II niet meer genoemd; wel staan daar ex. uit de hortus onder de hoofdsoort.
- Phascum bryoides* Dicks. = *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt.
- Phascum cohaerens* Hedw. = *Ephemerum cohaerens* (Hedw.) Hampe
- Phascum crispum* Hedw. = *Astomum crispum* (Hedw.) Hampe
- Phascum curvicolium*** Ehrh. (ook Hedw.) — NKA VI p. 22; Ov I; P II n. 300.
- Phascum cuspidatum* Schreb. = *Ph. acaulon* L.
- Phascum cuspidatum* var. *macrophyllum* B. et Sch. = *Ph. acaulon* (volgens Limpricht I p. 187: „das typische *Ph. cuspidatum* ... entspricht so ziemlich dem *Ph. macrophyllum* Wib.).
- Phascum cuspidatum* var. *piliferum* B. et Sch. (ook Schreb.) = *Ph. piliferum* Schreb.
- Phascum muticum* Schreb. = *Acaulon muticum* (Schreb.) C. Müll.

- Phascum nitidum* Hedw. = *Pseudephemerum axillare* (Dicks.) Hag.
Phascum pachycarpum Schwaegr. (ook Schwgr., Bruch et Schimp.)
 = *Ephemerum recurvifolium* (Dicks.) Boul.
Phascum patens Hedw. = *Physcomitrella patens* (Hedw.) Bruch
 et Schimp.
Phascum patens var. γ in Cat I en M = *Physcomitrella patens* var. γ
pedicellatum B. et Sch. in P I; te vinden in P II onder de hoofd-
 soort.
Phascum piliferum Schreb. (*Ph. cuspidatum* var. *piliferum* B. et
 Sch.) — Geuns n. 65; FBS n. 160; Dz L I; En II; M; P I n. 1587 δ ;
 Nijm II n. 1030; P II n. 302 var.; W.
Phascum serratum Schreb. = *Ephemerum serratum* (Schreb.)
 Hampe.
Phascum subulatum L. = *Pleuridium subulatum* (Huds.) Rabenh.
Philonotis caespitosa Wils. — V.S.
Philonotis capillaris Lindb. — NKA VI p. 22; Ov. I; P II n. 117.
Philonotis fontana (L.) Brid. (*Mnium fontanum* L.; *Bartramia*
fontana Brid. of Sw.) — Geuns n. 68; FBS n. 85; Lac. B; Cat I;
 M; Nijm I n. 842; P I n. 1460; Hol n. 1460; E; NKA VII p. 95;
 Ov I; Nijm II n. 991; P II n. 115; V.D; Fr; Un 36; BN VIII;
 BN IX; Pl.
Philonotis marchica (Willd.) Brid. — M (zie bij *Bartramia*
marchica); P I n. 1461; Ov I; Nijm II n. 990; P II n. 116.
Physcomitrella patens (Hedw.) Br. et Schimp. (*Phascum patens*
 Hedw.) — Bijdr. N. W. VII p. 346; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1582;
 Lac. L; Ov I; P II n. 305; Fr; Acht; NKA L p. 218, 261; Pl.
 var. *megapolitana* (Schultz pro spec.) Br. eu. — P I n. 1582 β ;
 Nijm II n. 1007; P II n. 305 var.
 var. *pedicellatum* B. et Sch. uit P I is in P II vermeld onder de
 hoofdsoort.
Physcomitrium ericetorum de Not. = *Funaria obtusa* (Dicks.) Lindb.
Physcomitrium eurystomum (Nees) Sendt. — P I n. 1560 β ;
 NKA V,4, p. 286; Bu; Ov I; P II n. 175. Exsicc. Rabenhorst
 Bryotheca n. 54.
Physcomitrium fasciculare B. et Sch. = *Funaria fascicularis*
 (Dicks.) Schimp.
Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. (ook B. et Sch.; *Bryum*
pyriforme L.; *Gymnostomum pyriforme* Hedw.) — Meese n. 447;
 Gort Belg n. 844; G VII n. 881; FBS n. 154; Dz L I; Ut n. 96;
 En II; Cat I; M; Nijm I n. 887; Camp I n. 566; P I n. 1561;
 Trap; Lac. Am; Lac. L; E; Ov I; Nijm II n. 1006; Camp II
 n. 630; P II n. 174; V.D; V.Z; W; Fr; Acht; BN VIII; Bar;
 BN IX; Gr.

Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. (ook B. et Sch.) — Lac. B; Cat I; M; P I n. 1560; NKA V,4, p. 286; Bu; Ov I; P II n. 176.

var. *cuspidatum* Dozy et Molk. = *Physcomitrium eurystomum* (Nees) Sendt. BUSE (NKA V,4, p. 286) onderscheidt fm. *praecox* Buse (Exsicc. n. 136) en fm. *serotina* Buse (Exsicc. n. 137). Deze laatste is *Ph. eurystomum* (Nees) Sendtn.

Plagiotheciella latebricola (Wils.) Fleisch. — NKA LIII (1943).

Plagiothecium curvifolium Schlieph. — Un 39.

Plagiothecium denticulatum (L.) Br. eu. (ook Schpr of B. et Sch.; *Hypnum denticulatum* L. of Hedw.) — Boerh. p. 20 n. 21; Meese n. 458; Gort Belg n. 862; Zut n. 506; G VII n. 900; Mul p. 104; FBS n. 31; Dz L I; En II; Cat II; M; Nijm I n. 800; P I n. 1387; NKA IV p. 244; Lac. Am; Delf n. 519; E; Ov I; Nijm II n. 959; P II n. 51; Nat; V.D; K.F; V; Un 28; W; S; Un 33; BN II; Un 34; Acht; Un 36; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX; Na; Pl; MM; Gr.

Plagiothecium elegans Schpr = *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb.

Plagiothecium Roeseanum (Hampe) Br. eu. (P. *Roesei* Schpr of B. et Sch.) — NKA VI p. 108, 250; Ov I; Nijm II n. 960; P II n. 49; Acht.

Plagiothecium Roesei Schpr (ook B. et Sch.) = *P. Roeseanum* (Hampe) Br. eu.

Plagiothecium Ruthei Limpr. — V.S.

Plagiothecium Schimper Jur. et Milde = *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb. var. *Schimper* (Jur. et Milde) Limpr.

Plagiothecium silesiacum B. et Sch. = *Dolichotheca silesiaca* (Selig.) Fleisch.

Plagiothecium silvaticum (Huds.) Br. eu. (ook L. of B. et Sch. of Hedw.; *Hypnum sylvaticum* L.) — FBS n. 30; Dz L I; Ut n. 18; En II; Cat II; M; Nijm I n. 799; P I n. 1386; Lac. L; E; NKA VII p. 124; Ov I; Nijm II n. 961; P II n. 48; Add; Fr; Un 33; BN II; Acht (omvat soms tevens *P. denticulatum*); Un 36; BN VIII.

var. *neglectum* (Moenk. pro spec.) F. et K. Koppe — BN IV; Un 38; Un 39; Bar.

Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. — K.F.

Plagiothecium undulatum (L.) Br. eu. (of Schpr; *Hypnum undulatum* L.) — Geer n. 93; FBS n. 33; Dz L I; Dz L II; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 802; P I n. 1385; Trap; Lac. Am; E; Ov I; Nijm n. 962; P II n. 47; V.D; K.F; Un 33; Acht; Un 36; BN VIII; Bar; Na.

var. *teres* Moenk. — Un 33.

Platygyrium repens (Brid.) Br. eu. — Garj. M; Acht p. 101 en Tabel XXII. Van alle opgaven ontbreekt bewijsmateriaal.

Platyhypnidium rusciforme (Neck.) Fleisch. (Hypnum rusciforme Weis; *H. ruscifolium* Neck; *H. riparioides* Hedw.; *Eurhynchium rusciforme* B. et Sch.; *Rhynchostegium rusciforme* B. et Sch.) — Geer n. 92; FBS n. 35; Dz L II; Ut n. 19; En II; Lac. B; Cat I; Beek; M; Nijm I n. 804; Camp I n. 557; P I n. 1366; Lac. Am; Lac. L; Delf. n. 516; NKA VI p. 202; Ov I; Camp II n. 600; P II n. 53; Nat; Un 32; Acht; BN VIII.

var. *atlanticum* (Brid.) Brizi (var. *lutescens* Schpr) — P II n. 53 var.

var. *prolixum* (Dicks.) Br. eu. (ook Schpr) — M; P I n. 1366 var.; P II n. 53 var.

fm. *tenella* — NKA X p. 381.

Pleuridium alternifolium (Dicks., Kaulf.) Rabenh. (ook Brid. of B. et Sch.) — P I n. 1581; Ov I; P II n. 297; NKA L p. 223.

Pleuridium nitidum B. et Sch. = *Pseudephemerum axillare* (Dicks.) Hag.

Pleuridium subulatum (Huds.) Rabenh. (ook B. et Sch.; *Phascum subulatum* L.) — Geuns n. 63; FBS n. 159; Dz L II; Cat I; M; P I n. 1579; Trap; Lac. L; E; Ov I; Nijm II n. 1019; P II n. 298; V.Z; Fr; Un 33; BN II; BN VIII.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. (*Barbula squarrosa* Brid.) — Ov I; P II n. 225; BN IX.

Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. (Hypnum *Schreberi* Willd.; *H. parietinum* L.; *H. muticum* v. Geuns; *H. compressum* Schreb.) — Boerh p. 20 n. 10; Ehrh; Geuns n. 76; FBS n. 54; Dz L I; Dz L II; Ut n. 32; En II; Cat I; M; Nijm I n. 820; P I n. 1343; NKA III p. 173; NKA IV p. 244; Lac. Am; Hol n. 1343; NKA VI p. 239; E; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 941; P II n. 9; Add; Un 25; Un 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 32; J.L; Fr; Un 33; BN II; Un 34; Un 35; Acht; Un 36; Un 38; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; Gr.

Pogonatum aloides (Hedw.) Palis. (ook Brid.; *Polytrichum aloides* Hedw.; *Mnium polytrichoides* L. *longifructum* Ehrh.) — Ehrh; Geuns n. 71 var. β ; Geer n. 98; FBS n. 112; Ut n. 69; En IV; Cat I; M; Nijm I n. 859; P I n. 1411; Lac. L; NKA VI p. 202; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 986; P II n. 110; Add; Nat; V.D; K.F; W; Fr; Un 36; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41. var. *minimum* (Crone) Limpr. (var. *minus* Br. eu.) — P I n. 1411 β ; Hov II; P II n. 110 var.

var. *polysetum* Kaulfuss — Un 38; BN IV.

Pogonatum nanum Brid. (ook P. Beauv.) = *P. subrotundum* (Huds.) Lindb.

Pogonatum subrotundum (Huds.) Lindb. (*P. nanum* Brid., ook *P. Beauv.*; *Polytrichum nanum* Hedw.; *Pol. pumilum* Sw., ook Dill.; *Mnium polytrichoides* L. *rotundifructum* Ehrh.) — Ehrh; Geuns n. 71 var. *a*; FBS n. 110, 111; Dz L I; Ut n. 70; En IV; Cat II; M; Nijm I n. 858; P I n. 1412; E; Ov I; Nijm II n. 987; P II n. 111; Add; K.F; Fr; BN VIII; Bar; BN IX.

Pogonatum urnigerum (L.) Palis. (ook Brid. of Schpr; *Polytrichum urnigerum* L.) — Ehrh; Geuns n. 67; FBS n. 113; Wtt; Cat II; Beek; M; Nijm I n. 860; P I n. 1413; Ov I; Nijm II n. 985; P II n. 109; BN VIII.

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. = *Webera annotina* (Hedw.) Bruch apud Brotherus

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. = *Webera bulbifera* Warnst.

Pohlia grandiflora Harald Lindb. = *Webera annotina* (Hedw.) Bruch apud Auct. plur. non Broth.

Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. = *Webera nutans* (Schreb.) Hedw.

Pohlia proligera S.O. Lindb. = *Webera proligera* (Lindb.) Kindb.

Polytrichum aloides (Hedw.) = *Pogonatum aloides* (Hedw.) Palis.

Polytrichum alpestre Brid. Vermeld door Wtt, maar deze naam hebben wij nergens kunnen vinden.

Polytrichum alpestre Hoppe = *P. strictum* Banks var. *alpestre* (Hoppe) Rabenh.; maar FBS noemt *P. alpestre* Hoppe var. *affine* Funck = *P. affine* Funck, die synoniem is met *P. strictum* Banks.

Polytrichum attenuatum Menz. (*P. formosum* Hedw., ook Hoppe); — FBS n. 118; En IV; As; Hov I; Nijm I n. 863; P I n. 1415; Lac. L; Hol n. 1415; E; Ov I; Nijm II n. 984; P II n. 107; V.D; K.F; V; Un 28; W; S; J.L; Fr; Un 33; BN II; Acht; Un 36; Blok; BN III (monstr.); Un 38; BN IV (monstr.); Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Na; Pl.

P I wijst op var. *pallidisetum* (Funck) zonder bepaalde vindplaatsen te noemen; volgens LIMPRICHT komt deze vooral in bergstreken voor.

Polytrichum commune L. (ook Brid.) — Boerh p. 21 n. 29 blijkens enkele synoniemen; misschien ook Comm p. 91 volgens één synoniem; GZ n. 570; Meese n. 440; Gort Belg n. 837 var *a*; Zut n. 496; G VII n. 867 var. *a*; Mul p. 102; FBS n. 119; Dz L I; Ut n. 73; En II; Cat I; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 864; P I n. 1414; Trap; NKA IV p. 244; Lac. Am; Hol n. 1414; E; NKA VII p. 124; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; NKA X p. 116; Nijm II n. 983; P II n. 103; Add; Un 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; Un 28; Pol; Un 29; W; S; Fr; Un 33; Un 34; Nop; Un 36; Blok; Un 38; Un 39; NKA L p. 293, 295, 296, 297; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; MM; Gr.

- var. minus Weis — K.F. Vroeger bedoelde men hiermee vaak *P. juniperinum*.
- var. perigoniale (Mchx pro spec.) Br. eu. (ook Schpr) — P I n. 1414 β ; NKA VIII p. 425; Camp II n. 613; P II n. 103 var.
- var. uliginosum Hüben. — P I n. 1414 γ ; Nijm II n. 983 var.; P II n. 103 var.; Bar.
- Polytrichum formosum* Hedw. (ook Hoppe) = *P. attenuatum* Menz.
- Polytrichum gracile*** Dicks. (ook Menz.) — FBS n. 117; Cat I; M; P I n. 1416; NKA IV p. 243; Lac. Am; Ov I; P II n. 108; Add; V.S; V.D; K.F; S; BN VIII; Bar; BN IX; Na; MM; Gr.
- Polytrichum juniperinum*** Willd. (ook Brid. of Hedw.) — Comm. p. 91; Boerh p. 21 n. 31 (mist het teken voor inlands), 30, 33, 35; GZ n. 570 (één synoniem); Meese n. 440 (als β); Gort Belg n. 837 var. β ; G VII n. 867 var. β ; FBS n. 115; Dz L I; Ut n. 72; En II; Cat I; Beek; As; M; Hov I; Nijm I n. 862; Camp I n. 564; P I n. 1417; Trap; Lac. Am; Hol n. 1417; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 981; Camp II n. 615; P II n. 105; Add; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; K.M; Un 32; J.L; BN II; Un 34; Un 35; Acht; Un 36; Un 37; BN IV; BN VI; NKA L p. 235, 236, 242, 292, 295, 296, 299, 305; BN VIII; Bar; Un 41; NKA LII; Na; Pl; Gr.
- var. alpestre Hoppe (bij M) zie bij Pol. alpestre.
- Polytrichum nanum* Hedw. = *Pogonatum subrotundum* (Huds.) Lindb.
- Polytrichum piliferum*** Schreb. — Meese n. 440 (als γ); Gort Belg n. 837 var. γ ; G VII n. 867 var. γ ; FBS n. 114; Dz L I; Ut n. 71; En II; Cat I; As; M; Hov I; Nijm I n. 861; Camp I n. 563; P I n. 1419; NKA IV p. 237; Lac. Am; Hol n. 1419; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 982; Camp II n. 614; P II n. 106; Add; NKA XXV p. 85; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; W; K.M; Un 32; Fr; Un 33; BN II; NKA XLV p. 268; Un 35; Acht; Un 36; Un 38; BN VI; Un 39; NKA L p. 235, 236; BN VIII; NKA LI p. 287; Bar; BN IX; Un 41; Pl.
- var. Hoppii (Hornsch.) Rabenh. — FBS n. 114 var. β ; P I n. 1419 β ; maar de ex. behoren tot de hoofdsoort volgens P II. „mut. psilocorys” J. Heimans — DLN XV p. 233; DLN XX p. 141; New Phytologist XXIII n. 3; BN III.
- Polytrichum pumilum* Sw. (ook Dill.) = *Pogonatum subrotundum* (Huds.) Lindb.
- Polytrichum strictum*** Banks (ook Menz.) — FBS n. 116; DMb I; M; P I n. 1418; NKA IV p. 244; Lac. Am; Ov I; P II n. 104; V.S; Un 28; Blok; BN VIII; Bar; MM; Gr.
- Polytrichum urginerum* L. = *Pogonatum urnigerum* (L.) Palis.

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (*Phascum bryoides* Dicks.) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1586; Ov I; P II n. 301; BN VIII.

Pottia cavifolia Ehrh. = *Pterygoneurum cavifolium* (Ehrh.) Jur.

Pottia eustoma Ehrh. var. *major* Ehrh. = *P. intermedia* (Turn.) Fűrnr. *P. eustoma* Ehrh. uit P I vindt men in P II terug deels onder *P. lanceolata* var. *gymnostoma*, deels onder *P. truncata*. De opgave bij E is niet meer tuis te brengen.

Pottia Heimii (Hedw.) Br. eu. (ook Turn. of B. et Sch.; *Gymnostomum Heimii* Hedw.; *G. affine* N. et Hornsch.) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1554; NKA IV p. 237; Lac. Am; E; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 650; P II n. 248; V.D; V.Z; K.F; Un 28; W; K.M; NKA XLVI p. 201; Blok; BN VIII; Pl; Garj. Am; MM; Gr.

var. *cylindrica* Br. eu. — Lac. B; Cat II; M; P I n. 1554 β ; Lac. Am; P II n. 248 var. Is volgens LIMPRICHT een alpenvorm.

Pottia intermedia (Turn.) Fűrnr. (*Gymnostomum intermedium* Turn.; *Pottia eustoma* Ehrh. var. *major* Ehrh.; *P. truncata* B. et Sch. var. *major* Br. eu.; *P. lanceolata* var. *gymnostoma* Schpr en var. *intermedia* Milde) — FBS n. 156; Dz L II; En II; M; Camp I n. 588; P I n. 1555 β ; Ov I; Camp II n. 651 var.; P II n. 246 var.; K.F; Fr; NKA XLVI p. 201; BN IX.

Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll. (*Weisia lanceolata* Hook.; *Anacalypta lanceolata* Roehl.) — Dz L II; En II; Lac. B; Cat I; M; P I n. 1558; Lac. L; Bu; Ov I; Camp II n. 651; P II n. 246; Nat.; Fr; Bar.

var. *gymnostoma* Schpr en var. *intermedia* Milde zijn beide *P. intermedia* (Turn.) Fűrnr.

Pottia minutula B. et Sch. = *P. rufescens* (Schultz) Warnst.

Pottia minutula var. *conica* B. et Sch. van Cat I, M en P I vindt men in P II terug onder de hoofdsoort.

Pottia rufescens (Schultz) Warnst. (*P. minutula* B. et Sch.; *Gymnostomum conicum* Schw.; *G. minutulum* Schwgr.) — Dz L II; En II; Cat II; M; P I n. 1556; Lac. Am; Delf n. 487; Ov I; P II n. 250; Nat; Fr; NKA XLVI p. 201; BN VIII.

Pottia Starkeana (Hedw.) C. Müll. (*Anacalypta Starkeana* N. et H.; *Pottia Starkei* C. Müll.) — Cat I; M; P I n. 1557; Bu; Ov I; P II n. 247.

Pottia Starkei C. Müll. = *P. Starkeana* (Hedw.) C. Müll.

Pottia truncata B. et Sch. (ook Turn. of Fűrnr.) = *P. truncatula* (L.) Lindb.

Pottia truncata var. *major* Br. eu. = *P. intermedia* (Turn.) Fűrnr.

Pottia truncatula (L.) Lindb. (*Bryum truncatum* L.; Gym-

nostomum truncatum Hedw.; *G. truncatulum* D.C; *Pottia truncata* B. et Sch., ook Turn. of Fürnr.) — Boerh p. 22 n. 40; Meese n. 454; Gort Belg n. 855; G VII n. 892; FBS n. 155; Dz L I; Ut n. 97; En II; Cat II; M; Nijm I n. 888; P I n. 1555; Trap; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 486; Ov I; Nijm II n. 1029; Camp II n. 649; P II n. 249; Add; K.F; Fr; NKA XLVI p. 201; BN VIII; BN IX; Gr.

var. minus Mart. uit FBS n. 155 var. β en Cat II staat in P I en P II onder de hoofdsoort.

Pseudephemerum axillare (Dicks.) Hag. (*Phascum nitidum* Hedw.; *Pleuridium nitidum* B. et Sch.) — FBS n. 158; Cat I; M; P I n. 1580; Delf n. 484; Ov I; P II n. 299; Add; NKA L p. 218, 261.

Pseudoscleropodium purum (L.) Fleisch. (*Hypnum purum* L.; *Brachythecium purum* Dixon) — Boerh p. 20 n. 2; GZA n. 652; Meese n. 463; Gort Belg n. 878; G VII n. 921; Ehrh; Mul p. 104; FBS n. 55; Dz L I; Ut n. 33; En II; Cat I; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 821; Camp I n. 542; P I n. 1344; Trap; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 528; Hol n. 1344; NKA VI p. 197; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 940; Camp II n. 583; P II n. 8; Add; Un 26; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; S; Un 32; J.L; Fr; Un 33; BN II; Un 34; Un 35; Acht; Un 36; Blok; Un 37; Un 38; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Un 41; Na; Pl; MM; Gr.

Pterogonium filiforme. Deze onbegrijpelijke opgave staat in Acht p. 105. De namen der mossen in Acht zijn ontleend aan DIXON; die deze naam echter niet geeft, evenmin als de meeste andere werken. Slechts LIMPRICHT geeft deze naam als synoniem van *Pterigynandrum filiforme*, die hier wel bedoeld zal zijn. Bewijsmateriaal ontbreekt.

Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur. (*Pottia cavifolia* Ehrh.; *Gymnostomum ovatum* Hedw.) — Dz L II; Cat I; M; P I n. 1553; Ov I; P II n. 251; Fr; NKA XLVI p. 201.

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur. (*Barbula cavifolia* Schpr) — NKA VI p. 22; Ov I; P II n. 236.

Pterogonium Smithii Sw. = *Leptodon Smithii* (Dicks.) Mohr

Pterigophyllum lucens Brid. = *Hookeria lucens* (L.) Sm.

Ptilium crista-castrensis (L.) de Not. (*Hypnum crista-castrensis* L. of Hedw.) — Cat II; M; P I n. 1361; NKA V,2, p. 296; Bu; NKA VI p. 239; Ov I; Nijm II n. 943; P II n. 14; Un 33; Un 38.

Pylaisaea = *Pylaisia*

Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eu. (*Hypnum filifolium* L.; H.

- polyanthum Schreb.; Leskea of Leskia polyantha Schreb. of Hedw.) — FBS n. 73; Dz L I; Dz L II; En II; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 836; Camp I n. 538; P I n. 1390; Lac. Am; Delf n. 509; E; NKA VII p. 124; Ov I; Camp II n. 602; P II n. 83; Add; Fr; Acht; BN VIII; Gr.
- Pyramidula tetragona* (Brid.) Brid. — Garj. M; bewijsmateriaal ontbreekt.
- Racomitrium* = *Rhacomitrium*
- Rhacomitrium aciculare*** (L.) Brid. — P I n. 1471; NKA VII p. 30; Ov I; P II n. 208; Fr.
- Rhacomitrium canescens*** (Weis, Timm) Brid. (*Bryum hypnoides* L. var. *virescens* L.; *Trichostomum canescens* Hedw. of Timm) — Boerh p. 20 n. 18; Gort Belg n. 857 var. β ; G VII n. 894 var. β ; Ehrh; Geuns P 74; Geer n. 83; FBS n. 128; Dz L I; Ut n. 79; En III; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 871; P I n. 1467; Trap; NKA V p. 73; Delf n. 495; Hol n. 1467; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1015; P II n. 204; V.D; K.F; Un 29; NKA XLV p. 268; Un 35; Acht; BN VIII; Bar; BN IX; Pl.
- var. *ericoides* (Web.) Br. eu. (*Trichostomum ericoides* Schrad.) — FBS n. 129; Dz L I; Ut n. 80; Cat II; M; P I n. 1467 γ ; Hol n. 1467 γ ; E; Hov II; Nijm II n. 1015 var; P II n. 204 var; Add; V; Fr; BN IX.
- var. *prolixum* Br. eu. — Cat II; M; P I n. 1467 β ; E; P II n. 204 var.
- Rhacomitrium fasciculare*** (Schrad.) Brid. — Cat II; M; P I n. 1470; Ov I; P II n. 206.
- Rhacomitrium heterostichum*** (Hedw.) Brid. — P I n. 1469; NKA V p. 88; Lac. L; Bu; Ov I; P II n. 207; BN I; Fr; BN II; Un 38; BN VI; BN IX.
- var. *affine* — BN II; Un 38; BN VI.
- var. *obtusum* (Sm.) Loeske — BN I; BN II; Un 38; BN VI.
- Rhacomitrium hypnoides*** (L.) Lindb. (*Bryum hypnoides* L.; *Trichostomum lanuginosum* Hedw.; *Rhac. lanuginosum* Brid.) — Boerh p. 20 n. 17; Meese n. 455; Gort Belg n. 857; G VII n. 894; Ehrh; Mul p. 103; FBS n. 130; Ut n. 81; Cat II; M; Nijm I n. 872; P I n. 1468; Hol n. 1468 (verkeerd); E; Hov II; Ov I; P II n. 205; Fr.
- var. *depauperata* Dozy et Molk. — P I n. 1468 β ; P II n. 205 var.
- Rhacomitrium lanuginosum* Brid. = *R. hypnoides* (L.) Lindb.
- Rhodobryum roseum*** (Weis) Limpr. (*Bryum roseum* Schreb.; *Mnium roseum* Weis; *Mnium serpyllifolium* L. var. *proliferum* L.) — GZA n. 646; Gort Belg n. 841 var. β ; G VII n. 875 var. γ ; FBS n. 96; Wtt; Dz L I; Lac. B; Cat I; M; Beek; Nijm I n.

- 851; Camp I n. 572; P I n. 1447; E; Ov I; Nijm II n. 1000; Camp II n. 627; P II n. 137; V.D; V; Fr; BN VIII; Bar.
- Rhynchostegiella algeriana** (Brid.) Broth. (Hypnum Algerianum Desf.; H. tenellum Dicks.; Eurhynchium tenellum B. et Sch.; Rhynchostegium tenellum Schpr); — Lac. B; Cat II; M; P I n. 1377; Lac. Am; Bu; NKA VI p. 108; Ov I; P II n. 58.
- Rhynchostegiella compacta** (C.M.) Loeske — K.F.
- Rhynchostegiella curviseta** (Brid.) Limpr. (Hypnum tenellum var. rigidulum Dozy et Molk.; Rhynchostegium curvisetum Schpr) — P I n. 1377 var. β ; Bu; Ov I; P II n. 57.
- Rhynchostegium confertum** (Dicks.) Br. eu. (ook Schpr; Hypnum confertum Dicks.; Eurhynchium confertum B. et Sch.) — Dz L I; En II; Lac. B; Cat I; M; NKA II p. 70; P I n. 1374; Lac. Am; Delf n. 517; E; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 598; P II n. 56; V.D; V.Z; K.F; Un 32; BN II; BN VIII; Bar; MM; Gr.
- Rhynchostegium curvisetum** Schpr = **Rhynchostegiella curviseta** (Brid.) Limpr.
- Rhynchostegium megapolitanum** (Bland.) Br. eu. (ook Schpr; Hypnum megapolitanum Bland.; Eurhynchium megapolitanum B. et Sch.) — Dz. L I; Lac. B; En III; M; Nijm I n. 830; P I n. 1375; Lac. Am; E; Ov I; NKA X p. 382; Camp II n. 599; P II n. 55; V.D; V; Un 35; Acht; Un 39; BN VIII.
- Rhynchostegium murale** (Neck.) Br. eu. (ook Schpr; Hypnum murale Neck. of Hedw.; Eurhynchium murale B. et Sch.) — Dz L I; Dz L II; Ut n. 40; En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1376; Lac. Am; Lac. L; NKA VI p. 239; E; Ov I; Nijm II n. 964; P II n. 54; Un 32; Fr; Gr.
- Rhynchostegium rotundifolium** (Scop.) Br. eu. — leg. et det. V. Westhoff, 1941, Heerlen. Zie op Hypnum intertextum.
- Rhynchostegium rusciforme** Schpr (ook B.S.) = **Platyhypnidium rusciforme** (Neck.) Fleisch.
- Rhynchostegium speciosum** Brid. = **Oxyrrhynchium speciosum** (Brid.) Warnst.
- Rhynchostegium Teesdalii** Schpr is een verkeerde opgave voor **Rhynchostegiella curviseta** (Brid.) Limpr.
- Rhynchostegium tenellum** Schpr = **Rhynchostegiella algeriana** (Brid.) Broth.
- Rhytidiadelphus loreus** (Dill., L.) Warnst. (Hypnum loreum L.; Hylocomium loreum Schpr) — Boerh p. 20 n. 12; GZ n. 574; Meese n. 462; Gort Belg n. 875 en n. 876; G VII n. 916 en 918; FBS n. 48; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 816; P I n. 1349; NKA III p. 173; Lac. L; Hol n. 1349; E; Ov I; Nijm II n. 947; P II n. 1; Add; K.F; Un 34; Acht; BN VIII; Bar; BN IX.

- Rhytidiadelphus squarrosus** (L.) Warnst. (*Hypnum squarrosus*; L.; *Hylocomium squarrosus* Schimp.) — Meese n. 462 (als β); Gort Belg n. 875 (als β); G VII n. 916 (als β); Ehrh.; FBS n. 49; Dz L I; Ut n. 28; En II; Cat I; Beek; M; Hov I; Nijm I n. 817; Camp I n. 560; P I n. 1352; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1352; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 949; Camp II n. 578; P II n. 3; Add; Un 25; Un 26; Nat; V.S; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; K.M; S; Un 32; Fr; Un 33; BN II; Un 34; Un 35; Un 36; Blok; Un 37; Un 39; NKA L p. 299; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; Gr.
- Rhytidiadelphus triquetrus** (L.) Warnst. (*Hypnum triquetrum* L.; *Hylocomium triquetrum* Schimp.) — Meese n. 459; Gort Belg n. 865; Zut n. 507; G VII n. 905; Mul p. 104; FBS n. 47; Dz L I; Dz L II; Ut n. 27; En II; Cat I; M; Nijm I n. 815; Camp I n. 555; P I n. 1348; Trap; NKA IV p. 244; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Hol n. 1348; E; Ov I; NKA X p. 381; Nijm II n. 948; Camp II n. 579; P II n. 2; Un 26; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 29; Fr; BN II; Un 35; Acht; BN VIII; Bar; BN IX.
- Rhytidium rugosum** (Ehrh.) Kindb. (*Hypnum rugosum* Ehrh.) — Linn. Syst. plant. IV p. 485 (volgens FBS p. 77 heeft deze opgave betrekking op Halland in Zweden); Geuns n. 72; Dz L I; En II; M; P I n. 1360; E; Ov I; P II n. 20; V.D; BN VIII.
- Schistidium apocarpum* B. et Sch. = *Grimmia apocarpa* (L.) Hedw.
- Schistidium ciliatum* Brid. = *Hedwigia albicans* (Web.) Lindb.
- Scleropodium caespitosum** (Wils.) Br. eu. (ook Schpr; *Hypnum caespitosum* Wils.) — Bu; NKA V p. 397; Ov I; P II n. 68; Un 32.
- Scorpidium scorpioides** (L.) Limpr. (*Hypnum scorpioides* L.) — FBS n. 67; Ut n. 39; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1359; Hol n. 1359; E; Hov II; Ov I; P II n. 6; Add; NKA XII p. 45; Un 26; V.D; K.F; Un 28; S; Un 34; Un 39; BN VIII; NKA LII; Pl.
- Seligeria tristicha* B. et Sch. (*Grimmia tristicha* Schw.) staat in Cat. I; M; P I n. 1547; maar vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V, 4, p. 290. Is volgens BUSE in NKA V p. 397 *Gymnostomum calcareum* N.H., d.i. *Gyroweisia tenuis* (Schrad.) Schimp.
- Sphaerangium muticum* Schpr = *Acaulon muticum* (Schreb.) C. Müll.
- Sphagnum.** De *Sphagna* uit P I vindt men dikwijls terug onder andere soorten in P II; terwijl deze door de revisie van VAN DER WIJK in het herbarium vaak weer onder geheel andere namen terecht zijn gekomen.
- Sphagnum acutifolium** Ehrh. (*Sph. capillifolium* Ehrh. of Hedw.; *Sph. subulatum* Brid.: *Sph. tenue* Nees) — Meese n. 435 β (als *Sph. palustre* β); Gort Belg n. 832 (als *Sph. palustre* β); G VII

- n. 862 (als *Sph. palustre* β); Geer n. 82; FBS n. 165; Dz L I; En IV; Cat I; M; P I n. 1576 en 1577; NKA IV p. 244; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; Hol n. 1576; NKA VI p. 239; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1048; P II n. 320; Add; K.F; Un 28; Pol; S; Bey; Fr; Un 33; Un 34; Nop; Acht; Blok; BN VIII; Bar; Na; Gr; Ver. Am.
- var. *patulum* Schpr — Nijm II n. 1048; P II n. 320.
- var. *roseum* — Un 28.
- var. *viride* Warnst. — Un 28.
- Sphagnum amblyphyllum* Russ. = *Sph. recurvum* var. *amblyphyllum*.
- Sphagnum angustifolium* Jens. = *Sph. recurvum* var. *amblyphyllum* fm. *parvifolium* Sendtn.
- Sphagnum aquatile* Warnst. — Bey zonder opgave van inlandse vindplaatsen; door v. d. WIJK onderscheiden in Herb. N.B.V.
- Sphagnum auriculatum* Schimp. — Un 25; K.F; Un 32; Bey; Un 33; Un 34; Un 36; Un 39; NKA L p. 233; BN VIII; Bar; Un 41.
- Sphagnum capillifolium* Hedw. = *Sph. acutifolium* Ehrh.; maar de ex. uit P I vindt men in P II onder verschillende soorten terug, evenals van var. *tenuë*.
- Sphagnum centrale* C. Jens. = *Sph. subbicolor* Hampe
- Sphagnum compactum* D.C. (ook Brid.; *Sph. rigidum* Schimp.) — FBS n. 167; Ut n. 101; M; Nijm I n. 894; P I n. 1572; NKA V,2, p. 292; Hol n. 1572; NKA VI p. 197, 239; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1044; P II n. 312; Add; NKA XII p. 45; Un 25; V.Z; K.F; Bey; Fr; Un 33; Un 34, Un 36, Un 38, Un 39, NKA L p. 233; BN VIII; BN IX; Un 41; Pl.
- var. *robustum* C. Müll. — Hov II.
- var. *squarrulosum* Russ. — Bey.
- Sphagnum contortum* Schultz — Cat I; M; NKA II p. 112; P I n. 1574 β ; P II n. 310 var.; Bey; Acht.
- fm. *inundatum* — Bey.
- fm. *majus* — Bey.
- Sphagnum contortum* var. *denticulatum* Dozy et Molk. in NKA II p. 112 staat in P I als vormen van *Sph. subsecundum* en behoort tot verschillende „soorten” uit de *subsecundum*-groep.
- Sphagnum contortum* var. *rufescens* Nees = *Sph. rufescens* Br. germ.; maar de meeste opgaven zijn verkeerd.
- Sphagnum crassycladum* Warnst. — Bey; Un 34; Un 36; BN VIII.
- Sphagnum crassycladum* var. *obesum* = *Sph. obesum* Warnst.
- Sphagnum cuspidatum* Ehrh. — FBS n. 166; Dz L II; En IV;

- Cat I; As; M; P I n. 1578; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; NKA VI p. 197; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; P II n. 316; Add; NKA XII p. 46; K.F; Pol; S; Un 32; Bey; Un 33; Un 34; Nop; Un 36; Un 38; Un 39; NKA L p. 233; BN VIII; BN IX; Un 41; Pl. var. *falcatum* — Bey.
 fm. *plumosum* Schpr (ook Nees) — Cat I; M; NKA II p. 112; P II n. 316 var.; Bey; Bar; Pl.
 fm. *serratulum* — Bey.
 fm. *submersum* Schpr — Lac. Am; Bey.
Sphagnum cuspidatum var. *recurvum* Wils. = *Sph. recurvum* P. de Beauv.
Sphagnum cymbifolium Ehrh. (ook Dillen of Brid.) = *Sph. palustre* L.
Sphagnum fimbriatum Wils. — MDk; NKA IV p. 242; NKA V p. 87; Lac. Am; NKA VI p. 239; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1046; P II n. 318; V.S; K.F; Un 28; S; Bey; Un 33; BN II; Acht; Un 36; Blok; Un 39; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; Gr.
 fm. *squarrulosum* H. Müll. — K.F.
Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. = *Sph. recurvum* P. de Beauv. met var. *amblyphyllum* Russ.
Sphagnum flexuosum var. *recurvum* Dozy et Molk. = *Sph. recurvum* P. de Beauv. var. *amblyphyllum* Russ.
Sphagnum fuscum v. Klinggr. — N II; Bey; BN VIII.
Sphagnum Girgensohnii Russ. — NKA VI p. 107 (verkeerde opgave).
Sphagnum hakkodense Warnst. — Door v. D. WIJK onderscheiden in herb. N.B.V.
Sphagnum imbricatum Hornsch. — Slechts subfossiel bekend in veenmonsters uit boringen; Pol; Nop.
Sphagnum inundatum Russ. — N I; Un 28?; Bey; Un 36; Un 39; BN VIII; Bar.
 var. *aquatile* (Warnst.) Paul = *Sph. aquatile* Warnst.
 var. *hercynicum* (Warnst.) Paul — Bey (zonder opgave van inlandse ex.).
Sphagnum latifolium Hedw. = *Sph. palustre* var. *latifolium* (Hedw.).
Sphagnum magellanicum Brid. (*Sph. medium* Limpr.) — V.S; K.F; Bey; Un 33; Acht; Un 36; Un 38; Bar; Pl.
 fm. *immersum* Warnst. — Bey.
 fm. *plumosum* Russ. — Bey.
Sphagnum medium Limpr. = *Sph. magellanicum* Brid.
Sphagnum molle Sulliv. (*Sph. Mülleri* Schimp.) — NKA V

- p. 420; Hol zonder nr.; NKA VI p. 202, 239; E; Hov. II; Ov I; Nijm II n. 1043; P II n. 311; K.F; Bey; Fr; Un 33; Un 38; BN VIII; Un 41.
- Sphagnum molluscum* Bruch = *Sph. tenellum* Lindb.
- Sphagnum Mülleri* Schimp. = *Sph. molle* Sulliv.
- Sphagnum obesum*** Warnst. (*Sph. crassycladum* var. *obesum*) — N I; zie Bey; Un 33; Bar; Pl.
- Sphagnum obtusifolium* Ehrh. = *Sph. palustre* L. var. *obtusifolium* (Ehrh).
- Sphagnum palustre*** L. (*Sph. cymbifolium* Ehrh. of Dill. of Brid.) — Comm. p. 76?; GZ n. 577; Meese n. 435; Gort Belg n. 832; Zut n. 494; G VII n. 862; Mul p. 101; FBS n. 163; Dz L I; Ut n. 100; En IV; Cat II; Beek; As; M; Hov I; Nijm I n. 890; P I n. 1570; NKA IV p. 244; Lac. Am; NKA V,2, p. 292; NKA VI p. 197, 202; E; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1041; P II n. 308; Un 25; Nat; V.S; K.F; Un 28; Pol; S; Bey; Fr; Un 33; Un 34; Nop; Acht; Un 36; Blok; Un 38; Un 39; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Un 41; Na; MM; Gr.
- var. *congestum* Schpr — P II n. 308.
- fm. *glaucescens* — Bey.
- var. *latifolium* (Hedw.) — Hol n. 1570; Nijm II n. 1041.
- var. *obtusifolium* (Ehrh.) — Hov. II; Nijm II n. 1041.
- var. *pycnocladum* Mart. — E; Hov II; Nijm II n. 1041.
- var. *squarrulosum* Br. germ. (ook Nees) — Nijm II n. 1041; K.F; Un 28.
- Sphagnum papillosum*** Lindb. (*Sph. cymbifolium* var. *papillosum* Schpr) — P II n. 308 var.; K.F; Pol; S; Un 32; Bey; Un 33; Nop; Acht; Un 36; Un 38; BN VIII; Un 40; Pl.
- var. *normale* Warnst. — K.F.
- var. *sublaeve* Warnst. — K.F; Bar.
- Sphagnum platyphyllum*** Warnst. — Bey.
- Sphagnum plumulosum*** Roell. — K.F; S; Un 32; Bey; Un 33; Blok; BN VIII; Un 40; Bar; Un 41; MM; Gr.
- fm. *laxifolium* Warnst. — Bey.
- Sphagnum pulchrum*** Warnst. — door v. d. Wijk onderscheiden in Herb. N.B.V.
- Sphagnum recurvum*** P. de Beauv. (*Sph. flexuosum* Dozy et Molk., *Sph. cuspidatum* var. *recurvum* Wils.) — P I n. 1575; NKA III p. 236, 489; NKA IV p. 244; NKA VI p. 197; Hov II; Ov I; NKA VIII p. 425; Nijm II n. 1045; P II n. 317; Un 25; V.S; K.F; Pol; S; Bey; Un 33; Un 34; Nop; Acht; Un 39; Bar; Pl; Ver. Am; MM; Gr.

- var. *amblyphyllum* Russ. (*Sph. amblyphyllum* Russ.) — P I n. 1575 β ; K.F; Un 33; Gr.
- var. *amblyphyllum* fm. *parvifolium* (Sendtn.) — V.S; Bey.
- var. *mucronatum* (Russ.) Warnst. — Bey (ook fm. *parvulum* Warnst.); Un 39; BN VIII; Na.
- fm. *parvulum* Warnst. — V.S; BN VIII.
- Sphagnum rigidum* Schpr (met var. *compactum*) — *Sph. compactum* D.C.
- Sphagnum rubellum*** Wils. — NKA V p. 420; Hol zonder nr; E; Hov II (als *Sph. rebellum* Wils.); Ov I; Nijm II n. 1047; P II n. 319; K.F; Un 28; Bey; Acht; Bar; Pl.
- fm. *immersum* Schlieph. — Bey.
- Sphagnum rufescens*** Br. germ. (*Sph. contortum* var. *rufescens* Nees) — NKA II p. 112 (verkeerd); P I n. 1574 γ ; P II n. 310 var.; Un 28 γ ; Bey; Un 38.
- Sphagnum squarrosum*** Pers. (ook W. et M.) — FBS n. 164; Dz L I; En IV; Cat II; MDk; M; Hov I; Nijm I n. 892; P I n. 1571; NKA IV p. 244; NKA V p. 76; Lac. Am; Hol n. 1571; E; Hov II; Ov I; P II n. 315; V.S; K.F; Un 28; Pol; S; Bey; Fr; Un 33; Un 34; Acht; Un 36; Blok; BN VIII; Un 40; Bar; BN IX; Na; Pl; MM; Gr.
- fm. *hydrophilum* Warnst. — Bey.
- fm. *immersum* Warnst. — Bey.
- var. *squarulosum* Schpr — P II n. 315 var.
- Sphagnum subbicolor*** Hampe (*Sph. centrale* C. Jens.) — door v. D. Wijk onderscheiden in Herb. N.B.V.
- Sphagnum subsecundum*** Nees — M; NKA II p. 112; P I n. 1574; NKA V,2, p. 292; Hol n. 1574; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1042; P II n. 310; K.F; Un 28 γ ; Pol; Bey; Un 34; Acht; Un 36; BN VIII; Un 41; Na?
- fm. *robustum* Warnst. — K.F.
- var. *contortum* Rabenh. (ook Schpr) = *Sph. contortum* Schultz
- var. *denticulatum* Dozy et Molk. behoort tot diverse soorten van de subsecundum-groep, evenals de var. *fluitans* Hampe
- var. *rufescens* Rabenh. (ook Schpr) = *Sph. rufescens* Br. germ.
- var. *turgidulum* Müll. = *Sph. turgidulum* Warnst.
- Sphagnum subtile*** Warnst. — door v. D. Wijk onderscheiden in Herb. N.B.V.
- Sphagnum subulatum* Brid. = *Sph. acutifolium* Ehrh.
- Sphagnum tenellum*** Lindb. (*Sph. molluscum* Bruch) — NKA II p. 112; P I n. 1573; NKA III p. 236; Ov I; P II n. 309; Un 25; K.F; Bey; Un 34; Acht; Un 36; BN VIII; Pl.
- fm. *hydrophilum* Warnst. — Bey.

- fm. immersum Schimp. — Bey.
- Sphagnum tenerum** Warnst. — door v. d. WIJK onderscheiden in Herb. N.B.V.
- Sphagnum tenue* Nees = *Sph. acutifolium* Ehrh.
- Sphagnum teres** Aongstr. — NKA V p. 420; Ov I; P II n. 314; K.F; Un 28; S; Bey; Blok.
- var. *subteres* — Un 28.
- Sphagnum turgidulum** Warnst. — P I n. 1574δ; Hov II; Un 34; Un 36; BN VIII.
- Sphagnum Wulfianum* Girens. (ook Wulff) — Ov I; P II n. 313.
- Volgens v. d. WIJK zijn de ex. *Sph. recurvum* var. *parvulum*.
- Splachnum ampullaceum** L. — FBS n. 152; M; P I n. 1559; Bu; Ov I; P II n. 177; NKA XIII p. 608; Fr.
- Stroemia obtusifolia** (Schrad.) Hag. (*Orthotrichum obtusifolium* Schrad.) — FBS n. 107; Dz L II; Lac. B; En III; Cat I; M; Nijm I n. 855; P I n. 1479; Lac. Am; Ov I; Nijm II n. 1012; P II n. 194.
- Syntrichia laevipila* Brid. = *Tortula laevipila* (Brid.) de Not.
- Syntrichia ruraliformis* = *Tortula ruralis* (L.) Ehrh. var. *arenicola* Braithw.
- Syntrichia ruralis* Brid. = *Tortula ruralis* (L.) Ehrh.
- Syntrichia subulata* Brid. (ook Schultz of Web. et Mohr) = *Tortula subulata* (L.) Hedw.
- Systegium crispum* Schimp. = *Astomum crispum* (Hedw.) Hampe
- Tetraphis pellucida* Hedw. = *Georgia pellucida* (L.) Rabenh.
- Thamnum alopecurum** (L.) Br. eu. (ook Schpr of B. et Sch.; *Hypnum alopecurum* L.) — G VII n. 920; FBS n. 42; Dz L II; En II; Lac. B; Cat I; M; Nijm I n. 811; Camp I n. 543; P I n. 1394; Lac. Am; Lac. L; Ov I; Camp II n. 601; P II n. 52; V.D; Fr; BN VIII; Bar.
- fm. *irregularis* Loeske — W.
- Thuidium abietinum** B. et Sch. = *Abietinella abietina* (Dill., L.) C. Müll.
- Thuidium Blandowii** B. et Sch. = *Helodium lanatum* (Stroem.) Broth.
- Thuidium delicatulum** (Dill., L.) Mitt. (ook Schpr) — Lac. L; Bu; NKA VI p. 239 (alle verkeerde opgaven volgens BN III); NKA LI p. 419; BN IX.
- Thuidium Philiberti** Limpr. — BN III; BN VIII; BN IX.
- Thuidium recognitum** (L., Hedw.) Lindb. (ook Schpr; *Hypnum tamariscinum* var. *recognitum* Hedw.) — Ehrh.?; Geuns n. 73?; FBS n. 58 var. β ; M; P I n. 1338 β ; Ov I; Garj M; BN III; BN VIII.

- Thuidium tamariscinum** (Hedw.) Br. eu. (*Hypnum tamariscinum* Hedw.) — Boerh. p. 20 n. 22; GZ n. 575; Gort Belg n. 868; G VII n. 908; Ehrh?; Geuns n. 73?; FBS n. 58; Wtt; Dz L I; Ut n. 35; En II; Cat II; Beek; M; Nijm I n. 824; Camp I n. 545; P I n. 1338; NKA III p. 173; Bu; NKA VI p. 202; E; NKA VII p. 124; Ov I; Nijm II n. 977; Camp II n. 609; P II n. 86; Add; Nat; V.S; V.D; K.F; V; Un 28; J.L; Fr; BN II; Un 34; Acht; Un 36; Blok; BN III; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX; Na.
- Tomenthypnum nitens** (Schreb.) Loeske (*Hypnum nitens* Schreb.; *Brachythecium nitens* Buse; *Camptothecium nitens* Schpr; *Camptothecium trichodes*) — Ehrh; Geuns n. 79; FBS n. 53; M; P I p. 4; NKA IV p. 42, 64; NKA V p. 87; Bu; Ov I; P II n. 77; Pol; Nop; Pl.
- Tortella flavovirens** (Bruch) Broth. (*Trichostomum flavovirens* Bruch; *Barbula inclinata* Schwgr.; *Tortella inclinata* (Hedw.) Limpr.) — DMb I; DMb II; M; P I n. 1510; NKA VI p. 22; Hol zonder nr; E; Ov I; P II n. 240; Nat; V.D; V; BN VIII; Bar; BN IX.
- Tortella fragilis** (Drumm.) Limpr. (*Barbula fragilis* Wils.; B. Drummondii Mitt.) — NKA V p. 398; E; Ov I; P II n. 226; V.D.
- Tortella inclinata** (Hedw.f.) Limpr. = *T. flavovirens* (Bruch) Broth.
- Tortella tortuosa** (L.) Limpr. — BN II.
- Tortula aestiva** (Brid.) Pal. (*Barbula muralis* var. *aestiva* Schultze; ook B. et Sch.) — En II; Lac. B; Cat II; M; P I n. 1504; Camp II n. 642 var.; P II n. 234 var.; K.F; Un 32; BN VIII.
- Tortula laevipila** (Brid.) de Not. (*Syntrichia laevipila* Brid.; *Barbula laevipila* Brid. of v. Hall of B. et Sch.) — FBS n. 123; Dz L I; Ut n. 76; En II; Lac. B; Cat I; Cat II (β *mutica*); M; Nijm I n. 868; Camp I n. 577; P I n. 1502; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 492; E; Ov I; NKA VIII p. 424; Nijm II n. 1024; Camp II n. 645; P II n. 222; Un 26; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; W; Un 32; Fr; BN II; Un 35; Un 37; BN VIII; Bar; BN IX; Gr.
- var. *pagorum* Husnot — Un 28; BN II; BN VIII.
- Tortula latifolia** Bruch (*Barbula latifolia* B. et Sch.) — Lac. B; DMb I; Cat II; M; P I n. 1503; Lac. Am; Bu; NKA VI p. 239; Ov I; Nijm II n. 1022; P II n. 221; Un 32; BN IV.
- Tortula marginata** (Br. eu.) Spruce (*Barbula marginata* B. et Sch.) — Lac. L; Ov I; P II n. 235.
- Tortula montana** (Nees) Lindb. (*Barbula intermedia* Wils.; B. *ruralis* β *rupestris* Br. eu.) — P I n. 1501 β ; Hol zonder nr; Ov I; P II n. 219.

Tortula mucronulata Sw. = *Barbula unguiculata* (Huds.) Hedw.

Tortula muralis (L.) Hedw. (*Bryum murale* L.; *Barbula muralis* Hedw. of Brid. of Timm) — Meese n. 450; Gort Belg n. 848; G VII n. 885; Mul p. 103; FBS n. 126; Dz L I; Ut n. 78; En II; Cat I; M; Nijm I n. 870; Camp I n. 575; P I n. 1504; Trap; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 490; Hol n. 1504; NKA VI p. 201; E; Ov I; Nijm II n. 1027; Camp II n. 642; P II n. 234; Un 25; Nat; V.D; V.Z; K.F; V; Un 28; Un 29; W; Un 32; Fr; Un 33; Un 35; Un 36; Blok; Un 37; Un 38; BN VI; Un 39; BN VIII; Bar; Un 41; MM; Gr.

var. *incana* Br. eu. — Cat II; M; P I n. 1504 β ; Lac. Am; P II n. 234 var.; K.F; W; Bar.

var. *rupestris* Schultz — Cat II; M; P I n. 1504 δ ; Lac. Am; P II n. 234 var.; BN VIII.

Tortula obtusifolia Schleich. Zie bij *Desmatodon flavicans*.

Tortula papillosa Wils. (*Barbula papillosa* Wils.) — NKA V p. 304; Bu; NKA VI p. 197, 239; Ov I; NKA VIII p. 424; NKA X p. 382; Nijm II n. 1023; Camp II n. 646; P II n. 217; K.F; V; Un 35; Blok; Un 38.

Tortula pulvinata (Jur.) Limpr. (*Barbula pulvinata* Jur.; *B. intermedia* Wils. var. *pulvinata* Milde) — Camp II n. 648; P II n. 218; Un 35.

Tortula ruraliformis = *T. ruralis* (L.) Ehrh. var. *arenicola* Braithw.

Tortula ruralis (L.) Ehrh. (*Bryum rurale* L.; *Barbula ruralis*^s Hedw.; *Syntrichia ruralis* Brid.) — GZ n. 571; Meese n. 449; Gort Belg n. 847; Zut.n. 500; G VII n. 884; Mul p. 103; FBS n. 122; Dz L I; Ut n. 75; En II; Cat II; M; Nijm I n. 867; Camp I n. 578; P I n. 1501; NKA IV p. 237; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 491; Hol n. 1501; NKA VI p. 201; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1021; Camp II n. 647; P II n. 220; Add; V.D; V.Z; K.F; W; Un 32; Fr; NKA XLVI p. 201; Un 38; BN VIII; Bar; BN IX; Pl; Gr.

var. *arenicola* Braithw. (*Syntrichia ruraliformis*; *Tortula ruraliformis*) — V.D; K.F; V; BN II; Un 35; Un 37; NKA L p. 314; BN VIII; Bar.

Tortula subulata (L.) Hedw. (*Bryum subulatum* L.; *Barbula subulata* Brid. of Schultz; *Syntrichia subulata* Brid. of Schultz of Web. et Mohr) — Comm p. 77; GZA n. 647; Meese n. 448; Gort Belg n. 846; G VII n. 883; FBS n. 121; Dz L I; Ut n. 74; En II; Cat I; M; Hov I; Nijm I n. 866; Camp I n. 576; P I n. 1505; Trap; NKA IV p. 237; NKA V p. 73; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 493; Hol n. 1505; E; Hov II; Ov I; Nijm II n. 1025; Camp II

- n. 644; P II n. 223; Add; V.D. V.Z; K.F; V; Un 28; W; Fr; Un 35; Un 37; BN VIII; Bar; BN IX.
 var. *angustata* — Un 28.
- Trematodon ambiguus** (Hedw.) Hornsch. (ook Brid.) — NKA IV p. 481; Bu; Ov I; P II n. 288.
- Trichodon tenuifolius** (Schr.) Lindb. = *Trichodon cylindricus* Schpr — Garj. M. Bewijsmateriaal ontbreekt.
- Trichostomum canescens** Hedw. (ook Timm) = *Rhacomitrium canescens* (Weis, Timm) Brid.
- Trichostomum cylindricum** (Bruch) C. Müll. (*Didymodon cylindricus* B. et Sch.) — Cat II; M; P I n. 1524; Lac. Am; Ov I; P II n. 242.
- Trichostomum ericoides** Schrad. = *Rhacomitrium canescens* var. *ericoides* (Web.) Br. eu.
- Trichostomum flavovirens** Bruch = *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth.
- Trichostomum homomallum** B. et Sch. (ook Sw.) = *Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hampe
- Trichostomum lanuginosum** Hedw. = *Rhacomitrium hypnoides* (L.) Lindb.
- Trichostomum limosum** Dozy et Molk. = *Didymodon tophaceus* (Brid.) Jur. var. *brevifolius* (Br. eu.) Limpr.
- Trichostomum mutabile** B. et Sch. bij M en in P I en vermoedelijk ook in Lac. Am is een verkeerde determinatie voor *Barbula unguiculata* (Huds.) Hedw.
- Trichostomum pallidum** Hedw. = *Ditrichum pallidum* (Schleich.) Hampe
- Trichostomum rigidulum** Sm. = *Barbula rigidula* (Hedw.) Mitt.
- Trichostomum rubellum** Rabenh. = *Didymodon rubellus* (Hoffm.) Br. eu.
- Trichostomum tophaceum** Brid. = *Didymodon tophaceus* (Brid.) Jur.
- Trichostomum tortile** Schrad. var. *pusillum* B. et Sch. = *Didymodon tortile* (Schr.) Lindb. var. *pusillum* (Hedw.) Limpr.
- Ulota Bruchii** Hornsch. (*Orthotrichum coarctatum* P.B.) — DMb II; Cat I; Beek; M; P I n. 1487; NKA III p. 174; E; Ov I; Nijm II n. 1014; P II n. 200; V.D; Bar.
 P I n. 1487 noemt een var. *dilatatum*, waarvan men de ex. in P II terug vindt bij *Ulota ulophylla*.
- Ulota crispa** Brid. = *Ulota ulophylla* (Ehrh.) Broth.
- Ulota crispula** Bruch (*Orthotrichum crispulum* Hornsch.) — Cat I; M; P I n. 1489; E; Ov I; P II n. 198; Bar.
- Ulota Ludwigii** (Brid.) Brid. (*Orthotrichum Ludwigii* Hornsch.,

- ook Schwgr.) — DMb II; Cat I; M; P I n. 1478; Ov I; P II n. 201; Add.
- Ulota phyllantha** Brid. (*Orthotrichum jutlandicum* Brid.; *O. phyllanthum* B. et Sch.) — Dz L II; Lac. B; En III; Cat I; M; P I n. 1495; NKA IV p. 238; Lac. Am; E; Ov I; P II n. 197; V.D; K.F; W.
- Ulota ulophylla** (Ehrh.) Broth. (*Bryum striatum* L. var. *ulophyllum* Ehrh.; *Orthotrichum crispum* Hedw.; *Ulota crispa* Brid.) — Geuns p. 74; FBS n. 108; Wtt (is *U. Bruchii* volgens P II, zoals reeds MOLKENBOER in Beek vermoedde); Dz L I; En II; Cat II; M; Nijm I n. 856; P I n. 1488; Trap; Lac. Am; E; Ov I; Camp II n. 638; P II n. 199; Add; Un 25; V.D; V.Z; Fr; Un 39; BN VIII; Bar; BN IX.
- var. *intermedia* — BN VIII.
- Webera albicans** Schimp. = *Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr.
- Webera annotina** (Hedw.) Bruch apud Broth. (ook Schwaegr.; *Bryum annotinum* Hedw. — beter Leers —; *Br. decipiens* D.C.; *Mnium annotinum* L.; *Pohlia annotina* (Leers) Lindb.) — Geuns n. 70; FBS n. 90; En II (door v. d. BOSCH in zijn eigen ex. door-geschrapd en = *Bryum badium* er achter gezet); Cat I; M; P I n. 1439; NKA V p. 76; Bu; Hol n. 1439; NKA VI p. 202; E; Ov I; P II n. 166; V.Z; V; BN III; NKA L p. 218, 220, 233, 236, 242, 247, 252, 259; Pl.
- var. *erecta* Corr. — Fr.
- Webera bulbifera** Warnst. (*Pohlia bulbifera* (Warnst.) Warnst.) — BN III.
- Webera carnea** Schpr. = *Mniobryum carneum* (L.) Limpr.
- Webera cruda** (L.) Bruch (ook Schimp.; *Mnium crudum* L.; *Bryum crudum* Schreb.) — Meese n. 443; Gort Belg n. 840; G VII n. 874; Mul p. 102; FBS n. 92; Dz L II (volgens P I *Webera nutans* var. *longiseta*); Cat I; M; NKA VI p. 22; Ov I; P II n. 167.
- Webera elongata** (Hedw.) Schwaegr. — NKA VI p. 308; Ov I; P II n. 169.
- Webera grandiflora** (Harald Lindb.) J. et W. (*Pohlia grandiflora* H. Lindb.; *Webera annotina* (Hedw.) Bruch apud Auct. plur. non Broth.) — BN III.
- var. *decipiens* Loeske — BN III.
- Webera Ludwigii** (Spreng.) Schimp. (*Bryum Ludwigii* Spreng.) staat in P I n. 1438, maar vervalt als inlands volgens BUSE in NKA V,4, p. 290.
- Webera nigricans** Buse in NKA V p. 309 is volgens BUSE synoniem

met *Bryum nigricans* Dicks.; deze is volgens LIMPRICHT II p. 436 synoniem met *Bryum turbinatum* (Hedw.) Schwaegr. en volgens LIMPRICHT III p. 732 met *Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr., onder welke laatste soort men de ex. van BUSE in P II terug vindt.

Webera nutans (Schreb.) Hedw. (*Bryum nutans* Schreb., ook Web.; *Pohlia nutans* (Schreb.) Lindb.) — FBS n. 101; Dz L I; Lac. B; En IV; Cat II; M; P I n. 1436; NKA IV p. 243; NKA V p. 76; Lac. Am; Lac. L; Delf n. 500; Hol n. 1436; NKA VI p. 197, 202, 239; E; Ov I; P II n. 168; Un 25; Nat; V.S; V.D; K.F; V; Un 28; W; S; Un 33; Acht; Un 36; Blok; Un 38; BN VI; BN VIII; NKA L p. 259, 260; Bar; BN IX; Un 41; MM; Gr. var. *caespitosa* (H. et H.) Hüben. (ook Schpr) — P I n. 1436 β ; Lac. Am; P II n. 168 var. De opgave in DMb II is volgens P I en P II var. *longiseta*.

LIMPRICHT noemt var. *caespitosa* uitsluitend eigen aan alpine en subalpine streken; volgens MOENKEMEYER ook in de Duitse Middelgebergten.

var. *longiseta* (Brid.) Hüben. — P I n. 1436 γ ; P II n. 168 var.; BN VIII.

var. *sphagnetorum* Schimp. — M; P I n. 1437 γ ; P II n. 168 var.; V.S; Un 33.

fm. *sphagnicola* — Bar.

var. *strangulata* (Nees) Schimp. — P I n. 1436 δ ; maar in P II weer ingetrokken.

Webera polymorpha (H. et H.) Schimp. — Zie bij *Bryum polymorphum* B. et Sch.

Webera proligera (Lindb.) Kindb. (*Pohlia proligera* S.O. Lindb.) — BN III.

Webera pulchella (Hedw.) Schimp. — Zie bij *Bryum pulchellum* Hedw.

Webera sphagnicola (Br. eu.) Schimp. Zie bij *Bryum Sphagni* Brid.

Weisia cirrhata Hedw. = *Dicranoweisia cirrata* (L.) Lindb.

Weisia controversa Hedw. = *W. viridula* (L.) Hedw.

Weisia curvirostra Brid. (ook Hedw.) = *Didymodon rubellus* (Hoffm.) Br. eu.

Weisia lanceolata Hook. = *Pottia lanceolata* (Hedw.) C. Müll.

Weisia mucronata B. et Sch. = *W. rutilans* (Hedw.) Lindb.

Weisia rutilans (Hedw.) Lindb. (*W. mucronata* B. et Sch.; *Hymenostomum rutilans* Nees) — Cat. II (v. D. SANDE LACOSTE schrijft 6 Mei 1847 aan MOLKENBOER, dat het *H. microstomum* is); P I n. 1550 (ex. van FRANQUINET, door ons niet in diens herbarium terug gevonden).

Weisia viridula (L.) Hedw. (ook Brid.; *Bryum viridulum* L.; *Weisia controversa* Hedw.) — GZA n. 649; Gort Belg n. 856; G VII n. 893; FBS n. 146; Dz L I; Ut n. 92; En II; Lac B; Cat I; M; Nijm I n. 883; P I n. 1548; Lac. Am; Lac. L; E; Nijm II n. 1040; P II n. 291; Add; V.Z; Fr; BN IX.

Weissia = Weisia.

Zygodon viridissimus (Dicks.) R.Br. (ook Brid.) — Dz L II; Lac. B; En III (d.i. de *Dicranoweisia cirrata* uit En II); Cat I; M; Camp I n. 586; P I n. 1496; Trap; NKA IV p. 238; Lac. Am; E; Ov I; NKA VIII p. 424; Camp II n. 639; P II n. 202; V.D; V.Z; V; W; Un 32; BN VIII; Bar.

fm. *borealis* Corr. — K.F.

var. *occidentalis* (Correns) Malta — BN VIII.

fm. *Stirtoni* (Schimp.) Malta — BN VIII.

Lijst der gebruikte afkortingen; de titels zijn bekort en staan volledig in de lijst in NKA L p. 369—380 of hierachter p. 221.

AB	Annales Bryologici.
Acht	De bosvegetatie van de Achterhoek enz., door E. MEYER DREES, 1936.
Add	Aanvullingen op <i>Prodromus</i> Ed. II Vol. II Pars I, opgenomen achter Vol. II Pars II Ed. altera, 1898.
As	Schets der Flora van Abcoude's omstreken, door E. B. ASSCHER, 1848.
Bar	Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar, door J. J. BARKMAN, 1941.
Beek	Schets der Mos-vegetatie van het Beekbergerwoud, door J. H. MOLKENBOER, 1847.
Bey	Sphagnum en Sphagnetum, door W. BEYERINCK, 1933.
Blok	De flora van Blokzijl, door J. L. VAN SOEST, 1937.
BN	Bryologische Notities, door P. JANSEN en W. H. WACHTER.
Boerh	Index alter plantarum, door H. BOERHAAVE, 1720.
Brs	Een en ander over het geslacht <i>Madotheca</i> , door T. BROEKSMIT, 1929.
Bu	Additamentum ad floram batavam cryptogamicam, door L. H. BUSE, 1870.
Camp	Flora Campensis, Ed. I, 1849; Ed. II, 1890.
Cat	Catalogus Herbarii; I, 1846; II, 1847.
Comm	Catalogus Plantarum Indigenarum Hollandiae, door J. COMMELYN, 1709. Ed. secunda.
Delf	Flora Delfensis, 1868.

- DMb Bijdrage tot de Flora Cryptogamica van Nederland, door F. DOZY en J. H. MOLKENBOER; I (1844), II (1845), III (1846).
- Dz L I en II Bijdrage tot de Flora Leidensis, door F. DOZY, I (1841), II (1843).
- E Lijst der planten, die in de Nederlandsche Duinstreken gevonden zijn, door F. W. VAN EEDEN, 1874. Hierin is geen kennis genomen van de verbeteringen, door BUSE in vroegere delen van het NKA aangebracht.
- Ehrh Meine Reise nach der Grafschaft Bentheim enz., door J. F. EHRHART, 1783.
- En II, III, IV Enumeratio Plantarum enz., door R. B. v. D. BOSCH; II (1843); III (1845); IV (1846).
- FBS Flora Belgii Septentrionalis, Vol. II, Pars I, 1832.
- Fr De mossen van Jean Lambert Franquinet, door W. H. WACHTER, 1932.
- G VII Flora VII Provinciarum Belgii Foederati indigena, 1781.
- Garj. A Aanteekeningen over Limburgsche Levermossen, door A. J. M. GARJEANNE, 1911.
- Garj. Am Een zoutmos uit de omgeving van Amsterdam, door A. J. M. GARJEANNE, 1941.
- Garj. H Les Hépatiques des Pays-Bas, door A. J. M. GARJEANNE, 1903.
- Garj. L De Nederlandsche Levermossen, door A. J. M. GARJEANNE, 1906.
- Garj. M Mosflora van Nederland, door A. J. M. GARJEANNE, 1901. Alleen die soorten zijn opgenomen in de lijst, die niet in vroegere publikaties zijn vermeld.
- Garj. V Voorloopig overzicht der om Venlo gevonden levermossen, door A. J. M. GARJEANNE, 1927.
- Garj. V 2 Het ontstaan der Venlosche levermosflora, door A. J. M. GARJEANNE, 1928.
- Geer Plantarum Belgii Confoederati Indigenarum Spicilegium alterum, door J. L. G. DE GEER, 1814.
- Geuns Plantarum Belgii Confoederati Indigenarum Spicilegium, door S. J. VAN GEUNS, 1788.
- Gort Belg Flora Belgica, 1767.
- Gr Lijst van Blad- en Levermossen, om Amsterdam gevonden, door S. GROENHUYZEN, 1943.
- GZ Flora Gelro-Zutphanica, 1745.
- GZA Florae Gelro-Zutphanicae Appendix, 1757.

- Hol De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-Eilanden, door F. HOLKEMA, 1870. Verbeteringen hierop in NKA XI p. 324 (1895).
- Hov Flora van 's-Hertogenbosch, Ed. I (1848). Ed. II (1879).
- J.L. Einige Waldgesellschaften aus Holland enz., door J. JESWIET en W. C. DE LEEUW, 1933.
- K.F. Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung der Laubmoose in der Niederländischen Provinz Friesland, door D. KOOPMANS-FORSTMANN en A. N. KOOPMANS, 1928.
- K.M. De flora van het Oudemirdumer Klif, door D. KOOPMANS-FORSTMANN en A. N. KOOPMANS, 1932.
- Lac. Am. Eenige cryptogamische planten uit de omstreken van Amsterdam, door C. M. v. D. SANDE LACOSTE, 1860.
- Lac. B. Bijdrage tot de Bryologie van Nederland, door C. M. v. D. SANDE LACOSTE, 1844.
- Lac. H. Overzicht over de inlandsche Hepaticae, door C. M. v. D. SANDE LACOSTE, 1848.
- Lac. L. Lijst der mossen, gevonden op de excursie in Limburg, door C. M. v. D. SANDE LACOSTE, 1870.
- Loos Flora Harlemica, 1779.
- M. Overzicht van den tegenwoordigen toestand der Flora Bryologica Belgii Septentrionalis, door J. H. MOLKENBOER, 1848.
- MDk Mededeeling van J. J. F. H. T. MERKUS DOORNIK, in NKA I p. 462, 1848.
- Meese Flora Frisica, 1760.
- MM Mossen van het Twiskegebied, door Wim MARGADANT en Wim MEYER, 1942.
- Mul Elenchus plantarum, door N. MULDER, 1818.
- N I, II Naamlijst der Nederlandse Bladmossen, 1928 en Naamlijst der Nederlandse Levermossen, 1932. Alleen de „nieuwe” soorten zijn in de lijst opgenomen.
- Nat Lijst der mossen, gevonden in Zuid-Limburg, door R. v. D. WIJK en Fr. VERDOORN, 1926.
- NHG Mededeelingen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
- Nijm Flora Noviomagensis, 1848; is zeer onbetrouwbaar; geeft nog de namen van de FBS en heeft geen kennis genomen van werken na de FBS. Talrijke opgaven

- verschillen dan ook van de tweede druk: Flora van Nijmegen, 1891.
- NKA Nederlandsch Kruidkundig Archief.
- Na Het Naardermeer, door E. M. VAN ZINDEREN BAKKER, 1942.
- Nop De botanische samenstelling van een reeks veenmonsters uit den toekomstigen N.O. Polder, door B. POLAK, 1936.
- Ov I, II Overzicht der Mossoorten, door C. M. v. D. SANDE LACOSTE, 1882 en Overzicht der Levermossen, door id. 1882.
- P I en II Prodromus Florae Batavae, Vol. II Pars I, 1851 en Ed. II, 1893. ABELEVEN springt hierin heel raar met de auteursnamen om: geeft verschillende malen als auteur Prod. Ed. I, als deze b.v. Schultz of Brid. heeft.
- Pl Overzicht der plantengemeenschappen, door V. WESTHOFF, J. W. VAN DIJK en H. PASSCHIER, 1942.
- Pol Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche Veen, door B. POLAK, 1929.
- S Het Plantendek van de Krimpenerwaard IV, door A. SCHEYGROND, 1932.
- Trap Bijdrage tot de kennis aan Nederlands Flora, door J. E. v. D. TRAPPEN, 1852.
- Un Unio: Exkursies door de leden van de N.B.V.
- Ut Flora Rheno-Trajectina, Pars II, 1843.
- V De Mosflora van Meyendel, door J. VERSEVELDT, 1929.
- V.B Bijdrage tot de Nederlandsche Levermosflora, door Fr. VERDOORN, 1927.
- V.D Over de bladmossen der Hollandsche Duinen, door Fr. VERDOORN, 1927.
- V.L Determinatietabel der Nederlandsche Levermossen, door Fr. VERDOORN, 1930. Alleen die soorten zijn opgenomen, die niet vermeld zijn in vroegere publikaties.
- V.R Ueber Frullania nervosa Mont. enz., door Fr. VERDOORN, 1928.
- V.S Bryologische Aanteekeningen I (Soesterveen), door Fr. VERDOORN, 1926.
- V.Z Historisch overzicht der Zeeuwsche Floristiek, door Fr. VERDOORN, 1927.
- Ver. Am Het veenonderzoek, door G. G. VERMEER-LOUMAN, 1941.

- W De Musci en Hepaticae van Wieringen, door
D. KOOPMANS-FORSTMANN, A. N. KOOPMANS en
J. L. VAN SOEST, 1931.
- Wtt Het Beekbergerwoud, door J. WITTEWAALL, 1836.
- Zut Flora Zutphanica, 1781.

Aanvulling van de literatuurlijst in Bryologische Notities VII.

- BARKMAN, J. J.; Over de mosflora van de omgeving van Alkmaar.
N.K.A. 51 (1941) p. 302—339.
- BARKMAN, J. J.; Hoe zaait een mos zijn sporen uit? Amoeba 20
(1941).
- GARJEANNE, A. J. M.; Een zoutmos in de omgeving van Amsterdam.
Amsterdam Natuurhistorisch gezien. Gedenkboek 1941, p. 75,76.
- GROENHUYZEN, S.; Lijst van blad- en levermossen, om Amsterdam
gevonden. Med. v. h. Centraalinst. voor Flor. en Faunist. Onder-
zoek in Groot-Amsterdam. Sept. 1943 nr. 3, 4.
- HALL, H. C. VAN; Eenige waarnemingen over de duurzaamheid van
het leven bij sommige planten. Bijdragen tot de Natuurkundige
Wetenschappen, verzameld door H. C. van Hall, W. Vrolijk en
G. J. Mulder. VII (1832) en hierin vooral p. 133—137 over het
weer opleven van *Riccia glauca*, die enkele maanden gedroogd was.
- HALL, H. C. VAN; *Phascum patens* Hedw., Schwaegr., Brid., nieuw
voor de flora. Bijdragen tot de Nat. Wet. VII (1832) p. 346.
- JANSEN, P. en W. H. WACHTER; Bryologische Notities IX (mossen
van de Hunnebedden, varia, over een mossenverzameling van
M. Dassen). N.K.A. 51 (1941) p. 416—430.
- JANSEN, P. en W. H. WACHTER; *Bryum litorum* aan het IJsselmeer.
N.K.A. 51 (1941) p. 396—400.
- MARGADANT, Wim en Wim MEYER; Mossen van het Twiskegebied.
Med. v. h. Centraalinst. voor Flor. en Faun. Onderzoek in Groot-
Amsterdam. Nov. 1942 nr. 2.
- MEYER, Wim en Johan K. SCHENDELAAR; Levermossen. In Weer
en Wind VII (1943) p. 37—41, 187—190, 198—202, 238—244.
- SCHENDELAAR, Joh. K.; Duinmossen. In Weer en Wind V (1941)
p. 341—350.
- STOMPS, Th. J.; Het botanisch onderzoek van het Naardermeer.
Jaarb. Ver. tot behoud van Natuurmonumenten 1923—1928,
p. 134—135.
- TRAPPEN, J. E. VAN DER; Bijdrage tot de kennis aan Neêrlands
Flora, 1852.
- UNIO: Gouda, in N.K.A. 51 (1941), p. 40.
Oirschot, in N.K.A. 52 (1942) p. 41, 42.

- VERMEER-LOUMAN, G. G.; Het Veenonderzoek. Amsterdam Natuur-historisch gezien. Gedenkboek 1941, p. 40—45.
- WESTHOFF, V., J. W. VAN DIJK en H. PASSCHIER; Overzicht der Plantengemeenschappen in Nederland. 1942.
- WIJK, R. VAN DER; *Oligotrichum incurvum* Lindb. in Drente en Friesland. N.K.A. 51 (1941) p. 284—287.
- ZINDEREN BAKKER, E. M. VAN; Het Naardermeer. 1942.
-