

Oproep voor het inzenden van waarnemingen van de ruitrek bij grauwe ganzen

Om een overzicht te krijgen van de ruitrek van de grauwe gans, hoop ik op de medewerking van enthousiaste vogelkenners. Alle waarnemingen van trekkende grauwe ganzen tussen 20 april en 1 augustus kunnen gestuurd worden naar onderstaand adres. Daarbij gaat het vooral om de volgende informatie:

- Datum
- Tijdstip van waarneming
- Plaats van waarneming
- Aantal ganzen
- Vliegrichting

Ook informatie over de totale waarnemingsduur in de betreffende tijdsperiode of waarnemingen van de afgelopen jaren zijn van harte welkom. Iedereen, die een bijdrage levert, krijgt aan het eind van het jaar een overzicht van alle binnengekomen waarnemingen.

Zendt uw bijdrage aan:

Maarten Loonen
Gedragsbiologie RUG
Postbus 14
9750 AA HAREN

Achtergrond

Sinds 1973 ruien er grauwe ganzen in de Oostvaardersplassen. Sinds dat jaar zijn de aantallen gestaag toegenomen tot boven de 30.000. Het grootste deel van deze ruiers komt alleen naar Nederland voor de rui. Reeds enkele dagen na het volbrengen van de slagpenrui vertrekken ze weer naar het buitenland. De laatste jaren wordt er ook een omgekeerde ruitrek signaleerd. Grauwe ganzen komen voor de rui naar Nederland, maar besluiten om toch elders te ruien en verdwijnen binnen enkele dagen weer. Dit fenomeen lijkt te zijn gerelateerd aan de hoeveelheid voedsel, die in de Oostvaardersplassen aanwezig is. (Loonen et al. in druk). De laatste drie jaar is het areaal van nat rietmoeras (de habi-

tat voor grauwe ganzen in de rui) afgenomen, omdat het waterniveau in de helft van de Oostvaardersplassen verlaagd is (Van Eerden en Drost 1989). Deze waterstandsverlaging is tijdelijk en in de toekomst kan het effect van het verhogen van de waterstand op de ruitrek van de grauwe gans nader bestudeerd worden. Haack en Ringleben (1972) hebben de omgekeerde ruitrek al beschreven, en dit onderzoek is analoog aan hun werk.

Literatuur

Haack, W. & H. Ringleben (1972): Über den Mauserzug nicht brütender Graugänse (Anser anser) im nord- und mitteleuropäischen Raum. Die Vogelwarte 26: 257-276.

Loonen, M.J.J.E., M. Zijlstra & M.R. van Eerden (1990): Timing of wing moult in Greylag Geese Anser anser in relation to the availability of their food plants. Ardea in druk.

Eerden, M.R. van & H.J. Drost (1988): Droogte in de Oostvaardersplassen. Vogels 48: 236-239.

