



De meeste waarnemingen zijn niet gedocumenteerd. De BSP-nb-soorten kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren (te verkrijgen bij Ben Koks 050-412646). Dwaalgasten kunnen worden ingediend bij de CDNA (informatie en formulieren te verkrijgen via Bert de Bruin of Anne van Dijk).

Waarnemingen over de periode 1 juli tot en met 30 september zo spoedig mogelijk insturen naar:

Anne van Dijk
Pop Dijkemaweg 102
9731 BH Groningen

De voorjaarsstrek verliep over het algemeen vrij rustig. De steltlopers, met name de wat zeldzamere soorten, lieten het evenals vorig jaar afweten.

Voor de schaarse zangvogels was het voor Engelse Kwikstaart en Klapekster een relatief goed jaar. Dwaalgasten waren vertegenwoordigd met onder andere twee Amerikaanse Wintertalingen, een Steppiekiekendief en een Bergfluitier.

De broedvogelinventarisaties leverden vele verrassingen, onder meer territotia van Steenloper(!), Bonte Strandloper (2) en Krekeltzanger. Verheugend was ook de forse toename van de Kwartelkoning tot 25-30 paar. Rottumeroog, dit jaar bemand door Koen van Dijken en Eduard Koopman, beleefde een rustig seizoen. Hoogtepunt was hier een Hop. Tenslotte werden op 25 april bij Noordlaren vanaf één plek maar liefst tien roofvogelsoorten waargenomen.

Roodkeelduiker. Tot en met 19-4 verbleven er in de Eemshaven regelmatig 1 of 2. Op 8-5 werd hier nog een solitaire vogel gezien. Op het Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer, vertoefde er 1 van 2 t/m 14-4. Bij Lauwersoog werd de soort op 2, 4, 9 en 11-4 gezien. Verder bevond er zich 1 van 10 t/m 15-4 bij Nieuwe Statenzijl en op 21-4 1 in Delfzijl.

Roodhalsfuut. Een adult in zomerkleed verbleef van 7 t/m 20-4 op de vloeivelden van Ter Apel. De overige waarnemingen komen van Lauwersoog e.o., waar van 2 t/m 11-4 1, soms 2 vogels aanwezig waren. Kleedgegevens maakten duidelijk dat minstens 5 verschillende individuen werden waargenomen. Tenslotte werd hier op 22-5 nog een adult in zomerkleed gezien.

Kuifduiker.

12-4 1 in bijna-zomerkleed Lauwersoog
30-4 1 Eemshaven

Binnendijs overzomerde een exemplaar ten westen van Lauwersoog (FrI).

Geeoorde Fuut. Broedgevallen waren er op de vloeivelden van Ter Apel (3 paar?) en op de Vlinderbalg, Lauwersmeer, (1 paar).

Overige waarnemingen:

2-4 2 zomerkleed Paterswoldse Meer
11-4 2 zomerkleed Lauwersoog
20 en 22-4 2 resp. 1 Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer,
28-4 1 Lauwersoog
7-5 1 Eemshaven

Noordse Stormvogel. Op 14-5 werden twee vogels gevonden bij de Punt van Reide. Op 22-6 vloog 1 over Rottumeroog.

Jan-van-gent

7-6 1 O Rottumeroog
22-6 3 Rottumeroog

Roerdomp.

8-4 1 Lauwersmeer
Bij het Foxholstermeer werd er regelmatig een gehoord.

Kwak. Een juv. verbleef in juni minstens een week in Oosterwijdwerd.

Kleine Zilverreiger. Een goed voorjaar voor de soort, hoewel het mogelijk deels dezelfde exemplaren betrof:

- 6-5 1 Emmapolder
- 8-5 2 Eemshaven
- 9-5 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
- 29-5 1 in prachtkleed, Dollardkwelder

Grote Zilverreiger.


- 14-4 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Purperreiger. Deze in de provincie zeldzame reiger werd op 4-5 waargenomen in de Veenhuizerstukken.

Zwarte Ooievaar. Een groepje van 3 vloog op 1-5 over het Paterswoldse Meer en een solitair werd op 27-5 gezien in de Lauwersmeer.

Ooievaar. In totaal werden 15 exemplaren gemeld; de hoofdmacht (11) tussen 22-4 en 15-5. In juni werd er 1 gezien op de 20e aan de Kerkeweg in Finsterwolde.

Zwarte Ibis. Voor het eerst sinds 1992 waren er weer voorjaarswaarnemingen. In de Eemshaven-oost foerageerde 1 op 5-4 en op 3-5 trok 1 over de trektelpost. Op het Jaap Deensgat werd 1 gezien op 14-5. Tenslotte verbleef 1 van tenminste 17 t/m 20-6 in de Eemshaven-oost.



Zwarte Ibis. Eemshaven, 3 mei 1995 Eric Koops

Lepelaar. Buiten de Lauwersmeer waren er de volgende waarnemingen:

- 14-4 1 Eemshaven-oost
 - 28-4 2 W Paterswoldse Meer
 - 28-4 1 Veenhuizerstukken
 - 1-5 1 over Eemshaven-oost
 - 23-5 2 plasje Linthorst Homan-/Noordpolder.
- Op Rottumeroog werden er tussen 22-5 en 7-6 totaal 9 waargenomen, waarvan 3 keer een pleisterend exemplaar.

Flamingo. Op 7-5 verbleef 1 in de Eemshaven. De overige waarnemingen komen van Achter de Zwarten, Lauwersmeer: 3 op 9-4, 6 op 14-4, 1 op 3-5 en 1 op 22-6.

Chileense Flamingo. Eveneens op Achter de Zwarten: 2 op 9-4 en 1 op 14-4.

Dwerggans. Van 12 t/m 14-4 verbleef er in de omgeving van het Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Canadese Gans.

- 24-4 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
- 4-5 5 Veenhuizerstukken
- 27-5 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer (kleine ondersoort)

Witbuikrotgans. Deze ondersoort werd op 19-4 opgemerkt tussen Brandganzen in de Negenboerenpolder.

Roodhalzgans. Van 19 t/m 23-4 verbleef er 1 in de Noordpolder.

Indische Gans.

- 21-4 1 Carel Coenraadpolder
- 29-4 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Casarca.

- 7-4 1 Dollardkwelder
- 26 en 27-5 2 Oude Robbengat, Lauwersmeer
- 26-6 1♀ Westpolder

Bronskopeend. Evenals vorig jaar pleisterde 1♂ op de Vlinderbalg, Lauwersmeer, van 3-5 tot tenminste 12-6.

Amerikaanse Wintertaling. Van 6 t/m 20-4 verbleef 1♂ op het Jaap Deensgat. Een tweede exemplaar (ook ♂) was aanwezig op het "rood-

keelplasje". Door individuele herkenbaarheid werd aannemelijk dat dit tweede exemplaar voor het eerst werd gezien op 7-4. De laatste waarneming van deze vogel was op 17-4.

Hoewel er meer gevallen bekend zijn in de provincie, is er tot nu toe 1 aanvaard door de CDNA; dat dateert van april 1988, ook in de Lauwersmeer.

Krooneend. Het ♂ van recreatieplas Kardingse in Groningen werd nog tot in mei regelmatig gezien.

Topper

14-4 3 nabij Lauwersoog

16-4 1♂ Lauwersoog

21-4 2♂ Pier van Oterdum

Zwarte Zeeëend. Deze periode kwamen waarnemingen binnen van ongeveer 13 exemplaren van Lauwersoog, de Zoute Kwel, Lauwersmeer, en de Eemshaven. De laatste datum was 8-5 (1♂ + 1♀) in de Eemshaven.

Grote Zeeëend.

22-5 3 W Rottumerplaat

Brilduiker. Op 26-5 werden er nog 4 geteld op het Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer (op 3-6 nog 1). Op Rottumeroog vloog er op 19 en 22-6 1 langs.

Middelste Zaagbek. Evenals in voorgaande jaren weer veelvuldig aanwezig op Rottumeroog. Grootste aantallen waren: 14 op 28-4, 10 op 3-5 en 8 op 7-6.

Grote Zaagbek. Een laat ex. (♀) werd op 27-5 waargenomen op de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Wespendief. Tussen 1-5 en 4-6 werden 32 trekende vogels opgemerkt, waarvan 21 in de derde decade van mei. Het grootste aantal was 5 op 28-5 over de Eemshaven. Verder was er één op 19-6 bij Haren en trok er 1 in zuidwestelijke richting over Rottumeroog op 20-6.

Zwarte Wouw. In totaal werden er 17 gemeld. Het merendeel (13) trok door in de 3e decade van april en de 1e van mei. De eerste waarneming viel evenals in 1994 op 11-4.

Rode Wouw. Totaal werden er minimaal 25 doorgegeven: 14 in april, 9 in mei en 2 in juni. De jaren 1990-95 leverden in het 2e kwartaal resp. 12, 28, 25, 10, 8 en 25 op.

Blauwe Kiekendief. In de omgeving van Beerta en Finsterwolde overzomerden 2 adulten en een 2e k.j.

Steppekiekendief. Een adult ♀ werd op 6-6 waargenomen op de Binnenlanden, Nieuw Beerta. Indien aanvaard door de CDNA betekend dit een nieuwe soort voor de provincie.

Grauwe Kiekendief. De eerste waarneming viel reeds op 8-4 bij Nieuw Scheemda. Trek over de Eemshaven vond plaats tussen 25-4 en 5-5. Er werden 13 exx. geturfd; het grootste aantal was 3 op 30-4 en 5-5. Rottumeroog telde er totaal 3 op 2, 3 en 5-5. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de tellingen op Rottumeroog pas op 29-4 startten.

Havik. Trekkende Haviken werden opgemerkt in de Eemshaven (2 op 3-5) en Rottumeroog (1 NO op 7-5).

Sperwer. Trektellingen in de Eemshaven-oost leverden o.a. de volgende aantallen op: 10 op 25-4; 24 op 1-5; 48 op 2-5 en 37 op 3-5.

Buizerd. Sterke trek over de Eemshaven was er op 1, 3 en 5-5, toen resp. 71, 46 en 20 exemplaren passeerden.

Ruigpootbuizerd.

9-4 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer

11-4 1 Lauwersmeer

12-4 1 Veenhuizerstukken

23-4 1 Pier van Oterdum

1-5 1 NO Eemshaven

Trek over Rottumeroog was er op 29-4 (1), 2-5 (2), 3-5 (3), 7-5 (2) en 16-5 (1).

Visarend. Exclusief Rottumeroog werden tussen 15-4 en 23-5 minstens 15 exemplaren gezien. Het merendeel overtrekkers. Pleisterende vogels waren er in de Lauwersmeer en het Zuidlaardermeer. Over Rottumeroog trokken er totaal 12, verdeeld over twee perioden: 6 van 29-4 t/m 7-5 en eveneens 6 van 23 t/m 27-5.

Roodpootvalk

- 1-5 1 over Eemshaven-oost
- 2-5 1♀ Eemshaven-oost
- 3-5 1♂ Eemshaven-oost
- 22-5 1♂ ad. kwelder Julianapolder (later O)
- 27-5 1♀ jagend boven Schildersbuurt, Groningen
- 11-6 1♀ of onv. Eenum

Smelleken.

Afgezien van Rottumeroog werden er ruim 70 doorgegeven; dubbeltellingen zijn, vooral in de Lauwersmeer, niet uit te sluiten. De laatste datum viel op 21-5 (1♀ Pier van Oterdum). Topaantal doortrekkers in de Eemshaven was 7 op 30-4. Op Rottumeroog werden er 43 geteld in de periode 29-4 t/m 25-5. Topdagen waren hier 1, 2 en 7-5 met resp. 8, 10 en 8 exemplaren.

Slechtvalk. Buiten de waarneming van een in noordwestelijke richting overtrekkend exemplaar boven Karding, Groningen, kwamen alle waarnemingen weer van de noordkust, Rottumeroog en de Dollard. Er was een juniwaarneming van een juveniel op 18-6 bij de Punt van Reide.

Kwartel. De eerste werd reeds gehoord op 30-4 bij Drieborg. Verder onder andere roepende vogels bij Sellingen (2), Blijham (4), Denemarken bij Slochteren (11) en Oost-Groningen. Op 15-6 werd bij Tjuchum een Kwartel gevonden als prooirest van een Bruine Kiekendief.

Porseleinhoen.

Roepende vogels onder andere bij het Schildmeer (1 op 19-4), Blokum (1 op 27 en 28-4), de Tjamme (minstens 3) en het Jaap Deensgat, Lauwersmeer.

Kwartelkoning. Na een aantal dramatische jaren werd dit jaar een forse toename vastgesteld in Oost-Groningen. Maar liefst 25-30 roepende vogels werden gelokaliseerd. Ook elders in Nederland was sprake van een forse toename.

Kraanvogel.

- 30-4 2 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
- 3-5 1 O Rottumeroog
- 10-5 1 Lauwersmeer

Steltkluut. De enige dit voorjaar foerageerde op 7-5 in de dijkslot in de Emmapolder.



Steltkluut. Eemshaven, 7 mei 1995 Eric Koops

Bontbekplevier. Op 25-5 werd massale trek waargenomen in de Eemshaven. In korte tijd werden ruim 350 geteld in groepjes van 5 tot ca ongeveer exemplaren. Veel groepjes streken even neer in de centrale-plas om daarna de reis te vervolgen.

Strandplevier.

- 2-4 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer
- 4 en 6-4 1 Jaap Deensgat, Lauwersmeer
- 21-5 5 Pier van Oterdum

Temmincks Strandloper. Evenals in 1994 uitermate schaars:

- 2 t/m 5-5 1 Eemshaven-west
- 5 t/m 8-5 1 Eemshaven-oost
- 10-5 1 Winschoterzijl, Winschoten
- 11-5 2 Schildhoek, Lauwersmeer
- 23-5 2 Eemshaven-oost

Paarse Strandloper. Bij Lauwersoog verbleef de soort tot 19-4. Maximaal werden er 3 gezien. In de Eemshaven waren er op 8-5 3 present.

Bonte Strandloper. Maar liefst 2 territoria werden gevonden, 1 bij de Dollard en 1 in de Lauwersmeer.

Bokje.

- 13-4 1 Lauwersmeer
- 15-4 1 Schildhoek, Lauwersmeer
- 21-4 1 Dollard-kwelder
- 29-4 1 Oude Robbengat, Lauwersmeer

Poelruiter. De enige deze periode bevond zich op 26-6 op de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Steenloper. Een grote verrassing was de ontdekking van een territorium op de kwelder van de Westpolder bij Hornhuizen. Hoewel overzomeren vaker voorkomt werd voor zover bekend in Nederland nooit eerder een territorium vastgesteld.

Grauwe Franjepoot.

24-4 1 centrale-plas Eemshaven

3-5 1 Lauwersmeer

23-5 1♀ Centrale-plas Eemshaven

12-6 1♀ Jaap Deensgat, Lauwersmeer

Met nog enkele meldingen uit de Bandpolder (Frl) waren dit waarschijnlijk bijna alle waarnemingen dit voorjaar in Nederland.

Rosse Franjepoot. De vogel in winterkleed die van 30-3 t/m 10-4 op het Oude Robbengat, Lauwersmeer, dobberde was vaak langdurig spoorloos.

Kleine Jager.

9-5 2 O Rottumeroog

Zwartkopmeeuw. Een adult verbleef op 14-4 kortstondig op het Hoeksmeer en een 1e zomer vogel werd op 13-5 gezien op de Tjamme. De "mannen van Rottumeroog" hadden weer niet te klagen:

13-5 1 1e zomer en 2 ad.

14 en 18-5 1 eerste zomer (andere dan op 13-5)

23-5 1 1e zomer (3e ex.)

20-6 2 ad. zomer O

Dwergmeeuw. Binnenlandwaarnemingen:

18-4 6 enige tijd foeragerend boven plas Karding, Groningen (later N)

23 en 28-4 5 Paterswoldse Meer

30-4 1 ad. Winschoterzijk, Winschoten

De grootste opgegeven aantallen voor de Lauwersmeer waren ca 500 op 19-4 en 400 op 1-5. In de Eemshaven-oost verbleef in mei en juni een groep van 20-25 onvolw. exemplaren, die ook volop baltsten.

Kleine Burgemeester. De vogel van de stad Groningen werd in ieder geval op 17-4 nog waargenomen op recreatieplas Karding en dezelfde dag ook nog in het Oosterpark.

Drieteenmeeuw. Op 10 en 15-4 verbleef er 1 ad. bij Nieuwe Statenzijl en op 22-6 trok 1 ad. in westelijke richting langs Rottumeroog.

Lachstern. Vanaf 1992 wordt de soort elk voorjaar gezien in de Eemshaven, nu trokken er solitaire vogels langs op 29-4 en 1-5.

Reuzenstern. Een voorjaarsstrekker vloog op 17-5 in oostelijke richting langs Rottumeroog. De vogel die op 28-6 op Achter de Zwarten, Lauwersmeer werd gezien kan beschouwd worden als de eerste najaarsstrekker.

Witwangstern. Op de Vlinderbalg, Lauwersmeer, werd op 27-5 een adult in zomerkleed ontdekt tussen Zwarte Sterns. Dezelfde dag vertoefden er 2 in de Bandpolder (Frl), die later naar Achter de Zwarten vlogen.

Witvleugelstern. Ook op 27-5 vlogen 2 Witvleugelsterns boven de Vlinderbalg en trok een adult in zomerkleed hoog in oostelijke richting over Achter de Zwarten.

Kerkuil. Waarnemingen onder andere van een jagende vogel op 23-4 in Winschoten en een roepende bij Appelbergen.

Steenuil.

28-5 1 Frijtum, tussen Kommerzijk en Noordhorn.

3-6 1 op boerderij bij de Tjamme

Bosuil. Deze periode waren er waarnemingen uit Sellingerbeetse (1 op 1-6) en Midwolda (2 t/m 6-6).

Velduil.

26-4 1 Dollard-kwelder

2-5 1 Rottumeroog

2-5 1 Julianapolder

3-5 1 NO Rottumeroog

Van 3 t/m 25-5 werd er regelmatig 1 gezien in de Eemshaven-oost.

Gierzwaluw. De eerste werd gezien op 20-4 boven De Wijert, Groningen.

IJsvogel. De enige:

17-5 1 Zuidlaardermeer

Hop. In Broek werd op 21-4 ongeveer een kwartier lang een Hop geobserveerd die een regenworm verorberde. Een tweede exemplaar vloog op 2-5 in alle vroegte over Rottumeroog.

Draaihals. Vrijwel ontbrekend op de bekende voorjaarsplekken als Lauwersoog, Eemshaven en de begraafplaatsen in Groningen, maar relatief veel (5) op Rottumeroog.

26-4 1 Lauwersoog

4-5 2 Rottumeroog

7-5 1 Ter Apel

7-5 1 Sellingen

10, 14 en 15-5 1 Rottumeroog

Groene Specht.

4-4 1 Glimmen

20-4 1 Ter Apel

Zwarte Specht.

16-4 1 Vlagtwedde

21-5 1 Noordlaarderbos

Kleine Bonte Specht. Buiten de broedplekken werd er in april en mei enkele malen 1 gezien in Groningen en Haren.

Kuifleeuwerik. Een trekker was er op 15-4 in de Eemshaven en op Rottumerplaat verbleef er 1 op 27-5. Het solitaire mannetje van de Hunze in Groningen kreeg laat in het seizoen toch nog gezelschap van een vrouwtje.

Boomleeuwerik. In de omgeving van Sellingen en Ter Borg werden maar liefst 9 territoria vastgesteld.

15-4 2 Veenhuizerstukken

Strandleeuwerik. Een groep van 8 foerageerde op 10-4 op de kwelder van de Negenboerenpolder. De laatste waarneming viel op 2-5, toen er 4 over Rottumeroog trokken.

Duinpieper.

21-4 1 foeragerend Polder Breebaart

4-5 1 Eemshaven

5-5 1 Eemshaven-oost

Graspieper. De 7630 exx. die op 2-5 op de trektelpost in de Eemshaven-oost werden geturfd geven slechts een indruk van de treksterkte die dag. Rottumeroog kwam op 2-5 tot 588 exx.

Roodkeelpieper. Schaars dit jaar. De Dollard was de beste plek:

21-4 1 overvliegend

5-5 1 foeragerend tussen zeebies en 1 overvliegend

De Eemshaven noteerde 2 keer een overtrekker (op 6 en 7-5).

Waterpieper. De laatste (zomerkleed): op 11-4 op het Oude Robbengat, Lauwersmeer.

Engelse Kwikstaart. Er werden minimaal 31 doorgegeven, een recordaantal in de provincie. In de Lauwersmeer werd op 22 en 29-4 1 ex. waargenomen. De overigen trokken van 29-4 t/m 5-5 door de Eemshaven. Het merendeel werd opgemerkt tussen groepjes Noordse Kwikken, foeragerend tussen schapen op de dijk. De topdagen waren 29-4, 3 en 5-5, met resp 7, 8 en 10 exx.

Grote Gele Kwikstaart.

15-4 1 over Eemshaven-oost

3-5 1♂ Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer

4, 5, 7 en 25-5 1 over Eemshaven-oost

4 en 5-5 1 Punt van Reide

Opmerkelijk was de waarneming van 1♂ op 26-6 op het Selwerderhof, Groningen.

Rouwkwikstaart.

4-4 1♀ roeibaan, Harkstede

14-4 1♀ Ekenstein

1-5 1♀ Eemshaven-oost

8-5 1♀ en 1♂ Eemshaven-oost

8-5 1♀ Emmapolder

Blauwborst. De soort lijkt nog steeds toe te nemen in de provincie en werden van diverse plekken gemeld.

Roodborsttapuit. Een broedgeval vond plaats in de Gaast bij Blijham. Overige waarnemingen:

14-4 1♂ Zoute Kwel, Lauwersmeer

7-5 2 vloeivelden Blekslage

Beflijster. In de periode 9-4 t/m 15-5 werden tenminste 116 exemplaren opgemerkt. Een onderverdeling in decades leverde het volgende op:

april 1 1

april 2 20

april 3 88

mei 1 5

mei 2 2

De piek viel dus als gewoonlijk weer eind april. Vooral van 27 t/m 29-4 trokken er veel door, met o.a. 17 op 27-4 in de Lauwersmeer. Op 25-4 werd bij Ekenstein een Smelleken waargenomen, die een ♂ Beflijster had geslagen.

Koperwiek. Een extreem laat exemplaar bevond zich op 27-5 op Rottumeroog. De laatste waarneming tot nu toe was waarschijnlijk op 20 mei 1978 bij Ter Apel (*Vogels van Groningen*).

Krekelzanger. Van eind juni tot ver in juli zong 1 ♂ op het Selwerderhof in Groningen. Vanwege het biotoop en de tijd van het jaar, lijkt een broedgeval niet uitgesloten.



Krekelzanger. Groningen, Selwerderhof, juni/juli 1995
Roef Mulder

Snor. Op de Veenhuizerstukken zong er 1 op 5-5. Bij de Dollard kwamen 3 paar tot broeden.

Grote Karekiet. Een wel zeer vroeg ex. werd op 14-4 gemeld, zingend bij de sluis van Zoutkamp. Een wat meer reguliere doortrekker, zong op 26-5 in de Eemshaven-oost. Verrassend waren de 2 broedparen in de Veenhuizerstukken.

Bergfluit. Na het eerste geval, september '94, Eemshaven, nu een voorjaarswaarneming van 1 ♂ vogel op 6-5 op het Esserveld, Groningen.

Fluiter. Waarnemingen van doortrekkende Fluïters waren erg schaars (5).

Vuurgoudhaan. Zingende vogels onder andere in Ter Apel (2), Appelbergen en eenmalig in het centrum van Groningen.

Overige waarnemingen:

5-4 1 ♂ Usquert

3-5 1 Lauwersmeer

Van Rottumeroog kwamen vier waarnemingen: op 7, 25, 26 en 29-5.

Bonte Vliegenvanger. De eerste werd reeds op 6-4 gezien op de vloeivelden van de Suikerunie bij Groningen.

Baardman. Onder andere een waarneming op 19-4 van 6 ♂ en 4 ♀ in een moerasje bij het Schildmeer.

Boomklever. Hoewel de soort uitermate zeldzaam is in Hoogezand, vloog er zich op 19-6 1 te pletter tegen een ruit.

Taigaboomkruiper. Een eenmalige waarneming was er op 7-4 bij Ter Apel. Na de recente ontdekking van een kleine broedpopulatie in Zuid-Limburg is waakzaamheid geboden.

Buidelmees. Meldingen van broedgevallen kwamen van de Veenhuizerstukken (2) en de Hoornse Dijk, Groningen.

De overige waarnemingen: de Lauwersmeer (1 op 15-4), Eemshaven-oost (1 op 21-4) en Hoogezand (2 op 12-6).

Grauwe Klauwier. In tegenstelling tot 1994, toen maar liefst 11 doortrekkers werden gemeld, was er nu slechts 1 en wel op 10-5 1 ♂ op Rottumeroog.

Klapekster. De soort deed het met 4 waarnemingen deze periode in vergelijking met voorgaande jaren goed. Tijdens dezelfde periode in de jaren 1990-94 werd de Klapekster slechts twee keer (1991 en 1994) gemeld.

5-4 1 Eemshaven-west

6-4 1 Onnerpolder

29-4 1 Noordpolder

Van nog een vogel in april in de Eemshaven ontbreekt de datum.

Bonte Kraai. De laatste vloog op 3-5 over de Eemshaven.

Keep. Een ♂ ♀ op 14-5 bij Ter Apel zou op een broedgeval kunnen duiden.

Europese Kanarie.

15-4 1♂ Wildervank

1-5 1 W Midwolda

7-5 1 NO Eemshaven-oost

25-5 2 ten ZO van de Eemshaven

2-6 1 O Rottumeroog

Frater.

De laatsten (5) bevonden zich op 14-4 in de Eemshaven-oost.

Kruisbek. Het enige gemelde ex. (♀) werd op 24-4 waargenomen in Bierum.

Roodmus. Een zeer vroeg exemplaar zong op 3-5 in de Lauwersmeer. Van 25 t/m 27-5 verbleef de soort in de Eemshaven-oost. Op 25-5 zongen hier 2♂ tegen elkaar, een uitgekleurd en een onvolwassen vogel. Mogelijk was nog een derde aanwezig. Op 26 en 27-5 werd alleen de onv. vogel nog gezien.

Bij Lauwersoog zong er 1 op 28-5. Een paartje werd op 6-6 waargenomen bij Rusthoven, Ekenstein.

Rottumeroog tenslotte, had een overtrekker op 24-5 en een zingend ex. op 9 en 10-6.

Goudvink. De 2 op 4-4 bij Lauwersoog en het ♂ op 5-4 in Usquert waren waarschijnlijk echt de laatsten van de in vorige rubrieken vermelde kleine invasie van de Noordse Goudvink.

Sneeuwgors. Laatste waarnemingen:

11-4 1 Eemshaven

14-4 2 "rommelhoek" Eemshaven

Geelgors. Breidt de soort zich soms langzaam uit? Deze periode werden verscheidene 2♂♂ waargenomen op plekken waar ze normaal niet worden gezien. Eenmalige waarnemingen komen van Dallingweer bij Termunten (1-4), Noorlaarderbos (♂ op 17-4), Lageland (♂♂ op 23-4). Bij Wildervank, Borgercompagnie en aan de Kielsterachterweg bij Hoogezand waren langdurig ♀ exx. aanwezig.

Ortolaan. Van 3 t/m 5-5 werden er totaal 6 gezien in de Eemshaven-oost. Op 4 en 5-5 was er 1 ter plekke, de rest trok over. Bij Westerpauwen was er 1 bij een boerderij op 16-5.

Grauwe Gors. 1♂ werd enkele malen gehoord


in Oost-Groningen, o.a. bij Drieborg.

Dit overzicht werd samengesteld met waarnemingen van:

Bertus Arends, Theo Bakker, Bernadette Balten, Peter de Boer, Jan Hilco Bolhuis, Sjoerd Boonstra, Andre Boven, Bert de Bruin, Sjaak Buys, Anne Diephuis, Anne van Dijk, Koen van Dijken, W. Dijkman, Truus Duijm-van Oyen, Caroline Elfferich-de Jong, Ronald Hartman, Alco van Klinken, Emo Klunder, Ben Koks, Eric Koops, Kees Kugel, H. Kruisinga, Carel Leemhuis, Joep de Leeuw, Leon Luijten, Anneke Nieuwenhuijs, Martin Olthoff, Piet Pepers, Aaldrik Pot, Bart-Jan Prak, Jan Allex de Roos, Willem de Ruiters, Koert Scholten, Loek Scholtens, Henk van Schuppen, Jans en Trudi Sikkens, Aart van der Spoel, Han van Straten, Dick Veenendaal, Willem-Pier Vellinga, Stefan Vischer, Guus de Vries, Nico de Vries, Geert Westerhof, Harm Jan Wight, Klaas Wildeman, Rik Winters, Wim Woudman en Hans Zwaagstra.

OP EEN GEGEVEN MOMENT ONTDEK JE 'M ZELF ...

DUTCH
BIRDING



- ✦ Nationaal en internationaal vermaard tweemaandelijks tijdschrift over herkenning, voorkomen en verspreiding
- ✦ Met veel aandacht voor recente waarnemingen van zeldzame en schaarse vogelsoorten in Nederland, België en de rest van Europa
- ✦ Lees over de Rode Rotslijster bij Noorlburen en de Taigaboomkruipers in Zuid-Limburg, of over het voorkomen van de Groene Bijeneter in Europa, of misschien wel over je eigen ontdekking!
- ✦ Maar ook over vogels kijken in Japan of Rusland, de herkenning en het voorkomen in ons land van de IJslandse Grutto en het verschil tussen de Poelsnip en de Watersnip
- ✦ Met ongeëvenaard fotowerk en schitterende illustraties!!!

Schrijf voor een gratis proefnummer naar:
Dutch Birding, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nederland