

Geringde vogels in Groningen (2)

Klaas van Dijk

Verschillende mensen hebben gereageerd op mijn oproep in de eerste aflevering van deze rubriek; hartelijk dank hiervoor. Hieronder volgen enkele nieuwe waarnemingen, speciale aandacht is besteed aan Zilvermeeuwen. Overigens zijn er de laatste paar maanden diverse Zilvermeeuwen met groene kleurringen gezien (onder andere bij Lauwersoog). Dit zijn vogels die als nestjong langs de Duitse Oostzeekust zijn geringd. Nadere informatie volgt in een volgende aflevering.

Ik blijf me aanbevolen houden voor meer informatie over geringde vogels in Groningen. Zowel vondsten van dode vogels als aflezingen van vogels met individueel herkenbare pootringen, halsbanden e.d. zijn welkom. Wel moet het gaan om vogels die in Groningen zijn gevonden of om vogels die in Groningen zijn geringd en buiten Groningen zijn teruggemeld. Insturen naar: Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN Groningen. 050-3182924.

Knobbelzwaan *Cygnus olor*

[ARNHEM 9505808]. Geringd als ♀ na 2kj op 10 augustus 1984 langs de Hoge Weg ten zuiden van Dorkwerd.

Toen was deze vogel gepaard met een ♂ (COPENHAGEN B 4445) die op 10 augustus 1974 als na 2kj in de slagpenrui bij het eiland Saltholm bij Kopenhagen, Denemarken (55°38'N-12°46'E) was geringd. Deze zwaan dook in de strenge winter van 1979 in Groningen op en is sedertdien rond de stad blijven hangen. Onder andere in 1985 bracht dit paar ook jongen groot.

Op 22 februari 1996 zat de ♀ met ARNHEM 9505808 (ondertussen vervangen door ARNHEM 121A121A) bij de A-brug in de stad Groningen. De ring werd afgelezen door Dick Bresser. Afstand 5 km, verstreken tijd 4213 dagen. Ondertussen is de 'Deense' partner vermoedelijk doodgegaan. In februari 1996 werd de vogel namelijk samen gezien met ARNHEM 235A235A (geringd als na 3kj ♂ op 6 april 1986 bij Dorkwerd); onder andere op 6 februari 1996 bij de Herman Colleniusbrug in Groningen (waarneming van Klaas van Dijk).

Een voorbeeld van een Knobbelzwaan die in de begindagen van de Zwanenwerkgroep werd geringd en nog steeds in leven is. Ondertussen is deze vogel minimaal bijna veertien jaar oud.

Scholekster *Haematopus ostralegus*

[STAVANGER 5104013]. Geringd als na 2kj op 28 mei 1987 te Storfosna, Orland, Sør-Trøndelag, Noorwegen (63°40'N-09°17'E).

Op 30 januari 1996 door Martin Olthoff en Theo Bakker als vers dood vorstslachtoffer gevonden langs de Waddenzeedijk bij Lauwersoog. Afstand 1153 km, verstreken tijd 3169 dagen.

Stormmeeuw *Larus canus*

[COPENHAGEN 5003247]. Geringd als nestjong op 25 juni 1970 te Amager bij Kopenhagen, Sjælland in Denemarken (55°38'N-12°34'E).

Op 18 juli 1996 werd deze vogel opnieuw gezien (zie ook *Geringde vogels in Groningen (1)*), rustend op een paal in het Van Starckenborghkanaal bij de Korrebrug in Groningen. Afstand 470 km, verstreken tijd 9520 dagen. De ring van deze vogel werd met een telescoop door Klaas van Dijk afgelezen. De vogel is ondertussen 26 jaar en één maand en wel zeker de oudste Stormmeeuw van Groningen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

[GDANSK DA 06842]. Geringd als nestjong op 31 mei 1991 bij Swinoujście-Karsiborz, ten noorden van Stettin, Polen (53°51'N-14°20'E).

Op 18 februari 1992 zat deze vogel op de vuilstort in Groningen; de ring werd met de telescoop afgelezen door Lex Tervelde. Afstand 517 km, verstreken tijd 263 dagen. Vermoedelijk de eerste terugmelding van een Poolse Zilvermeeuw in Groningen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

[COPENHAGEN 4242854]. Geringd als nestjong op 15 juni 1994 te Illumø, Helnæs Bugt, Fünen in Denemarken (55°08'N-10°07'E).

Deze vogel werd op 24 december 1995 en wederom op 13 en 27 oktober 1996 door René Oosterhuis in de haven van Lauwersoog gezien; de ring werd steeds met de telescoop afgelezen. Afstand 319 km. Een voorbeeld van een buitenlandse Zilvermeeuw die in twee opeenvolgende winters in Lauwersoog werd gezien.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

[COPENHAGEN 4121005 en COPENHAGEN 4206969]. Beide geringd als nestjong op 14 juni 1995 te Illumø, Helnæs Bugt, Fünen in Denemarken (55°08'N-10°07'E).

Beide vogels werden op 27 december 1995 op het Winschoterdiep nabij de vuilstort van Groningen gezien. De ringen werden met de telescoop afgelezen door Klaas van Dijk. Afstand 313 km, verstreken tijd 196 dagen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

[COPENHAGEN 4230300]. Geringd als nestjong op 24 juni 1991 op het eilandje Storeholm bij Præstø, Sjælland, Denemarken (55°08'N-12°04'E); tevens geringd met een gele kleurring (BK0).

Op 10 en 23 november 1991 werd deze vogel bij de Frihavnen in Kopenhagen gezien (55°43'N - 12°36'E); op 27 december 1995 werd de vogel op het Winschoterdiep nabij de vuilstort van Groningen gezien. De kleurring werd door Klaas van Dijk afgelezen. Verstreken tijd 1647 dagen. Een voorbeeld dat ook volwassen Zilvermeeuwen uit het Oostzeegebied 's winters wel naar Nederland komen.

Zilvermeeuw *Larus argentatus*

[ARNHEM 5035673]. Geringd als nestjong op 1 juli 1969 op Rottumeroog (53°32'N-06°35'E).

Op 2 april 1993 zat deze vogel in het Noorderplantsoen in Groningen. De ring werd met een telescoop afgelezen door Klaas van Dijk. Afstand 33 km, verstreken tijd 8676 dagen. De vogel was al eerder in het Noorderplantsoen gezien, onder andere in 1988, 1989 en in 1992. Deze Zilvermeeuw was bij de laatste waarneming 23 jaar en negen maanden.

Geelpootmeeuw *Larus cachinnans*

[BOLOGNA C 22712]. Geringd als nestjong op 1 juni 1987 op Scombro, een klein rots-eiland nabij Isola dell' Asinara, in het noordwestelijk deel van Sardinië, Italië (41°03'N-08°15'E); tevens geringd met vier kleurringen (rood/wit/oranje/blauw) aan de linkerpoot.

Op 7 juli 1987 zat deze vogel op de vuilstort in Veendam; de kleurringen werden afgelezen door Bert Oving. Afstand 1346 km, verstreken tijd 36 dagen. Ongetwijfeld de eerste terugmelding in Groningen van een Geelpootmeeuw uit het Middellandse Zeegebied.

Geelpootmeeuw *Larus cachinnans*

[RADOLFZELL JC 35573]. Geringd als nestjong op 26 mei 1996 bij de Rijn ten hoogte van Rheinau-Freistett, Ortenaukreis, Südbaden, Duitsland (48°40'N-07°56'E).

Op 15 september 1996 werd de vogel bij de sluizen van Lauwersoog gezien; de ring werd met een telescoop afgelezen door René Oosterhuis. Afstand 542 km, verstreken tijd 112 dagen.

Geelpootmeeuwen worden maar weinig in Groningen gezien, deels omdat de determinatie van met name eerste wintervogels behoorlijk lastig is. Deze vogel werd in eerste instantie ook niet als zodanig herkend. De laatste jaren is uit kleurringonderzoek duidelijk geworden dat Geelpootmeeuwen (uit het Middellandse Zeegebied) wel vaker in Ne-

derland en andere Westeuropese landen opduiken, zie ook Klein (1994).

Kleine Mantelmeeuw *Larus fuscus*

[STAVANGER 474522]. Geringd als nestjong op 3 juli 1985 te Norsk Hydroomradet, Karmøy, Rogaland in Noorwegen (59°18'N-05°18'E).

Op 6 april 1996 zat deze vogel kortstondig op de Vismarkt in Groningen. De ring werd met een telescoop afgelezen door Klaas van Dijk. Afstand 681 km, verstreken tijd 3930 dagen. De vogel zat na afloop van de markt tussen tientallen andere meeuwen (onder andere Kok- en Zilvermeeuwen) visafval en andere voedselresten te eten. Deze vogel is een voorbeeld dat naast locale broedvogels van de Waddeneilanden, ook meer noordelijke broedvogels wel in Groningen aan de grond komen.

Zwarte Kraai *Corvus corone*

[ARNHEM 5227652]. Geringd als nestjong op 24 mei 1986 op Schiermonnikoog (53°29'N-06°12'E).

Op 28 september 1986 werd de ring met een kijker afgelezen door Dick Bresser; de vogel zat toen in de Wolfsklauwstraat (wijk Ulgersmaborg) in Groningen. Afstand 38 km, verstreken tijd 127 dagen. Meestal zijn Zwarte Kraaien nogal honkvast; deze vogel is een voorbeeld van een zwerver die wat verder is gekomen.

Literatuur

Klein R 1994. Silbermöwen *Larus argentatus* und Weißkopfmöwen *Larus cachinnans* auf Mülldeponien in Mecklenburg - erste Ergebnisse einer Ringfundanalyse. Vogelwelt 115: 267-286.