

Mongolië en Iran

Een verslag van een dia-avond over twee vogelreizen door de heer en mevrouw Wijkema. 12 januari 2000. Aanwezig 23 toehoorders.

Beide keren reisden de Wypkema's met de Engelse organisatie 'Birdquest' die in staat is goed voorbereide reizen in moeilijk toegankelijk landen te organiseren. Het ging het echtpaar niet om hoog te scoren op de vogellijst

want de meeste soorten kenden ze van eerdere reizen, maar om naar eigen keuze van 'karakteristieke' soorten mooie fotografische opnamen te maken. Zo zijn ze bezig wereldwijd een collectie fraaie dia's samen te stellen van vogels die je niet zo gemakkelijk te zien krijgt omdat ze alleen in moeilijk toegankelijke streken in wellicht nog redelijke aantallen voorkomen. Wat vertoond werd is inderdaad schitterend.

Je moet je wel kunnen verplaatsen in de 'stille eenzaamheid' van de boomloze, uitgestrekte steppen in Mongolië met hier en daar een moeras of zoutmeer waar een rivier in eindigt.

In Mongolië werd gereisd van eind mei tot half juni 1998, vanuit de stad Ulaanbaatar ongeveer noordoost gelegen, in zuidwestelijke richting door de steppen, langs moerassen en zoutmeren naar bergketens waar populierenbossen groeien.

In Iran van half april tot begin mei, vanaf Teheran in het noorden naar het zuidelijke kustgebied aan de Perzische golf; weer noordwaarts naar de Kaspische zee kust en tenslotte de oostelijk gelegen centrale steppen. Daar kwamen tijdens het bewind van de Sjah nog leeuwen voor. Na de islamitische revolutie hebben de leeuwen plaats moeten maken voor schapen en geiten die nu het land tot erosieniveau kaalvreten.

Ik laat hierna in volgorde de Nederlandse namen van de meeste vertoonde vogels volgen, want onder onze leden zijn er die het Midden of Verre Oosten hebben bereisd. Zij zullen een aantal of misschien wel alle vertoonde soorten hebben herkend. Dat was althans in de zaal duidelijk te merken. Bovendien geeft het enig inzicht in de biotopen die zijn bezocht.

Voor beide landen geldt dat er doortrekkers tussen zitten.

Ja, je moet er eigenlijk zelf geweest zijn.

Mongolië: Blonde Tapuit, Alpenkraai, Daurische Kauw, Sneeuwvink, Boerenzwaluw (een zeer donkere vorm!), Jufferkraanvogel, Wilde Zwaan, Oehoe, Roodkeelnachtegaal, Indische Gans, 'Mongoolse' Leeuwerik, Steppenarend, Monniksgier, Citroenkwikstaart, Pallas' Rietgors, Strandplevier, Steppehoen, Woestijntapuit, Casarca, Mongoolse Steppegaai, Zwaangans, Grauwe Gans, Witvleugelstern, Mongoolse Plevier, Steppen-vorkstaartplevier, Bredebekstrandloper, Sibe-

risch Krekelzanger, Grote Grijze Snip (Aziatische vorm met rode kop), Relict Meeuw (i.h.a. zeldzaam maar ter plekke nog in grote aantallen voorkomend), Krooneend, Witoog-eend, Mongoolse Woestijnvink, de sterk bejaagde Grote Trap, Woestijnplevier, Steppeplevier (deze vertoont tijdens balts een kantelende zweefvlucht zoals pijlstormvogels doen en wellicht ook benut tijdens zijn heimzinnig verlopende langeafstandstrek), Saxaulmus die in rotsholen broedt, Pallas' Boszanger, Bruine Heggemus, Isabeltapuit, Vale Gier, Lammergier, Gorlowski's Gors, Altai Berghoen, Waterpieper, 'Koslow' Heggemus, Witwangspreeuw, Roodkoplijster, Azuurmees, Daurische Roodstaart, Siberische Snip, Bruine Klauwier, 'Heuvelduif', Oeraluil, Kleine Vliegenvanger.

Iran: Kleine Torenvalk, Rouwtapuit, Witstaartkievit, Vissief (zwarte snavel), Kroeskoppelikaan, Balkankwikstaart, Zwartkopgors, Roodkopklauwier, Grauwe Gors, Purperkoet (vorm met grijze kop), Marmereend, Vale Woestijnmus, Indische Kievit, Purperreiger, Ralreiger, Woudaap, Roodkeelpieper, Blauwe Zijdestaart, Woestijnvink, Griel, Witbandleeuwerik, Krabplevier, Dwergstern, Bengaalse Stern, Mongoolse Plevier, Terekrutter, Woestijnleeuwerik, Maskerklauwier, Middelste Bonte Specht, Rotsklever, Rosse Waaierstaart, Perzische Roodborst, Blonde Tapuit, Indische Rotsmus, Zwarte Roodborsttapuit, Bijeneter, Palestijnse Honingzuiger, Indisch Loodbekje, Shikra, Indische Scharrelaar, Tamariskspecht, Grijze Patrijs, Indische Griel, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Riffeiger, Bonte Kraai, Kleine Klapekster, Bruinkopgors, Vale Rotsmus, Boomleeuwerik, Putter (oostelijk vorm), Izabelklauwier, Roodborsttapuit, Scharrelaar, Ortolaan, Kneu, Bergkalanderleeuwerik, Perzische Steppegaai, Bandstaartleeuwerik, Woestijnvink, Roodmus, Zwartbuikszandhoen, Nachtzwaluw (verm. Egyptische), Kortteenleeuwerik, Rosse Franjepoot, Steenuil, Rode Rotslijster, Strandleeuwerik, Roodstaarttapuit, Tapuit, Witvleugelvink, Groene Fitis, Grijze Gors, Duinpieper.

Piet Glas