

ORCHIDEAE QUAEDAM LANSBERGIANAE

CARACASANAE

E MUSEO SPLITGERBERIANO HORTI ACADEMICI

LUGDUNO BATAVO,

DESCRIPTAE

AUCTORE

H. G. REICHENBACH, FIL.

Professore Lipsiensi.

1. *Ornithocephalus planifolius*.

Foliis carnosis lanceolatis, pedunculo glabro, tepalis cuneato-ovatis denticulatis, labello cochleari oblongo inferne carinato, ante basin intus velutino.

Plantula minuta. Pedunculus racemosus pluriflorus, vix bipollicaris. Bracteae triangulae acutae ovarii pedicellati quintam aequantes. Sepala triangula extus carinata. Tepala cuneato-oblonga obtusiuscula exceptis apice et basi minute denticulata. Labellum subrhombeum carnosum limbosum, limbo emarginato ante gynostemii pedem erecto. Pulvinar pubis ante basin. Gynostemium apice multo angustius, quam basi.

2. *Angrecum Lansbergii*.

Affine micrantho Lindl., Schiedei Rchb. fil. et organensi Rchb. fil. foliis apice valde inaequaliter bilobis, lobis obtusatis, microscopice denticulatis, bracteis excavatis brevissimis margine minute denticulatis, calcaribus clavato cylindraco vix incurvo, labello lanceo-acuminato calcaribus aequi longo, medio utrinque minute angulato.

Planta alcohole asservata prostat spithamaea apice foliata, folia usque bipollicaria dimidium pollicem lata medio, infra cuneata. Vaginae recentes scrobiculatae, dein nervosae arthropylloae. Radices adventitiae valde crassae. Pedunculi validi. Flores biseriati. Bractae ovariiis ter breviores. Sepala et tepala lancea.

3. *Epidendrum (Spathium) platyotis*.

Affine Epidendro acutissimo floribus illis Epidendri patentis dimidio minoribus, spatha unica, racemo laxo, sepalis tepalisque ligulatis, labelli lobis lateralibus a basi semicordata limboque interno involuto extrorsum hastatis, lobo medio quadrato dilatato retuso emarginato, papulis geminis in basi, lineis carnosissimis interpositis ternis, androclinio exciso.

4. *Epidendrum (Epidendrum umbellatum) Lansbergii*.

Nulli arcte affine, ramulosum, foliis linearibus acutis, pedunculo ancipiti corymboso, se-

palo summo cuneato oblongo acuto, sepalis lateralibus ovato-triangulis, labelli lobis lateralibus rotundis, lobo medio lato ligulato apice dilatato emarginato, callis rotundatis geminis in basi, linea carnosâ progrediente interposita.

5. *Bletia Lansbergii*.

Aff. *Bletiae Wageri* labello apice trilobo, lobis lateralibus semi-ligulatis obtusis, lobo medio ligulato acuto crispulo, nervis quinque medianis per duas tertias anteriores (apice lobi medii excepto) carinatis, carinis lobatis hinc crenatis.

Adest icon picta Wageri amici. Folia gemina cuneato-ligulata acuminata pedalia. Pedunculus paucivaginatus apice paucifloro racemosus sesquipedalis. Bractae ovarii pedicellati quartam aequantes. Flores illis *Bletiae* campanulatae aequales, pulchre coccinei, labelli pallidioris lobo antico atosanguineo. Sepala et tepala subaequalia cuneato-oblonga acuminata. Labellum a basi flabellatum.

(Guareyma 3000, 1850. VI. Ex am. Wager).

6. *Masdevallia Lansbergii*.

Aff. *minutae* Lindl. labelli trilobi lobo medio minute papuloso nec bicristato, tepalis ligulatis, basi utrinque angulatis, apice oblique sinuato tridentatis.

Plantula pusilla caespitosa. Folia spathulata obtusata, emarginatula; pedunculo crassiusculo

breviora. Pedunculus apice univaginatus. Bractee ovario pedicellato breviores. Cupula arcte cylindracea apice (supra tertiam quintam) coarctata. Apices liberi lineares obtuse acuti aequales per duas quintas. Tepala supra descripta. Labelli lobi laterales rectilinei, antice paulo transcendentes supra lobum medium rhombeum. Gynostemium clavatum androclinii limbo denticulato.

7. *Epidendrum seriatum* Lindl. est *Encyclium* labello integro caracasenum, pseudobulbo obpyriformi, foliis lineari-ligulatis, panícula effusa. Adest icon Lansbergiana et prostant flores Wageriani et Lansbergiani.
