

De Heer Dr. C. M. van der Sande Lacoste levert eene belangrijke bijdrage van nieuwe indigene *musci* en *hepaticae*, waaruit blijkt dat door hem gevonden zijn :

- Phascum curvicollum* Hedw., te Valkenburg in Limburg ;
Gymnostomum tenue Schrad. (*Seligeria tristicha* Prod. Fl. Bat.), te Valkenburg in Limburg ;
Trichostomum flavo-virens Bruch. (*Barbula inclinata* Prod. Fl. Bat.), in de Hollandsche duinen ;
Barbala cavifolia Schimp., te Schinnen in Limburg ;
Webera cruda Schimp., te Schinnen, Puth en Beek in Limburg ;
Bryum torquescens Br. & Sch. (non Prod. Fl. Bat.), te Valkenburg in Limburg ;
Bryum pallescens Schleich., te Beek in Limburg ;
Philonotis capillaris Lindb. (*Mas*), te Schinnen en Beek in Limburg ;
Fontinalis gracilis Lindb., te Maartensdijk ;
Hypnum elegans Hook., bij de Grebbe ;
Hypnum Sommerfeltii Myrin., te Valkenburg in Limburg ;
Mnium rostratum Schrad., te Valkenburg in Limburg ;
Encalypta streptocarpa Hedw. (met vrucht), te Valkenburg in Limburg ;
Targionia Michellii Corda, te Puth, Schinnen en Beek in Limburg.

Sphaerocarpus Michellii Bell, te Schinnen in Limburg.

Van deze planten worden door Dr. v. d. Sande exemplaren voor het Herbarium toegezegd.

De Heer A b e l e v e n vermeldt als nieuw voor de Flora van Nijmegen *Polystichum cristatum* Roth., door Prof. O u d e m a n s en hem in 't vorig jaar bij den Plasmolen achter Mook gevonden , en *Erodium pimpinellifolium* Sibth., die volgens zijne waarnemingen , zoo al niet in grootere , dan toch in gelijke hoeveelheid als *E. cicutarium* l'Herit. om Nijmegen voorkomt. Aan de exx., om Nijmegen gevonden , heeft hij aan de bloemstelen en kelkslippen geen klierdragende haren waargenomen, wel de vlek op de beide bovenste of grootste bloembladeren. — Hij behoudt zich voor , de exemplaren van 't Vereenigings-Herbarium met de zijne te vergelijken en hierop in eene volgende Vergadering terug te komen.