

In de tweede plaats vertoont de Heer O. exemplaren van *Galium erectum* Huds., *G. elatum* Thuill. (vroeger te zamen onder den naam van *G. Mollugo* L. saamgevat), en van *G. elongatum* Prosl. Die van *G. erectum* werden aan den Oosterdoksdiijk te Amsterdam, die van *G. elatum* aan duinhellingen tusschen het station Santpoort en Meerenberg (beide in den zomer van 1874), die eindelijk van *G. elongatum* aan slooten bij Doorn in den zomer van 1869 gevonden. De onderscheiding der onder den algemeenen naam van *G. Mollugo* voor het Herbarium der Vereeniging ingezondene exemplaren in de twee eerstgenoemde vormen, geschiedde reeds door van den Bosch in 1860 (Zie Verslag der 15e Vergadering der Vereeniging voor de Flora v. Nederland, enz. in Kruidk. Archief, V. 207); hoewel echter, bij diezelfde gelegenheid, door hem de onderstelling werd uitgesproken, dat ook *G. elongatum* tot onze flora behoorde, maar met *G. palustre* verward werd — het

bleek niet, dat het Herbarium der Vereeniging exemplaren dier soort bevatte, en sedert is ook geene verdere mededeeling aangaande het bestaan dier plant ten onzent ter mijner kennis gekomen.

De onderscheidende kenmerken voor *G. elatum* en *erectum*, t. a. p. opgegeven, werden bij de voorgelegde exemplaren door den spreker alle weergevonden en evenzoo die van *G. elongatum*. Ter herinnering werd vermeld, dat de stengels bij *G. elatum* neêr liggen, bij *G. erectum* opstaan; dat de bladen van gene van voren, waar zij doorgaans het breedste zijn, naar achter regelmatig in breedte afnemen, terwijl die van *G. erectum* spitsier eindigen en tot even onder den top in breedte toenemen, om eerst daarna smaller te worden; eindelijk, dat bij *G. elatum* de toppen, stelen en steeltjes der inflorescentie bijna alle onder rechte of stompe, bij *G. erectum* onder scherpe hoeken van elkander afstaan. Spreker deelt mede, dat hij beide planten in rijpe exemplaren gezameld en onderzocht heeft, zoodat de minder wijde vlucht van de assen der pluimen bij laatstgenoemde geenszins aan een jeugdiger leeftijd kon worden toegeschreven.

*G. elongatum* groeide met *G. palustre* aan dezelfde sloot, zoodat de verschillen tusschen beide soorten goed waren waar te nemen. Eerstgenoemde overtreft de laatste aanzienlijk in hoogte en heeft lange slanke internodia; bladen met 2 reien tandjes: eene aan, en eene tweede ter zijde van den rand aan de bovenzijde, waarbij komt dat de toppen dier tandjes naar twee tegenovergestelde richtingen gekeerd staan. — Rijpe vruchten werden niet aangetroffen, maar wel werd bewaarheid gevonden, dat de pluimen van *G. palustre* reeds ontplooid waren, terwijl die van *G. elongatum* nog in een saamgedrongen toestand verkeerden.