

Verder heb ik 't genoeg u voor te leggen specimina eener *Agrostis* soort van de afdeeling *Trichodium*, die echter niet alle kenmerken van *Agrostis canina* heeft, maar volgens de diagnose bij Andersson *Plantae Scandinaviae* met de *Agrostis rubra* L. overeenkomt.

A. rubra L. zoude volgens Andersson eene werkelijke *planta arctica* en tot nog toe niet buiten de grenzen van Scandinavië gevonden zijn, ofschoon deze species in sommige andere Flora's voorkomt. Zoo vinden wij in den *Botanicon Gallicum* van De Candolle van Duby de *Agrostis rubra* in de afdeeling *Trichodium*: *Perigonium univalve*, opgegeven »in pratis et ad vias», terwijl als synonym *A. vinealis* Bast. wordt aangehaald. Duby voegt hierbij: »Non diversum a sequente (*Agrostis canina*) nec veram *Agrostis rubram* Linnaei volunt cl. Wahleberg, Willd., etc.

In het *Compendium Florae Germanicae* van Bluffen Fingerhuth vinden wij bij eene variëteit van *Agrostis vulgaris* (*spiculis aristatis, arista geniculata, calyce longiore*) als synonym opgegeven *A. rubra* L., voor welke soort Lejeune, in zijne *Flore de Spa*, deze variëteit ook houdt. Ook Reichenbach, in zijne *Flora Germanica excursoria*, schijnt deze variëteit voor de *A. rubra* L. te houden.

De diagnose die Andersson in zijne *Plantae Scandinaviae* van *A. rubra* geeft is de volgende:

Panicula pyramidalis ovata, patente, erecta, ramis scabris divaricatis; flosculo sub medio dorsi arista geniculata instructa; foliis radicalibus angustis, planiusculis; ligula elongata; radice fibrosa.

A. rubra houdt in habitus en kenmerken volkomen het midden tusschen *A. vulgaris* en *A. canina*, doch verschilt evenwel genoegzaam van beide. Van *A. vulgaris*, waarmede zij overeenkomt in de vlakke bladeren, de bloeiende ovaal-

pyramidale pluim, verschilt zij door de eene digte zode vormende lagere halmen, die nauwelijks langer dan 1 voet zijn, en waarvan het bovenste internodium lang, onbebladerd is; de wortelbladeren zijn smaller dan die van den halm, nu en dan een weinig zamengevouwen; het bindsel verlengd, stomp; de takken der bloempluim zijn door zeldzame setae ruwachtig, verder door een flos unipaleaceus, door 5 nervige paleae, die aan den top stomp, en onder het midden genaald zijn. De naald is in het midden geknikt, langer dan de glumae.

Van *A. canina*, waarmede *A. rubra* overeenkomt in de onderste smalle bladeren en de genaalde paleae, verschilt zij door de bijna draadvormige wortelbladen, door eene aan de basis bredere panicula, die zelfs vruchtdragende uitstaande is, en door minder stekelharige pluimtakken.

De door mij gevonden exemplaren bezitten vooral de twee laatstgenoemde kenmerken, doch ik durf vooralsnog geene bepaalde uitspraak over de identiteit mijner specimina met *A. rubra* L. doen. Ik vermeen echter deze plant in de aandacht der leden tot verder onderzoek te moeten aanbevelen.

De Heer Suringar vermeldt nog, dat hij bij Katwijk heeft gevonden *Alyssum calycinum* L., (die ook door Dr. de Witt Hamer te Delft is ingezameld) en tevens dat, bij gelegenheid van eene excursie met studenten der Leidsche hoogeschool, eene tweede groeiplaats bij Leiden van *Geranium pyrenaicum* L. is ontdekt.

De Secretaris Th. H. A. J. Abeleven vertoont aan de leden eenige door hem om Nijmegen gevonden planten, waaronder als belangrijk kunnen genoemd worden: *Iberis amara* L., *Echinospermum Lappula* Lehm., *Adonis aestivalis* L., *Caucalis daucoides* L., *Turgenia latifolia* Hoffm., *Sisymbrium pannonicum* Jacq., *Asperugo procumbens* L. alsmede *Filago lutescens* Jord. (*F. apiculata* G. E. Sm.) van ver-

schillende groeiplaatsen om Nijmegen, zooals van 't Hengstdal te Ubbergen, Berg en dal, Hatert en de vestingwerken; van deze planten worden door hem exemplaren aan 't Vereenigingsherbarium afgestaan.

Uit de volgens Art. 5 der Statuten opgemaakte lijst van Nederlanders, als candidaten voor het lidmaatschap der Vereeniging, worden met algemeene stemmen als leden gekozen:

- de Heer J. J. Bruinsma, Apotheker te Leeuwarden;
- » F. W. van Eeden, Secretaris der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem;
- » T. T. Hinxt, Oud-apotheker te Leeuwarden;
- » G. Post, Apotheker te Tiel;
- » Dr. Hugo de Vries, benoemd leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam;
- en » Dr. de Witt Hamer te Delft.

Volgens Art. 9 der Statuten worden tot honoraire leden der Vereeniging benoemd:

- de Heer W. Pleijte, Litt. dr. te Leiden;
 - » S. I. Graaf van Limburg Stirum, te Amsterdam;
 - » C. L. van der Straal Mz. te Rotterdam;
 - en » I. A. Willink Wz. te Amsterdam,
- terwijl volgens art. 12 der statuten het corresponderend lidmaatschap wordt opgedragen aan:
- de Heeren Dr. N. J. Anderson, te Stokholm;
 - » Dr. A. de Bary, te Halle;
 - » Dr. Alex. Braun, te Berlijn;
 - » Dr. Alph. de Candolle te Genève;
 - en » Dr. F. Crépin, te Gent.

Verder wordt nog besloten, dat de nieuwe Serie van 't Nederlandsch Kruidkundig Archief aan eenige binnenlandsche en buitenlandsche geleerde genootschappen ten geschenke zal ver-

zonden worden en aan 't Bestuur opgedragen eene lijst van die genootschappen samen te stellen en voor de verzending zorg te dragen.

Door den Heer Suringar wordt nog ter bezichtiging ter tafel gebracht de diatomeën typen-platte van Möller.

Als vergaderplaats voor 't volgend jaar word Hilversum aangewezen. Na den afloop der Vergadering vereenigden zich de leden aan den gemeenschappelijken maaltijd, om 't 25jarig bestaan der Vereeniging ook feestelijk te herdenken. Hoewel het aantal leden gering was, ontbrak het toch niet aan menigen toast, die van warme belangstelling in den bloei der Vereeniging getuigde en aanleiding gaf om den vriendschapsband, die reeds vele leden aan elkander verbonden hield, nader te bevestigen.

Den volgenden dag werd nog een bezoek gebracht aan 's Rijks-herbarium en den Hortus, terwijl verder eene botanische excursie naar de omstreken van Alkmaar werd ondernomen.

NAMENS DE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING,

de Secretaris,

TH. H. A. J. ABELEVEN.
