

VIERDE LIJST

VAN

NIEUWE INDIGENEN, DIE NA JANUARI 1891,

IN NEDERLAND ONTDEKT ZIJN.

(Zie: Nederlandsch Kruidkundig Archief 2e Serie 2e Deel. bl. 196: 4e Deel. bl. 132
en 5e Deel, bl. 671) (*).

Cruciferae.

Chorispora tenella *Pall.*

Middenduin bij Haarlem; H. W. Groll. Houthaven
te Amsterdam; J. W. C. Goethart, H. W. Heinsius
en I. P. Lotzy. (1891, 1892)

Papilionaceae.

Melilotus alba *Desc.* forma *tenuis*.

Zutphen, Middelburg, Vlissingen; D. Lako. (1891)

Amygdaleae.

Prunus petraea *Tausch.*

Almelo; D. Lako. Haagsche bosch en Bloemendal;
W. F. B. Suringar. (1892)

(* Deze lijst is, evenals de 1e, 2e en 3e lijst, opgemaakt uit de
Jaarverslagen van den Voorzitter onzer Vereeniging, Dr. W. F.
R. Suringar, geplaatst in het Nederl. Kruidk. Archief 2de
Serie, Deel VI, bl. 70, 199 en 303. De jaartallen () achter de
groeiplaatsen verwijzen naar de Zomervergadering, waarin de
nieuwe indigena besproken is.

Februari 1894.

TH. H. A. J. ABELEVEN.

Prunus serotina Ehrh.

Als hakhout bij den Alerdink onder Heino, 1891;
D. Lako. Vogelenzang bij Haarlem en bij Maars-
bergen, 1893; W. F. R. Suringar. (1892, 1893)

Rosaceae.*Rubus plicatus W. et N.*

Nunspeet, Heerde, Harderwijk; C. A. G. Beins. (*)

Rubus rosulentus Wirtg. et Mull. (een vorm van *R. plicatus W. et N.*)

Nunspeet; C. A. G. Beins. (1892)

Rubus opacicus Focke.

Heerden; C. A. G. Beins. (1892)

Rubus ammobius Focke.

Heerden; C. A. G. Beins. (1892)

Rubus nitidus W. et N.

Nunspeet, Heerde; C. A. G. Beins. (1892)

Rubus hamulosus Wirtg. et Mull. (een vorm van *R. nitidus* volgens Focke.) Zutphen 1863; A. J. de Bruijn. (1892)*Rubus rosaceus W. et N.*

Heerden; 1889, en op het Nieuweland te Nunspeet,
1890; C. A. G. Beins. (1892)

Rubus Lindleyanus Less.

Langs een boschrand te Zutphen; A. J. de Bruijn.
(1892)

Rubus ulmifolius Schottf.

Oosterhout (N.-Brab.); A. J. de Bruijn. (1892)

Rubus fragrans Focke.

Oosterhout (N.-Brab.); A. J. de Bruijn. (1892)

(Rubus pyramidalis Questier (R. Guntheri) β. py-

(*) In het verslag 1892 staat abusievelijk Reintz moet zijn
C. A. G. Beins. (1892)

ramidalis Babing. R. saltuum *Focke*) in hakhout te Loosduinen; A. J. de Bruijn, (Reeds vroeger in Verslag 1858 Ned. Kruidk. Archief, 1e Serie en in 1e Lijst van nieuwe indigenen, in Ned. Kruidk. Archief, 2e Serie, 2e Dl. bl. 202, doch als *Rubus Thuringensis Metsch* opgegeven).

Rubus spectabilis Pursh.

Aan een slootkant bij Arnichem bij Zwolle (verwilderd); D. Lako. (1892)

Potentilla Fragariastrum Ehrh. (P. sterilis L.)

Bosschen van Vaerhasselt onder Meersen en op den St. Pietersberg bij Slavante; E. de Haas. (1892)

Onagrarieae.

Epilobium angustifolium L. var. minor. Herb. Soc.

In een akkermaalsboschje te Hoenderlo; Un. 1890. (1891)

Oenothera Lamarckiana Df.

In het duin bij Bentveld en Rosewater bij Haarlem; F. W. van Eeden en G. van Vloten. (1891)

Paronychieae.

Herniaria hirsuta L.

Als opslag in den tuin Marokko te Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit. (1893)

Crassulaceae.

Tillaea muscosa L.

Op hardgetreden zandpaden op Rhijngeest en Endegeest bij Leiden; W. F. R. Suringar. (De tweede bekende groeiplaats in Nederland). (1891)

Compositae.

Erigeron linifolium Willd.

Als opslag in den tuin Marokko te Apeldoorn; H. J. Kok Ankersmit. (1893)

Rudbeckia laciniata L.

- In een bosch te St. Kruis in Zeeland (1882) en langs den weg van Raalte naar Wezepe (1893); D. L a k o.
(1893)
- Artemisia vulgaris* L. var. *pallida*. *Herb. Soc.*
Aan het kanaal te Apeldoorn (1890, 1892); H. J. K o k
Ankersmit. (1893)
- Achillea tomentosa* L.
Havenhoofd te Zutphen; H. W. G r o l l. (1891)

Convolvulaceae.

- Convolvulus sepium* L. var. *sylvestris*. (*Convolvulus sylvestris* Willd., *C. sylvatica* W. Kit.)
Tegen een duinhelling bij Noordwijk; G. van Vloten.
(1891)

Boragineae.

- Amsinckia lycopsoides* *Lehm.*
Stationsterrein te Deventer, 16 Juli 1879 (reeds vroeger in verslag 1880 (Ned. Kruidk. Arch. 2e Serie III Dl. bladz. 294) en in 1e Lijst van nieuwe indigenen (Ned. Kruidk. Archief 2e Serie 4e Deel) doch als *Lithospermum apulum* opgegeven. H. J. K o k Ankersmit, Te Oudshoorn; Mej. Michelsen, 1893.
(Wintervergadering 1894)

Hydrophyllaceae.

- Phacelia tanacetifolia* *Benth.*
Aan den Rijn bij Arnhem; H. J. K o k Ankersmit.
(1893)

Verbasceae.

- Calceolaria scabiosaefolia* *Sims.*
Loenersloot; W. J. S t e e n. (1893)

Labiatae.

- Nepeta Ucratica* L. (*Teucrium Sibiricum* L.,

Nepeta Sibirica M. B.

Bij het station te 's Hertogenbosch; J. H. Wakker.
(1891)

Sideritis montana L.

Op puin te Amsterdam; J. H. Wakker. (1892)

Marrubium pannonicum Reichb.

Op aangevoerden grond in het Willemspark achter
het Rijks Museum te Amsterdam; J. J. Smith.
(1891)

Cyperaceae.*Heleocharis multicaulis Koch* β . *digyna Gren. et Godr.*

Duinvalleien onder Oostkapelle; D. Lako. (1891)

Carex pendula Huds. (*Carex maxima Scop.*)

Aan een beekje, bij hakhout, te Bunde; H. W. Groll.
(1891)

Gramineae.*Gaudinia fragilis P. B.*

Bij Oudshoorn, 1890; J. H. Wakker. (1892)

Rubus Thuringensis Metsch. Ned. Kr. Archief, 2e Ser.
IIe Dl. bl. 202, moet vervallen.

Lithospermum apulum Vahl. Ned. Kr. Archief, 2e Ser.
IVe Dl. p. 135, moet vervallen.
