

Wintertelling 1986. Duiven.

Jan Grotenhuis en Onno Plantinga


In januari 1986 is de tellers voor het eerst verzocht om duiven te tellen. In het verleden werden duiven facultatief geteld en vaak alleen de grotere groepen doorgegeven.

De weersomstandigheden waren bijzonder slecht. Ze zijn waarschijnlijk van grote invloed geweest op de telresultaten.

Toch werd interessante informatie verzameld. Het aantal Turkse Tortels bleek gering, het aantal getelde Holenduiven was groter dan ooit en het aantal Houtduiven week niet sterk af ten opzichte van voorgaande (onvolledige) tellingen.

Turkse Tortel.

In de telgebieden werden slechts 89 Turkse Tortels geteld. Vermoedelijk komt dit doordat het 'Antennedoevie' zich grotendeels binnen de bebouwde kommen ophoudt, maar deze worden niet geteld. Het verspreidingsbeeld is zeer onvolledig en geeft ons geen inzicht in de werkelijke verspreiding. In voorgaande januari-tellingen, in 1978 en 1983, werden respectievelijk 650 en 374 exemplaren geteld. Een veelvoud van het aantal uit 1986. Toen werden bebouwde kommen vaak wel meegeteld. Het verschil lijkt teruggevoerd te kunnen worden op methodische aspecten.




De gemiddelde groepsgrootte komt, ondanks het geringe aantal, overeen met de gegevens uit de periode 1972 - 80:

1 - 5 ex. - 79%
6 - 10 ex. - 7%
11 - 25 ex. - 7%
26 - 260 ex. - 7%

Holenduif.

Een deel van de Drentse broedvogels trekt weg (van Dijk & van Os 1982). Van februari tot april arriveren de vogels weer op hun broedplaatsen. Vooral met strenge vorst zijn veel Holenduiven afwezig. Opmerkelijk was het daarom dat maar liefst 630 ex. geteld werden. In de periode 1976 - 78 werden maximaal 310 ex. geteld. Uiteraard is er in 1986 expliciet op de soort gelet, maar dit verklaart niet het verschil. Een langdurige vorstperiode is echter uitgebleven, daarnaast lijkt de soort als broedvogel weer wat toe te nemen (diverse ppd rapporten, o.a. 1983, 1984, 1985). De koudegolf van november 1985 en januari 1986 kan er ook voor gezorgd hebben dat er meer noordelijke vogels in Nederland verbleven. Eenzelfde opgaande trend geven de PTT-tellingen in Nederland aan (SOVON



1986). Opvallend in de verspreiding van de soort is het ontbreken en de geringe aantallen noordelijk van Assen waar ze vrijwel afwezig zijn. Daarnaast is er overeenkomst met de verspreiding van de Houtduif. De groepsgrootte komt goed overeen met gegevens uit voorgaande jaren.

Groepsgrootte : 1 - 5 ex. - 66%
6 - 10 ex. - 16%
11 - 25 ex. - 10%
26 - 150 ex. - 8%


Houtduif.

Van de Houtduif is bekend dat de aantallen sterk kunnen schommelen (van Dijk en van Os 1982). In strenge winters zijn de aantallen gering, zoals in januari 1979 toen in heel Drenthe 1000 - 2000 ex. zaten. In de zachte winter van 1977/1978 waren dit er minimaal 41.000 (van Dijk en van Os 1982). De aantallen van 1983 en 1986 liggen dicht bij elkaar, namelijk 5842 ex en 6273 ex. Een goede vergelijking met voorgaande jaren is er natuurlijk niet, omdat alleen in 1986 de soort goed geteld is. Een vergelijking in de groepsgrootte levert meer op: grote groepen kwamen in 1986 niet voor en het merendeel (63%) wordt gezien in groepjes van 1-10 ex. Dit kan er ook op duiden dat vroeger alleen de gegevens van grotere groepen werden doorgegeven.

In 'Vogels van Drenthe' wordt het gebied oostelijk van de Hondsrug genoemd vanwege de hoge aantallen en de slaappleatsconcentraties op de Hondsrug. Voor een deel van het gebied lijkt dit ook in 1986 op te gaan.

Groepsgrootte:

Vogels van Drenthe (n=35000)				1986 (n=6273)
1	-	10 ex.	28%	63%
10	-	50 ex.	25%	33%
51	-	100 ex.	20%	3%
101	-	500 ex.	20%	1%
501	-	1000 ex.	4%	
1001	-	2000 ex.	3%	



Duiven 1986. Groepsgrootte.

	Houtduif	Holenduif	Turkse Tortel
1 ex.	53	10	2
2 - 5 ex.	125	40	8
6 - 10 ex.	65	12	1
11- 20 ex.	72	8	1
21- 50 ex.	54	5	1
51-100 ex.	13	1	-
101-250 ex.	6	-	-
n	6273	631	89