

RAPPORTBESPREKING

Os, B.J.L. van, 1983; Weidevogels en overige fauna in agrarische landschappen in Drenthe. Rapport van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe. 44 pagina's, vijf tabellen, zes figuren en vijf tekeningen van vogels.

Dit rapport heeft als ondertitel: rapportage over de verandering in de weidevogelstand en suggesties voor aanpassing van het agrarisch beheer ten gunste van de fauna en is in vier hoofdstukken verdeeld. In paragrafen wordt bovenstaand onderwerp behandeld.

Het rapport bevat bewerkte gegevens van de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe uit de periode 1958-1980 en eigen gegevens van de PPD.

Eens te meer blijkt dat Nederland voor een aantal steltlopersoorten (Grutto, Kievit, Tureluur, Kemphaan, Watersnip) in internationaal verband een belangrijke rol tot zeer belangrijke (Grutto) plaats inneemt. Drenthe is voor weidevogels nationaal van belang door het voorkomen van Wulp en Paapje.

De resultaten van het onderzoek zijn verontrustend. Een aantal "kritische" soorten zoals Zomertaling, Slobeend, Kemphaan en Watersnip zijn met meer dan 60% in aantal afgenomen. Andere soorten vertonen een achteruitgang van 30-50%; alleen de Scholekster neemt in aantal toe.

Als belangrijkste oorzaak voor deze achteruitgang wordt de landbouwintensivering genoemd. Deze heeft een negatieve invloed op de broedgelegenheid (verstoring) en de voedselsituatie voor oude en jonge vogels.

Het voedselaanbod en de bereikbaarheid ervan worden slechter.

In het rapport worden verder een aantal aanbevelingen gedaan om aan deze slechte situatie voor de weidevogels een einde te maken, waarbij tevens de bedrijfsvoering in de landbouw zo optimaal mogelijk in stand blijft.

In duidelijke taal wordt de behandelde materie uit de doeken gedaan, waarbij de tabellen en figuren duidelijk aangeven hoe de aantallen zijn veranderd. Sommige tabellen lenen zich door hun grootte niet direct tot het besturen ervan, maar met enige vasthoudendheid geven ze de lezer een goed inzicht in de problematiek.

Hoewel de titel aangeeft, dat alle agrarische landschappen worden behandeld, komen de akkerbouwgebieden erg weinig aan de orde. Toch blijken ze voor bepaalde vogelsoorten van groot belang te zijn. Uit figuur 3 op bladzijde 22 wordt aangegeven dat de kleinschalige akkers van groot belang zijn voor

Patrijs, Kwartel en Gele Kwikstaart. Deze gebieden worden over het algemeen intensief beheerd, maar zijn voor genoemde soorten een optimaal biotoop. Blijkbaar is intensivering in z'n totaal niet funest voor alle besproken vogelsoorten, maar betreft het vooral intensivering in de graslandgebieden. Wat zou overigens de invloed zijn van de hand over hand toenemende maisteelt, ook op de akkers?

Een opvallend detail in figuur 4 is dat bouw van nieuwe boerderijen de broedgelegenheid van o.a. Kerkuil doet afnemen. Mogelijk wordt hier bedoeld, dat verbouw van oude boerderijen tot woonhuis de broedgelegenheid voor deze soort doet afnemen, maar duidelijk is dat niet.

Het rapport is van groot belang bij de discussie over de mogelijkheid tot integratie van landbouw en natuur en mag derhalve niet ontbreken bij hen die in deze besluitvorming een doorslaggevende rol spelen.

Yzaak de Vries.