


Prooigedierte in cijfers gevangen

Punga punga *Oryctolagus cuniculus*

Matthijs Smaal en Willem van Manen

Konijnen vormen een substantieel aandeel in het voedsel van Drentse Haviken *Accipiter gentilis* en Buizerds *Buteo buteo*. Zij worden gemonitord in het stroomdal van de Drentse Aa ter hoogte van Taarlo en langs de randen van het Ballooërveld. Tellen geschiedt door met een constante snelheid van 20 km/uur langs een vast traject (11 km) bij het invallen van de schemering alle konijnen te tellen die in het licht van de koplampen worden gezien. De methode is uitgebreid beschreven en getoetst door Kivit (1987). In oktober 1992 is begonnen met het tellen van konijnen, de resultaten tot dusver zijn weergegeven in figuur 2.



Figuur 2. Aantal konijnen per telling in 1992-93, jongen zijn weergegeven met een dunne lijn.
Number of rabbits counted along an 11-km transect around the Ballooërveld in 1992-93. Young rabbits are shown separately (thin line).

Literatuur

Kivit H. 1987. Over de methodiek van konijmentellingen in de vastelandsduinen: een evaluatie van toegepaste telmethode. Werkgroep Natuurbeheer, LU, Wageningen.

Adressen: Jagerstraat 1, 9485 TD Taarlo en
Muddegoorn 80, 9403 NL Assen