

Broedpogingen van Kluten *Recurvirostra avosetta* op de vloeivelden van Nieuw-Buinen

Jannes Santing

In Drenthe is de Kluut een zeldzame broedvogel. Een nieuwe broedplaats wordt beschreven voor Nieuw-Buinen. Op de vloeivelden werden hier in 1992 en 1993 resp. 1 en 5 broedparen vastgesteld. Het broedsucces was nihil.

Vanaf 1980 werden in toenemende mate in het voorjaar en de zomer Kluten *Recurvirostra avosetta* waargenomen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen. De velden liggen ten NW en ZO van de voormalige aardappelmeelfabriek Hollandia. De velden zijn nog steeds in gebruik door de AVEBE.

In 1992 werd er op de vloeivelden een waarschijnlijk broedgeval geconstateerd. Op 14 mei waren twee Kluten aanwezig ten NW van Nieuw-Buinen: één exemplaar zat in broedhouding op een van waterplanten gebouwd vlotje in ondiep water (c. 20-30 cm diep). De vegetatie die boven het water uitstak, bestond uit dode zuringstengels van het voorafgaande jaar. Het nest was leeg. De Kluten alarmeerden licht. Na 14 mei werden ze hier niet meer gezien. Ten ZO van de fabriek werden op 31 mei en 13 juni resp. 4 en 5 exemplaren aangetroffen.

In 1993 werden evenals in 1992 de eerste Kluten op 20 april gezien. Op 16 mei werden vier alarmerende exemplaren waargenomen op het zuidoostelijke gedeelte. Tijdens de telling van de daar aanwezige kokmeeuwenkolonie *Larus ridibundus* werden vier nesten van Kluten met elk vier eieren gevonden. De nesten bevonden zich in een vegetatie van gras die de nesten bijna overkoepelde. Het geheel was gesitueerd aan het eind van een dijk met een breedte van c. zes m. Deze dijk liep dood in het water. Op 20 mei werden de nesten gefotografeerd. Behalve de vier nesten van 16 mei was er een vijfde nest met één ei. Dit nest lag open en bloot langs de waterkant. Er waren zeven Kluten aanwezig. Vier exemplaren namen na enige tijd weer plaats op het nest. Op 1 juni bleken alle nesten leeg. Er werden geen eiresten gevonden. De Kluten waren afwezig en werden in 1993 ook niet meer gezien op de vloeivelden.

Waarom de nesten mislukten, is niet bekend. Bij de nesten van de Kokmeeuwen werd niets bijzonders opgemerkt. Be(eier)zoekers en bodempredatoren moesten eerst c. 150 m afleggen om de nesten te bereiken, waarbij ze dwars door de kokmeeuwenkolonie moesten.

Waar de niet-broedende partners van de broedende Kluten foerageerden, is evenmin bekend. Ze werden niet op de vloeivelden aangetroffen. Door een gewijzigd beleid van de AVEBE is de waterstand tegenwoordig hoog in de zomer en biedt het terrein door gebrek aan slikvelden weinig mogelijkheden om voedsel te zoeken. Misschien bevat het water of de bodem ook te weinig voedsel.

De Kluut staat te boek als een toevallige broedvogel in Drenthe, waarvan in 1997 een succesvol broedgeval op de vloeivelden van Diependal werd vastgesteld (van Dijk & van Os 1982). Binnen Drenthe lijken vloeivelden inderdaad de enige plekken te zijn waar Kluten zich kunnen vestigen. Permanente vestiging is echter alleen mogelijk indien het waterpeil op de juiste hoogte wordt gehouden.

Summary: Breeding attempts of Avocets *Recurvirostra avosetta* on a sewage farm at Nieuw-Buinen

After a failed breeding attempt in 1992 (one bird sitting on empty nest), five pairs laid eggs in 1993 (four clutches of 4 eggs, one incomplete clutch of 1 egg). All nests failed, but causes of failure remained unknown. Breeding of Avocets in the province of Drenthe is irregular and confined to sewage farms.

Literatuur

van Dijk A.J. & van Os B.L.J. 1982. Vogels van Drenthe. Van Gorcum, Assen.

Adres: De Gloep 2, 7875 AJ Exloo

