

Herhaald albinisme bij Boerenzwaluwen *Hirundo rustica*

Jan Kwint

In juni 1998 werd melding gemaakt van twee juveniele albinistische Boerenzwaluwen bij Bloemkwekerij H. Pijl te Hijken (Amersfoortcoördinaten 2302-5454). Bij nadere inspectie bleek dat de jongen net waren uitgevlogen en foerageerden boven de nabijgelegen Hijkerweiden. Als broedplaats was een tochtvrij stenen bijgebouw gebruikt. In 1997 waren hier al eerder albinistische Boerenzwaluwen waargenomen.

Verbazingwekkend was dat er eind juni weer twee jonge albino's in hetzelfde nest zaten. Met enige moeite kon worden vastgesteld dat er nog twee normale jongen aanwezig waren, waarvan één niet meer in leven. De twee albino's zijn uitgevlogen en verbleven nog 3-4 weken rond de Hijkerweiden.

In 1999 zijn bij de bloemkwekerij en in de directe omgeving geen albinistische Boerenzwaluwen waargenomen. In het bewuste nest werden twee maal vier normale jongen volwassen.

Summary: Repeated albinism in a Barn Swallow *Hirundo rustica*

In 1998 two successive broods of -presumably the same- Barn Swallow pair produced albinistic young. From the first brood at least two albinos fledged. In the second brood two albinos were accompanied by two normal young of which one died before fledging. All albinos fledged and were seen foraging for some weeks above a nearby meadow. At the same site, albinos were also observed in 1997, but not in 1999.

Adres: Berkenlaan 6, 9411 AX Beilen




Foto. De albino Boerenzwaluwen in het tweede broedsel. Hijken, eind juni 1998 (Jan Kwint). *The albinistic Barn Swallows of the second brood. Hijken, late May 1998.*