

Odonatologische vergaderingen

VERSLAG VAN DE ZEVENDE LIBELLENSTUDIEDAG

De zevende bijeenkomst werd gehouden op 8 mei j.l. in Leiden. Er waren 25 mensen aanwezig, namelijk A. Anselin, J. Bredenbeek, K. Jansen, H. van der Keur, B. Kiauta, M. Kiauta, J. Marbus, B. van Noorden, E. Pebesman, B. van Poelgeest, R. Reijnen, P. Smit, R. Sullock Enslin, J. van Tol, W. Verbakel, M. Verdonk, H. Verhaar, J. Wasscher, M. Wasscher en J. Windig.

Vanaf 10.00 h. ontmoette men elkaar in de kantine van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Een half uur later werden we naar de andere kant van het gebouw geleid. Iedereen vertelde zijn of haar naam en wat zijn of haar ervaringen op libellengebied waren. Daarna begon Dr. Geijskes met een voortreffelijke voordracht over de libellenfauna van Suriname. Van dat land zijn nu 97 soorten Zygoptera en 181 Anisoptera bekend. Van een aantal soorten kregen we mooie dia's te zien. Ook werd van een aantal libellen de verspreiding in Zuid-Amerika getoond. Het was interessant te zien hoe verspreidingspatronen vaak overeenkomen en bepaalde zones, zoals het Amazone-gebied, door sommige soorten gemedend worden.

De dia's van Brabantse libellen, die de heer Verbakel vertoonde waren erg mooi. Bovendien had hij interessante waarnemingen van Ceriatagrion tenellum in Campina en Aeshna viridis eierafzettend in een sloot in de omgeving van Waalwijk. In deze sloot van ca. 2 kilometer lengte waren ongeveer 20 vrouwtjes tegelijkertijd aan het eierleggen.

Marcel Wasscher ging in op libellen als indicator van vervuiling van laaglandbeken. Aan de hand van zijn vele gegevens uit Zuidoost Brabant had hij bekeken welke factoren van belang zouden kunnen zijn voor de verspreiding. Dit is onder andere het zuurstofgehalte, dat bepaald wordt door volume, verval, organische stoffen en temperatuur.

Na de lunch vergeleek Jeroen Bredenbeek de huidige libellenfauna van de Gorsselse heide met die van tien jaar geleden. Een aantal soorten werden nieuw gevonden, onder andere Lestes dryas, Aeshna isosceles, Libellula depressa, Orthetrum

cancellatum, Sympetrum striolatum en S. vulgatum. Soorten die nu niet meer aangetroffen werden, waren onder andere Aeshna juncea, A. grandis, Cordulia aenea en Somatochlora metallica.

Daarna gaf Marcel Wasscher een voorlopige indeling van libellen in biotoopgebonden groepen. De indeling in biotopen was onder andere gebaseerd op stilstaand of stromend water en op voedselrijkdom. Er was veel belangstelling voor deze indeling (geïnteresseerden kunnen bij Marcel een kopie vragen)

Na de theepauze liet Peter Geene een schitterende diaserie in vervloeiprojectie zien van libellen. Door tijdgebrek hebben we niet alle opnamen gezien, maar deze worden bewaard tot de volgende libellendag!

Tenslotte kregen we een rondleiding langs de collecties van het museum. Er werd ons een indruk gegeven van wat er aan Nederlands en buitenlands materiaal aanwezig is en op welke manier dit materiaal opgeslagen wordt.

Het was een geslaagde dag; de sfeer was erg goed. Ik vond het vooral leuk dat er zoveel informatie uitgewisseld werd en dat er zoveel interesse was voor elkaars kennis; zo wist de een veel van fotografie, de ander van soortskennmerken, van de libellenstand van vroeger of van nu, waardoor men veel van elkaar kon leren.

Marian Verdonk, Floraliaalaan 47, 1402 NJ Bussum